

## Iomeron®

MR EF

### Bracco

Injektionsvätska, lösning 350 mg I/ml  
(klar vattenlösning)

Joderade röntgenkontrastmedel för intravaskulärt bruk samt för användning i kroppskaviteter

### Aktiv substans:

Jomeprol

### ATC-kod:

V08AB10

Läkemedel från Bracco omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Texten nedan gäller för:

**Iomeron®** injektionsvätska, lösning 150 mg I/ml, 200 mg I/ml, 250 mg I/ml, 300 mg I/ml, 350 mg I/ml och 400 mg I/ml

**FASS-text:** Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-10-24

## Indikationer

Röntgenkontrastmedel med följande användningsområden:

*Intravenös administrering:* Urografi (alla åldrar), perifer flebografi, digital subtraktionsflebografi, digital subtraktionsangiografi (DSA), datortomografi (skalle och helkropp), kavernosografi.

*Intraarteriell administrering:* Angiokardiografi (vuxna och barn), konventionell selektiv koronararteriografi, interventionell koronararteriografi, konventionell angiografi, digital subtraktions-angiografi (DSA).

*Administrering i kroppskaviteter:* Retrograd uretrografi, retrograd pyelo-ureterografi, endoskopisk retrograd kolangio-pankreatografi (ERCP), miktionscystoretrografi (vuxna och barn), kolangiografi, retrograd kolangiografi, artrografi, hystero-salpingografi, fistulografi, sialografi, diskografi, galaktografi, dakryocystografi.

*Subaraknoidal administrering:* Myelografi. (För detaljer se avsnitt Dosering)

## Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Manifest tyreotoxikos.

Omedelbar upprepning av myelografi (se avsnitt Varningar och försiktighet).

## Dosering

### Dosering

Doseringen är avhängig patientbakgrund, undersökningens art samt den använda tekniken. Nedan angivna doser för vuxna rekommenderas som engångsdos för en person på 70 kg.

| Indikation                                      | Koncentration mg I/ml        | Doseringsförslag           |                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Intravenöst bruk                                |                              |                            |                                            |
| Intravenös urografi                             | 250, 300, 350, 400           | Vuxna:                     | 50-150 ml                                  |
|                                                 |                              | Nyfödda:                   | 3-4,8 ml/kg                                |
|                                                 |                              | Spädbarn:                  | 2,5-4 ml/kg ≤1 år                          |
|                                                 |                              | Barn/Ungdom <sup>a</sup> : | 1-2,5 ml/kg >1 år                          |
| Infusionsurografi                               | 150                          | Vuxna:                     | 250 ml                                     |
|                                                 |                              | Barn/Ungdom <sup>a</sup> : |                                            |
| Perifer flebografi                              | 200, 250, 300                | Vuxna:                     | 10-100 ml, upprepas <sup>b</sup> vid behov |
|                                                 |                              |                            | (10-50 ml övre extremiteter)               |
|                                                 |                              |                            | (50-100 ml nedre extremiteter)             |
| DS flebografi                                   | 150, 200                     | Vuxna:                     | 10-100 ml, upprepas <sup>b</sup> vid behov |
|                                                 |                              |                            | (10-50 ml övre extremiteter)               |
|                                                 |                              |                            | (50-100 ml nedre extremiteter)             |
| CT skalle                                       | 150, 200, 250, 300           | Vuxna:                     | 50-200 ml                                  |
|                                                 |                              | Barn/Ungdom <sup>a</sup>   |                                            |
| CT helkropp                                     | 150, 200, 250, 300, 350, 400 | Vuxna:                     | 100-200 ml                                 |
|                                                 |                              | Barn/Ungdom <sup>a</sup>   |                                            |
| Kavernosografi                                  | 150, 200, 300                | Vuxna:                     | ≤100 ml                                    |
| Intravenös DSA                                  | 250, 300, 350, 400           | Vuxna:                     | 100-250 ml                                 |
|                                                 |                              | Barn/Ungdom <sup>a</sup>   |                                            |
| Intraarteriellt bruk                            |                              |                            |                                            |
| Konventionell angiografi                        |                              |                            |                                            |
| Arteriografi av övre extremiteterna             | 300, 350                     | Vuxna <sup>b</sup>         |                                            |
| Arteriografi av pelvis och nedre extremiteterna | 300, 350, 400                | Vuxna <sup>b</sup>         |                                            |

| Indikation                                 | Koncentration mg I/ml | Doseringsförslag         |                                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Abdominell arteriografi                    | 300, 350, 400         | Vuxna <sup>b</sup>       |                                                    |
| Arteriografi av aorta descendens           | 300, 350              | Vuxna <sup>b</sup>       |                                                    |
| Pulmonalisangiografi                       | 300, 350, 400         | Vuxna:                   | ≤170 ml                                            |
| Cerebral angiografi                        | 300, 350              | Vuxna:                   | ≤100 ml                                            |
| Pediatrisk arteriografi                    | 300                   | Barn/Ungdom <sup>a</sup> | ≤ 130 ml                                           |
| Interventionell arteriografi               | 300, 350, 400         | Vuxna <sup>b</sup>       |                                                    |
|                                            |                       | Barn/Ungdom <sup>a</sup> |                                                    |
| Intraarteriell DSA                         |                       |                          |                                                    |
| Cerebral                                   | 150, 200, 300, 350    | Vuxna:                   | 30-60 ml (översikt)                                |
|                                            |                       |                          | 5-10 ml<br>(selektiv angiografi)                   |
|                                            |                       | Barn/Ungdom <sup>a</sup> |                                                    |
| Torakal                                    | 200, 300              | Vuxna <sup>b</sup> :     | 20-25 ml (aorta) upprepas vid behov                |
| Aortabågen                                 | 150, 200, 300, 350    | Vuxna <sup>c</sup>       | 20 ml (bronkialartärer)                            |
| Abdomen                                    | 150, 200, 250, 300    | Vuxna <sup>c</sup>       |                                                    |
| Aortografi                                 | 150, 200, 300, 350    | Vuxna <sup>c</sup>       |                                                    |
| Translumbal aortografi                     | 150, 200, 300         | Vuxna <sup>b</sup>       |                                                    |
| Perifer arteriografi                       | 150, 200, 250, 300    | Vuxna:                   | 5-10 ml för selektiva injektioner upp till 250 ml  |
|                                            |                       | Barn/Ungdom <sup>a</sup> |                                                    |
| Interventionell arteriografi               | 150, 200, 300         | Vuxna:                   | 10-30 ml för selektiva injektioner upp till 250 ml |
|                                            |                       | Barn <sup>a</sup>        |                                                    |
| Angiokardiografi                           | 300, 350, 400         | Vuxna <sup>b</sup>       |                                                    |
|                                            |                       | Barn/Ungdom <sup>a</sup> | 3-5 ml/kg                                          |
| Konventionell selektiv koronararteriografi | 300, 350, 400         | Vuxna:                   | 4-10 ml per artär, upprepas vid behov              |
| <b>Bruk i kroppens hålrum</b>              |                       |                          |                                                    |
| ERCP                                       | 150, 200, 300         | Vuxna                    | ≤100 ml                                            |
| Artrografi                                 | 200, 300, 350         | Vuxna:                   | ≤10 ml per injektion                               |
| Hysterosalpingografi                       | 200, 300, 350         | Vuxna:                   | ≤35 ml                                             |
| Fistulografi                               | 300, 350, 400         | Vuxna:                   | ≤100 ml                                            |
| Diskografi                                 | 300                   | Vuxna:                   | ≤4 ml                                              |
| Galaktografi                               | 300, 350, 400         | Vuxna:                   | 0,15-1,2 ml per injektion                          |
| Dakryocystografi                           | 300, 350, 400         | Vuxna:                   | 2,5-8 ml per injektion                             |
| Sialografi                                 | 300, 350, 400         | Vuxna:                   | 1-3 ml per injektion                               |
| MCU<br>(Miktionscystourethrografi)         | 150                   | Vuxna:                   | 100-250 ml                                         |
| MCU pediatrisk                             | 150                   | Barn/Ungdom <sup>a</sup> | 40-210 ml                                          |

| Indikation                  | Koncentration mg I/ml | Doseringsförslag |                        |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Retrograd kolangiografi     | 200, 300, 350         | Vuxna:           | ≤60 ml                 |
| Retrograd uretrografi       | 200, 300              | Vuxna:           | 20-100 ml              |
| Retrograd pyeloureterografi | 200, 300              | Vuxna:           | 10-20 ml per injektion |
| <b>Intratekalt bruk</b>     |                       |                  |                        |
| Myelografi                  | 200                   | Vuxna:           | 13-22 ml <sup>d</sup>  |
|                             | 250                   |                  | 10-18 ml <sup>d</sup>  |
|                             | 300                   |                  | 8-15 ml <sup>d</sup>   |

<sup>a</sup>= Efter kroppsvikt och ålder

<sup>b</sup>= Högst 250 ml. Volym per injektion beror på kärlområdet som skall undersökas

<sup>c</sup>= Högst 350 ml

<sup>d</sup> =Vid intratekalt bruk får totala dosen 4500 mg I ej överskridas.

#### Definitioner:

Nyfödda: 0-27 dygn; spädbarn: 28 dygn till 12 månader; barn/ungdom: 1 år till 17 år

Om inte annat anges av läkaren, kan en normal diet bibehållas under undersökningdagen. Tillräckligt vätskeintag måste säkerställas inför och efter intravaskulär administrering av joderade kontrastmedel (se avsnitt Varningar och försiktighet).

#### Administreringssätt

*Intravaskulär användning:* Tillförsel av kontrastmedel bör om möjligt ske med patienten i liggande ställning. Kompetent personal och akututrustning bör finnas tillgänglig och patienten hållas under uppsikt under minst 30 minuter efter tillförsel av kontrastmedlet.

För att minimera de potentiella riskerna av att injektionsvätska skall hamna extravasalt är det viktigt att försäkra sig att kanylen är korrekt insatt i kärlet.

För att minska risken av procedurrelaterad trombos och emboli krävs noggrann angiografisk teknik och att katetern spolas med natriumkloridlösning 9 mg/ml. Heparin eller lågmolekylära heparinlösningar kan användas efter tillförseln av kontrastmedlet för att spola igenom infusionskatetern och bibehålla öppen passage under perifer/koronar angiografisk undersökning.

*Intratekal användning:* Vid tillförsel av kontrastmedel bör bordets huvudända vara förhöjd. Vid misstanke om sänkt kramptröskel (t.ex. om kontrastmedlet trots vidtagna försiktighetsåtgärder hamnat intrakranialt) bör krampprofylax med diazepam- eller barbituratläkemedel under 24 till 48 timmar övervägas.

Efter avslutad myelografi bör patienten vila med höjd huvudända under en timma. Därefter kan patienten röra sig men får ej böja sig framåt.

Under cerviko-torakala undersökningar får ej huvudändan sänkas mer än 10 till 20 grader. Direkt efter undersökning skall bordet höjas till 45 grader under ca 2 minuter för medlets återflöde till lägre nivå. Om patienten är sängliggande skall huvudändan hållas förhöjd under första 6 timmarna. Patienter med sänkt kramptröskel bör observeras under samma tidsperiod. Patienterna bör observeras och därför ej lämnas helt ensamma under de första 24 timmarna efter undersökningen.

## Varningar och försiktighet

## Allmänt

Undersökningar med röntgentäta ämnen bör utföras av personal med erforderlig utbildning och ingående kunskaper om den procedur som skall utföras.

Vid användning av Iomeron gäller de försiktighetsåtgärder och riktlinjer för handhavande av eventuella kontrastmedelsreaktioner som vid motsvarande användning av andra jodhaltiga kontrastmedel.

Vid undersökning av subarahnoidalrummet bör totalmängden tillfört kontrastmedel hållas så lågt som möjligt inom angivet dosintervall.

Omedelbar upprepning av myelografi är kontraindicerat på grund av risken för överdosering.

Under vaskulär kateterisering bör katetrarna spolats regelbundet.

Till följd av ett fåtal rapporter om njurtoxicitet, bör undersökning med joderade kontrastmedel senareläggas för patienter som nyligen fått kolicystografiskt medel för undersökning av känd eller misstänkt lever eller gallsjukdom.

## Överkänslighet

Hos patienter med misstänkt eller känd överkänslighet mot kontrastmedel rekommenderas inte användning av testdoser för överkänslighet eftersom svåra eller dödliga reaktioner mot kontrastmedel inte går att förutsäga utifrån överkänslighetstest.

Extra försiktighet krävs vid undersökning av patienter med tidigare allergi, astma eller ogynnsamma reaktioner i samband med tidigare liknande undersökningar. Iomeron kan, liksom andra kontrastmedel, provocera anafylaxi eller andra uttryck för allergi.

Patienter som behandlas med adrenerga betablockerande läkemedel, särskilt astmatiker, kan ha en lägre tröskel för bronkospasm och kan svara sämre på behandling med beta-agonister och adrenalin, vilket kan medföra behov av högre adrenalindoser.

Vid misstanke om anafylaktisk reaktion skall kontrastmedelstillförseln omedelbart avbrytas och vid behov ska specifik behandling omgående ges intravenöst.

Då allvarliga reaktioner som involverar kardiovaskulära systemet kan förekomma i samband med överkänslighetsreaktioner krävs att personal, mediciner och utrustning för hjärt-lungräddning finns omedelbart tillgängliga.

Vid undersökning av patienter med astma eller annan allergisk disposition, och särskilt patienter med känd överkänslighet mot joderade kontrastmedel, bör premedicinering med antihistaminer och/eller kortikoider övervägas.

## Äldre

Äldre personer löper särskilt stor risk för reaktioner på grund av försämrade fysiologiska funktioner, speciellt om en hög dos kontrastmedel används.

## Hydrering

Adekvat hydrering måste tillförsäkras alla patienter före och efter undersökningen. Relevanta störningar i vatten- och elektrolytbalansen bör korrigeras. Detta gäller särskilt hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion (som polyuri, oliguri, hyperuricemi), sjukdomstillstånd som predisponerar till nedsatt njurfunktion (diabetes mellitus, multipelt myelom eller andra paraproteinemier), sickle cell anemi, liksom hos spädbarn, barn och äldre patienter. Försiktighet ska vidtas vid hydrering av patienter med underliggande tillstånd som kan försämrats av vätskeöverskott, inklusive hjärtsvikt.

## Nedsatt njurfunktion

Redan existerande nedsatt njurfunktion kan predisponera för akut njursvikt.

Förebyggande åtgärder inkluderar:

- Identifiera högriskpatienter;

- Säkerställ adekvat hydrering före kontrastmedeladministration, helst genom dropp före och under undersökningen och tills kontrastmedlet har utsöndrats via njurarna;
- Undvik om möjligt att administrera nefrotoxiska läkemedel, att utföra större kirurgiska ingrepp eller ingrepp som renal angioplastik tills kontrastmedlet har utsöndrats;
- Använd inte kontrastmedel igen förrän njurfunktionen är tillbaka på samma nivåer som innan undersökningen.

Kontrastmedel kan orsaka övergående nedsatt njurfunktion som kan leda till laktacidosis hos diabetespatienter som behandlas med biguanider (se avsnitt Interaktioner). Iomeron är dialyserbart. Patienter som står på hemodialys kan ges Iomeron alldeles före dialys.

### **Feokromocytom**

Patienter med feokromocytom kan utveckla allvarlig blodtrycksförhöjning vid intravaskulär användning av produkten. Premedicinering med  $\alpha$ - och  $\beta$  receptorblockerare rekommenderas till dessa patienter före intraarteriell injektion av produkten och under övervakning av läkare.

### **Hjärtsjukdom och pulmonell hypertension**

Det finns en ökad risk för allvarliga reaktioner hos personer med allvarlig hjärtsjukdom.

Intravaskulär användning av kontrastmedel kan påskynda lungödem hos patienter med konstaterad eller begynnande hjärtsvikt eller koronarkärslsjukdom. Vid pulmonell hypertension och/eller hjärtvalsjukdom kan kontrastmedelsanvändning leda till uttalade hemodynamiska förändringar.

### **Myastenia gravis**

Försiktighet bör iakttas hos patienter med myastenia gravis (kan få förvärrade symtom).

### **Neurologiska symtom**

Särskild försiktighet bör iakttas vid intravaskulär administrering av kontrastmedel till patienter med akut hjärninfarkt, akut intrakraniell blödning, och tillstånd med skador på blod-hjärn-barriären, hjärnödem och akut demyelinisering.

Neurologiska symtom från degenerativ, ischemisk, inflammatorisk eller neoplastisk cerebrovaskulär patologi kan förvärras av kontrastmedeladministration. Dessa patienter har en ökad risk för övergående neurologiska komplikationer.

Vasospasm och efterföljande ischemiska symtom kan orsakas av intravaskulära injektioner av kontrastmedel.

Patienter med akut cerebral patologi, intrakraniell tumör eller metastaser och epilepsi har en ökad risk för kramper och kräver särskild uppmärksamhet.

Behandling av epilepsi skall bibehållas före och under myelografi för patienter med känd krampbenägenhet.

### **Alkoholism och drogmissbruk**

Akut eller kronisk alkoholism har bevisats, experimentellt och kliniskt, öka permeabiliteten i blod-hjärnbarriären. Detta underlättar passagen av joderade kontrastmedel till hjärnvävnad, vilket eventuellt leder till CNS sjukdomar.

Försiktighet skall iakttas hos drogmissbrukare då de kan förmodas ha en sänkt kramptröskel.

### **Kontrastinducerad encefalopati**

Encefalopati har rapporterats i samband med användning av Iomeron (se avsnitt Biverkningar).

Kontrastinducerad encefalopati kan manifesteras genom symptom och tecken på neurologisk dysfunktion så som huvudvärk, synrubbing, kortikal blindhet, förvirring, anfall, förlust av koordination, hemiplegi, afasi, medvetlöshet, koma eller cerebralt ödem inom några minuter eller timmar efter administreringen av jomeprol, och avklingar vanligtvis inom några dagar.

Läkemedlet ska användas med försiktighet till patienter vars tillstånd rubbar blodhjärnbarriärens integritet, vilket potentiellt kan leda till ökad permeabilitet över blodhjärnbarriären för kontrastmedlet och öka risken för encefalopati. Vid misstanke om kontrastinducerad encefalopati ska administreringen av jomeprol avbrytas och lämplig medicinsk behandling inledas.

### **Allvarliga hudbiverkningar**

Allvarliga hudreaktioner (SCARs, severe cutaneous adverse reactions) inklusive Steven-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP, acute generalized exanthematous pustulosis) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms), som kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats i samband med intravaskulär administrering av joderade kontrastmedel (se avsnitt Biverkningar). Vid administreringstillfället ska patienterna informeras om tecken och symtom och övervakas noggrant med avseende på hudreaktioner. Om tecken och symtom, som tyder på dessa reaktioner uppkommer, ska behandlingen med Iomeron omedelbart avbrytas. Om patienten har utvecklat en allvarlig reaktion såsom SJS, TEN, AGEP eller DRESS vid användning av Iomeron, får administreringen av Iomeron aldrig återupptas till denna patient.

### **Oro**

Uttalad spänning, oro och smärta kan orsaka eller potentiera kontrastrelaterade reaktioner.

### **Akut inflammation eller infektion**

Retrograda undersökningar skall undvikas vid akut inflammation eller infektion av det organ som skall undersökas.

### **Sköldkörtelfunktion och sköldkörtelfunktionstest**

Den mindre mängd fritt oorganisk jodid som kan förekomma i kontrastmedel kan ha viss effekt på sköldkörtelns funktion. Denna effekt syns tydligare hos patienter med latent eller känd hypertyreos eller struma. Hypertyroidism eller till och med tyreotoxisk kris har rapporterats efter administrering av joderade kontrastmedel.

Joderade kontrastmedel kan interferera med sådana tyroideafunktionstest som baseras på jodestimat (dvs test baserade på T3-resin upptag och totalt eller fritt T4 påverkas ej). Höga koncentrationer av kontrastmedel i serum och urin kan interferera med laboratoriemätningar av bilirubin, proteiner eller oorganiska ämnen (t ex järn, koppar, kalcium, fosfat).

### **Pediatrik population**

Hypotyreos eller övergående sköldkörtelsuppression kan observeras efter exponering för joderade kontrastmedel.

Särskild uppmärksamhet bör ges till pediatrika patienter under 3 års ålder eftersom en underaktiv sköldkörtelfunktion i tidig ålder kan vara skadlig för motorisk-, hörsel och kognitiv utveckling och kan kräva övergående T4-substitutionsterapi. Incidensen av hypotyreos hos patienter yngre än 3 år som exponerats för joderade kontrastmedel har rapporterats mellan 1,3 % och 15 % beroende på försökspersonernas ålder och dosen av det joderade kontrastmedlet och observeras oftare hos nyfödda och för tidigt födda barn.

Sköldkörtelfunktionen bör utvärderas hos alla pediatrika patienter yngre än 3 år efter exponering för joderade kontrastmedel. Om hypotyreos upptäcks bör behovet av behandling övervägas och sköldkörtelfunktionen bör övervakas tills den normaliserats.

## Interaktioner

För att förhindra uppkomsten av laktacidosis hos diabetespatienter som behandlas med orala diabetesläkemedel från biguanidklassen (metformin) ska behandling med dessa läkemedel avbrytas i följande fall; före en intraarteriell kontrastmedelsadministrering med första passageexponering i njuren, hos patienter med eGFR mindre än 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> som får intravenöst kontrastmedel, eller intraarteriellt kontrastmedel med andra passage-exponering i njuren, eller hos patienter med akut njurskada, och återinsätts först efter 48 timmar om njurfunktionen inte har förändrats signifikant.

Patienter som behandlats med immunomodulerare, som interleukin-2 och interferon, har en ökad risk för sena allergiska reaktioner.

Överväg att avbryta behandlingen med läkemedel som sänker kramptröskeln fram till 24 timmar efter ingreppet vid intratekal användning och till patienter med störningar i blod- hjärnbarriären (se avsnitt Varningar och försiktighet, Neurologiska symtom).

## Graviditet

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk av fosterskada.

Inga effekter på fertilitet, ingen embryonal toxicitet eller teratogenicitet har observerats i djurstudier. Signifikant ökad postnatal dödlighet hos avkomman sågs hos råttor, dock enbart vid doser som är högre än föreslagna maximala humandoser för Iomeron. Liksom för andra icke-joniska kontrastmedel saknas kontrollerade studier på gravida kvinnor som bekräftar resultaten av djurstudierna. Exponering för röntgenstrålar bör då så är möjligt undvikas under graviditet. Fördelarna med röntgenundersökning med eller utan kontrastmedel bör därför mot denna bakgrund noggrant övervägas mot risktagande. Hos nyfödda spädbarn som har exponerats för Iomeron *in utero* rekommenderas att övervaka sköldkörtelfunktionen (se avsnitt Varningar och försiktighet).

## Amning

Passerar över i modersmjölk men påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Iomeron kan användas vid amning.

## Trafik

Det finns ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

## Biverkningar

Allmänt

Undersökningstyp, utrustning, tekniskt förfarande och patientstatus är faktorer som påverkar frekvens och intensitet av biverkningar.

Biverkningarna är vanligen lätta till måttliga och av övergående natur. Det finns emellertid rapporter om grava och livshotande reaktioner som i enskilda fall lett till döden.

**Anafylaxi** (anafylaktoida / överkänslighetsreaktioner) kan uppträda med olika symptom, och samma patient utvecklar sällan alla symtom. Vanligtvis inom 1 till 15 min (men sällan efter så länge som 2 timmar) klagar

patienten på onormal känsla, agitation, rodnad, värmekänsla, ökad svettning, yrsel, konjunktivit, ökat tårflöde, snuva, hjärklappning, parestesier, klåda, bultande huvud, smärta i svalg och trångghetskänsla i halsen, dysfagi, hosta, nysningar, urtikaria, erytem, och milt lokalt ödem eller angioödem och dyspné på grund av ödem i tunga och struphuvud och/eller laryngospasm som yttrar sig med rosslingar och bronkospasm.

Illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré har också rapporterats.

Dessa reaktioner, som kan uppstå oberoende av dosen eller administreringsätt, kan utgöra de första tecknen på cirkulationskollaps.

Administrering av kontrastmedel ska omedelbart avbrytas och vid behov ska adekvat behandling snarast initieras via venös access.

Allvarliga kardiovaskulära reaktioner, såsom chock, vasodilatation med uttalad hypotension, takykardi, cyanos och medvetslöshet kan utvecklas till andnings- och/eller hjärtstillestånd som kan leda till döden.

Dessa händelser kan inträffa snabbt och kräver full och aggressiv hjärt-lungräddning.

Primär cirkulatorisk kollaps kan inträffa som den enda och/eller initiala reaktionen utan några respiratoriska eller andra symptom enligt ovan.

Efter parenteral tillförsel av kontrastmedel uppträder reaktionerna minuterna efter given dos. Sena reaktioner som oftast involverar huden kan uppträda inom 2 till 3 dagar.

Efter intratekal tillförsel uppträder de flesta biverkningarna 3 till 6 timmar efter undersökningen dvs den tid det tar för medlet att nå det intravaskulära rummet (se avsnitt Farmakokinetik).

Även efter injektion av joderat kontrastmedel i kroppshålor uppträder majoriteten av biverkningar några timmar efter undersökningen till följd av långsam absorption från injektionsområdet.

Sedan Iomeron kom ut på marknaden har nedanstående biverkningar rapporterats hos ungefär 4 av 10000 patienter.

De biverkningar som var klassificerades under kliniska prövningar hade en incidens på under 9 %.

### Vuxna

Tabell A. Biverkningar som observerats efter intravaskulär administrering av Iomeron.

| Organsystem                        | Biverkningar                   |                                          |                                        |                                    |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                    | Kliniska studier               |                                          |                                        | Data efter marknadsföring          |
|                                    | Vanliga<br>(≥1/100 till <1/10) | Mindre vanliga<br>(≥1/1 000 till <1/100) | Sällsynta<br>(≥1/10 000 till <1/1 000) | Ingen känd frekvens*               |
| Blodet och lymfsystemet            |                                |                                          |                                        | Trombocytopeni<br>Hemolytisk anemi |
| Metabolism och nutrition           |                                |                                          |                                        | Sänkt aptit                        |
| Immunsystemet                      |                                |                                          |                                        | Anafylaktoid reaktion              |
| Endokrina systemet                 |                                |                                          |                                        | Hypertyroidism                     |
| Psykiska störningar                |                                |                                          |                                        | Ångest<br>Förvirring               |
| Centrala och perifera nervsystemet |                                | Yrsel<br>Huvudvärk                       | Presyncope                             | Kontrastinducerad encefalopati***  |

|                                         |  |              |                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |  |              |                                         | Hjärnödem<br>Cerebrovaskulär sjukdom<br>Koma<br>Övergående ischemisk attack<br>Paralys<br>Synkope<br>Kramper<br>Medvetsslöshet<br>Dysartri<br>Parestesi<br>Amnesi<br>Sömnhighet<br>Smakstörningar |
| Ögon                                    |  |              |                                         | Övergående blindhet<br>Synstörningar<br>Konjunktivit<br>Ökat tårflöde<br>Fotopsi                                                                                                                  |
| Hjärtat                                 |  |              | Bradykardi<br>Takykardi<br>Extrasystole | Hjärtstillestånd<br>Hjärtinfarkt<br>Hjärtsvikt<br>Angina pectoris<br>Arytmi<br>Kammar- eller förmaksflimmer<br>Atrioventrikulärblock                                                              |
| Blodkärl                                |  | Hypertension | Hypotension                             | Cirkulatorisk kollaps eller chock<br>Blekhet<br>Vasospasm****<br>Ischemi****<br>Cyanos<br>Emboli och trombos i kranskärlen har rapporterats efter hjärtkateterisering.                            |
| Andningsvägar, bröstorg och mediastinum |  | Dyspné       |                                         | Andningsstillestånd<br>Akut respiratorisk insufficiens (ARDS)<br>Lungödem<br>Larynxödem<br>Svalgödem<br>Bronkospasm<br>Astma<br>Hosta<br>Svalgobehag<br>Larynxobehag                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                      |                            | Rinit<br>Dysfoni                                                                                                                                                                                                                         |
| Magtarmkanalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Kräkningar<br>Illamående                             |                            | Akut pankreatit<br>Ileus<br>Diarré<br>Buksmärta<br>Hypersalivation<br>Dysfagi<br>Förstorad spottkörtel                                                                                                                                   |
| Hud och subkutan vävnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Erytem<br>Urtikaria<br>Pruritus                      | Utslag                     | Akut generaliserad exantematös pustulos<br>Angioödem<br>Stevens-Johnson syndrom<br>Toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom)<br>Erythema multiforme<br>DRESS, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom<br>Ökad svettning |
| Muskuloskeletala systemet och bindväv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                      | Ryggvärk                   | Artralgi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Njurar och urinvägar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                      |                            | Akut njurskada*****                                                                                                                                                                                                                      |
| Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Värmekänsla | Bröstsmärta<br>Värme och smärta på injektionsstället | Asteni<br>Stelhet<br>Fever | Reaktion vid injektionsstället **<br>Sjukdomskänsla<br>Köldupplevelse lokalt<br>Törst                                                                                                                                                    |
| Undersökningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                      | Ökat blodkreatinin         | Avvikande leverfunktionstest<br>Ökad blodurea<br>EKG med ST-höjning<br>Avvikande EKG                                                                                                                                                     |
| <p>* Eftersom reaktionerna inte observerades under kliniska provningar med 4739 patienter, blir bästa estimeringen att deras relativa förekomst är sällsynt (<math>\geq 1/10\ 000</math> till <math>&lt; 1/1\ 000</math>).</p> <p>** Reaktioner vid injektionsstället innefattar smärta vid injektionsstället och svullnad. I de flesta fall beror de på extravasering av kontrastmedlet. Dessa reaktioner är vanligtvis övergående och leder till återgång utan följsjukdomar. Fall av extravasering med inflammation, hudnekros och även utveckling av kompartmentsyndrom har rapporterats.</p> |             |                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |

\*\*\* Encefalopati kan manifesteras genom symptom och tecken på neurologisk dysfunktion så som huvudvärk, synrubbning, kortikal blindhet, förvirring, anfall, förlust av koordination, hemiplegi, afasi, medvetslöshet, koma eller hjärnödem

\*\*\*\* Vasospasm och påföljande ischemi, har observerats under intraarteriella injektioner med kontrastmedel, särskilt efter koronar- och cerebral angiografi, ofta procedurrelaterat och eventuellt utlöst av spetsen på katetern eller överskottstryck av katetern.

\*\*\*\*\* Övergående njursvikt med oliguri, proteinuri och en ökning av serumkreatinin kan utvecklas, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion. I händelse av extravasal injektion kan i sällsynta fall en vävnadsreaktion utvecklas.

Tabell B. Biverkningar som observerats efter intratekal administrering av lomeron.

| Organsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biverkningar              |                                  |                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kliniska studier          |                                  |                                                                          | Data efter marknadsföring                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mycket vanliga<br>(≥1/10) | Vanliga<br>(≥1/100 till <1/10)   | Mindre vanliga<br>(≥1/1 000, <1/100)                                     | Ingen känd frekvens*                          |
| Immunsystemet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                  |                                                                          | Anafylaktoid reaktion                         |
| Centrala och perifera nervsystemet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Huvudvärk                 | Yrsel                            | Förlorat medvetande<br>Parapares<br>Parestesi<br>Hypestesi<br>Sömnhighet | Epilepsi<br>Kontrastinducerad encefalopati*** |
| Blodkärl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | Hypertension                     | Hypotension<br>Rodnad                                                    |                                               |
| Magtarmkanalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Illamående<br>Kräkningar         |                                                                          |                                               |
| Hud och subkutan vävnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                  | Ökad svettning<br>Pruritus                                               | Utslag                                        |
| Muskuloskeletala systemet och bindväv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Ryggvärk<br>Värk i extremiteter  | Muskelstelhet<br>Nackvärk                                                |                                               |
| Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Reaktion vid injektionsstället** | Värmekänsla<br>Fever                                                     |                                               |
| <p>* Eftersom reaktionerna inte observerades under kliniska provningar med 388 patienter, blir bästa estimeringen att deras relativa förekomst är mindre vanliga (≥1/1 000, &lt;1/100).</p> <p>** Reaktioner vid injektionsstället innefattar smärta vid administreringsstället, obehag vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället och värme vid injektionsstället.</p> <p>*** Encefalopati kan manifesteras genom symptom och tecken på neurologisk dysfunktion så som huvudvärk, synrubbning, kortikal blindhet, förvirring, anfall, förlust av koordination, hemiplegi, afasi, medvetslöshet, koma eller hjärnödem</p> |                           |                                  |                                                                          |                                               |

Anafylaxi (Anafylaktoida reaktioner/överkänslighetsreaktioner). Många av de biverkningssymtom nämnda ovan är desamma som kan förekomma vid en överkänslighetsreaktion. Vid anafylaxi utvecklar patienten ett

eller flera symtom oftast inom 1 till 15 minuter (sällan längre än 2 timmar) efter att kontrastmedlet tillförts. Allvarliga reaktioner inkluderande det kardiovaskulära systemet sker snabbt och kan få fatal utgång (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

### **Pediatrisk population**

Det finns begränsad erfarenhet av barn. Säkerhetsdatabasen från pediatrika kliniska prövningar omfattar 184 patienter.

Jomeprols säkerhetsprofil är likartad hos barn och vuxna. Övergående hypotyreos kan förekomma hos nyfödda, särskilt hos prematura spädbarn eller nyfödda med låg födelsevikt samt barn (0-3 år), vid exponering för jomeperol.

### **Intratekal administrering**

I kliniska prövningar har lomeprol administrerats intratekalt till 388 vuxna patienter. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och ryggvärk. Dessa reaktioner är vanligtvis milda till måttliga och av övergående natur. I sällsynta fall kan huvudvärk kvarstå i flera dagar. De flesta biverkningar inträffar några timmar (3 till 6 timmar) efter ingreppet på grund av distribution av kontrastmedlet i CSF från injektionsstället till det intravaskulära utrymmet (se avsnitt Farmakokinetik). De flesta reaktioner uppstår inom 24 timmar efter injektionen.

### **Pediatrisk population**

Det finns ingen erfarenhet från kliniska prövningar med intratekal administrering av jomeprol till barn. Inga biverkningar har rapporterats efter intratekal administrering av jomeprol efter marknadsföring.

### **Administrering för undersökning av kroppshålor:**

Stegring av blodamylas är vanlig efter E.R.C.P. Pankreatit har beskrivits i sällsynta fall.

Reaktioner i samband med artrografi och fistulografi representerar vanligen irritation till följd av den redan existerande vävnadsinflammationen.

I likhet med övriga joderade kontrastmedel kan buksmärta och sjukdomskänsla erfaras vid hysterosalpingografi.

Överkänslighetsreaktioner är sällsynta, vanligen lätta och i form av hudreaktioner. Risken för en allvarlig anafylaktoid reaktion kan inte uteslutas.

## **Överdoser**

Överdoser kan leda till livshotande biverkningar i huvudsak genom inverkan på det pulmonella och kardiovaskulära systemet. Vid överdosering bör patienten övervakas noga och symtomatisk terapi omedelbart sättas in. Iomeron är dialysabel.

I händelse att en tillfällig *intravaskulär överdos* diagnostiseras skall patientens vätskebalans och elektrolytstatus följas och korrigeras. Njurfunktionen bör följas i minst tre dagar.

I händelse av en *intratekal överdos* skall patienten övervakas under minst 24 timmar för tecken och symtom på CNS störningar. Sådana tecken kan vara: stigande hyperreflexi eller tonisk-kloniska spasmer, upp till generaliserade anfall, hypertermi, stupor och hypoventilering.

## **Farmakodynamik**

Jomeprol är en icke-jonisk kontrastsubstans för intravaskulärt och subaraknoidalt bruk samt för användning i kroppskaviteter.

Jomeprols farmakokinetik, tolerabilitet och effekter i lösningar upp till 400 mg jod/ml har bestämts hos friska frivilliga försökspersoner och patienter som genomgått urografi, angiografi, datortomografi och undersökning av kroppskaviteter.

Några kliniskt signifikanta förändringar har ej iakttagits med avseende på vitala funktioner eller laboratorietester.

## Farmakokinetik

Jomeprol binds ej till plasma eller serumproteiner. Vid intravaskulär användning har jomeprol en snabb distribution. Medelvärde för halveringstiden är 23 min. Distributionsvolymen motsvarar ungefär den extracellulära vätskan. Jomeprol elimineras via njurarna (glomerulär filtration) i oförändrad form. Vid normal njurfunktion är eliminationen snabb med ett medelvärde för halveringstiden på 1 tim och 49 min. Av given dos återfinns i urinen 84 % efter 8 timmar, 87 % efter 12 timmar och 95 % efter i perioden 24 till 96. Hos patienter med nedsatt njurfunktion är halveringstiden för elimination förlängd i relation till graden av funktionsnedsättning. Vid lätt till moderat njurfunktionsnedsättning återfinns 50 % av given dos efter 4 till 8 timmar; vid grav funktionsnedsättning efter 16 till 84 timmar (se avsnitt Dosering för dosanpassning). Efter en dialysomgång återfinns ca 58 % av given dos i dialysatet.

Efter intratekal administrering absorberas jomeprol fullständigt från cerebrospinal-vätskan inom 3 till 6 timmar. Halveringstiden för elimination är oberoende av given dos mellan 8 till 11 timmar. Plasmakoncentrationen är mätbar upp till 24 timmar hos 93 % av patienterna. Den huvudsakliga utsöndringen av jomeprol via urinen sker under de första 24 timmarna efter given dos, med en mindre del under 24 till 48 timmars intervallet.

## Prekliniska uppgifter

Akuta toxicitetsstudier på mus, råtta och hund visar att intravenöst eller intraarteriellt administrerat lomeron har en lägre toxicitet jämfört med joniska kontrastmedel och toxicitet jämförbar med andra icke-joniska kontrastmedel. Upprepad intravenös administration till råtta och hund under fyra veckor, med motsvarande den föreslagna maximala humandosen, visar att lomeron tolereras väl. Fertilitetsstudier och studier av embryofetal toxicitet visade inga anmärkningsvärda effekter. Peri- och postnatalstudier visade dock på en signifikant lägre överlevnad hos avkomman i högdosgruppen (4 g jod/kg). lomeron uppvisade ingen genotoxisk potential i genomförda studier.

## Innehåll

### Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml lomeron innehåller:

injektionsvätska 150 mg l/ml: jomeprol 306 mg motsvarande jod 150 mg.  
injektionsvätska 200 mg l/ml: jomeprol 408 mg motsvarande jod 200 mg.  
injektionsvätska 250 mg l/ml: jomeprol 510 mg motsvarande jod 250 mg.  
injektionsvätska 300 mg l/ml: jomeprol 612 mg motsvarande jod 300 mg.  
injektionsvätska 350 mg l/ml: jomeprol 714 mg motsvarande jod 350 mg.  
injektionsvätska 400 mg l/ml: jomeprol 816 mg motsvarande jod 400 mg.

Beredningar innehållande jomeprol ger kontrastmedel med särskilt låg osmolalitet och viskositet i jämförelse med andra icke-joniska kontrastmedel. lomeron har framställts i ett flertal koncentrationer (upp till 400 mg jod/ml). De fysikaliskt-kemiska egenskaperna hos lomeron injektionslösningar vid olika koncentrationer är:

| Jodkoncentration<br>mg/ml | Densitet<br>g/ml |      | Osmolalitet<br>mosmol/kg vatte<br>n | Viskositet mPa.s |      |
|---------------------------|------------------|------|-------------------------------------|------------------|------|
|                           | 20°C             | 37°C | 37°C                                | 20°C             | 37°C |

| <i>Jodkoncentration<br/>mg/ml</i> | <i>Densitet<br/>g/ml</i> |     | <i>Osmolalitet<br/>mosmol/kg vatten<br/>n</i> | <i>Viskositet mPa.s</i> |      |
|-----------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------|------|
| 150                               | 1,2                      | 1,2 | 301                                           | 2,0                     | 1,4  |
| 200                               | 1,2                      | 1,2 | 362                                           | 3,1                     | 2,0  |
| 250                               | 1,3                      | 1,3 | 435                                           | 4,9                     | 2,9  |
| 300                               | 1,3                      | 1,3 | 521                                           | 8,1                     | 4,5  |
| 350                               | 1,4                      | 1,4 | 618                                           | 14,5                    | 7,5  |
| 400                               | 1,4                      | 1,4 | 726                                           | 27,5                    | 12,6 |

Injektionslösningarna har pH 6,5 - 7,2

### Förteckning över hjälpämnen

För samtliga styrkor gäller att 1 ml innehåller:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Trometamol                         | 1,0 mg  |
| Saltsyra                           | 0,24 mg |
| Vatten till injektionsvätskor till | 1,0 ml  |

## Blandbarhet

För att undvika eventuell inkompatibilitet får kontrastmedel ej blandas med andra läkemedel.

## Miljöpåverkan

### Jomeprol

Miljörisk: Användning av jomeprol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Jomeprol är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Jomeprol har låg potential att bioackumuleras.

### Detaljerad miljöinformation

#### Environmental Risk Classification

#### Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

$$PEC (\mu\text{g/L}) = (A \cdot 10^9 \cdot (100 - R)) / (365 \cdot P \cdot V \cdot D \cdot 100) = 1.37 \cdot 10^{-6} \cdot A \cdot (100 - R)$$

$$PEC = 0.743 \mu\text{g/L}$$

Where:

A = 5424.21 kg (total sold amount API in Sweden year 2020, data from IQVIA).

R = X % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden =  $10 \cdot 10^6$

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

(Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default)

(Ref. I)

#### Predicted No Effect Concentration (PNEC)

## Ecotoxicological studies

*Algae (Selenastrum capricornutum)*

### Acute toxicity:

EC<sub>50</sub> 14 d (growth inhibition) > 1000 mg/L

Protocol: OECD 201

(Ref. II)

*Water flea (Daphnia magna)*

### Acute toxicity:

LC<sub>50</sub> 24 and 48 h (acute immobilization) > 1000 mg/L

Protocol: OECD 202

(Ref. III)

*Fish (Bluegill, Lepomis macrochirus)*

### Acute toxicity:

LC<sub>50</sub> 24, 48, 72 and 96 h (mortality) > 1000 mg/L

Protocol: OECD 203

(Ref. IV)

### *Other ecotoxicity data:*

PNEC = 1000 µg/L

PNEC (µg/L) = lowest LC/EC<sub>50</sub> 1000 mg/L/1 000, where 1000 is the assessment factor used (acute toxicity data only). The most sensitive of the three tested species is unknown since LC/EC<sub>50</sub> were the same for all three species. This value has been used for this calculation.

### Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.743/1000 = 0.000743

PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase:

*Use of iomeprol has been considered to result in insignificant environmental risk.*

## Degradation

### **Abiotic and biotic degradation**

Iomeprol had no inhibitory effect on the respiration rate of activated sludge up to a concentration of 100 mg/L.

(Protocol: OECD 209)

(Ref. V)

Degradation of iomeprol was established over a period of 28 days. The COD value was 0.858 mg O<sub>2</sub>/mg.

The BOD value at 4, 8, and 24 h and on days 7, 14, 21 and 28 was 0, 0.035, 0.040, 0.060, 0.085, 0.120 and 0.130 mg O<sub>2</sub>/mg.

The results given by HPLC determinations shown that the alteration in the chemical structure of iomeprol (primary biodegradation) did not exceed 15 %.

On the basis of the biodegradability values found: 0, 4.1, 4.7, 7.0, 9.9, 14.0 and 15.2 % respectively at 4, 8, 24 h and on days 7, 14, 21, and 28, it can be concluded that iomeprol is not readily biodegradable.

(Protocol: OECD 301)

(Ref. VI)

#### *Justification of chosen degradation phrase:*

Hence, iomeprol did not pass the ready degradation test and since there is no information available on grade of mineralisation the phrase: "*iomeprol is potentially persistent*" should be used.

#### **Bioaccumulation**

##### *Partition coefficient:*

An estimation of the partition coefficient of iomeprol between n-octanol and aqueous media was made by adding suitable volumes of a water solution of iomeprol (40350 mg/L) to known volumes of a pre-saturated mixture of n-octanol-water.

The  $K_{ow}$  value (n-octanol solubility/aqueous solubility) was 0.0021 ( $\log_{10} K_{ow} = -2,68$ ).

Non-clinical data on iomeprol (Iomeron) reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity, toxicity to reproduction. Pre-clinical effects were observed only at exposures considered sufficiently in excess of the maximum human exposure indicating little relevance to clinical use.

Results from studies in rats, mice and dogs demonstrate that iomeprol has an acute intravenous or intraarterial toxicity similar to that of the other non-ionic contrast media, as well as a good systemic tolerability after repeated intravenous administrations in rats and dogs.

(method unknown)

(Ref. VII)

#### *Justification for chosen bioaccumulation phrase:*

Since  $\log K_{ow} < 4$  at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.

#### **Excretion (metabolism)**

There is no significant serum protein binding and iomeprol is not metabolized.

Elimination is almost exclusively through the kidneys (90 % of the dose recovered in the urine within 96 hours of its administration) and is rapid (50 % of an intravascularly administered dose within 2 hours).

(Ref. VIII)

#### **References**

- I. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment
- II. Iomeprol. Algal growth inhibition study. RBM Study No. 950109, 1996
- III. Iomeprol. Acute immobilization study in *Daphnia magna*. RBM Study No. 940841, 1996
- IV. Iomeprol. Acute toxicity study in fish (semi-static test). RBM Study No. 940740, 1996
- V. Iomeprol. Activated sludge, respiration inhibition test. RBM Study No. 940742, 1995
- VI. Iomeprol. Ready biodegradability (closed bottle test). RBM Study No. 940743, 1995.
- VII. Physical and chemical characterization of iomeprol. Enichem Study No. 02095, 1995.
- VIII. Iomeron SmPC, retrieved from electronic medicines compendium (emc) 2022-09-01 - <https://www.medicines.org.uk/emc/product/3892/smpc>

## **Hållbarhet, förvaring och hantering**

### **Hållbarhet**

5 år.

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 24 timmar efter öppnandet vid 40 °C.

Ur mikrobiologisk synpunkt kan 500 ml flaskan förvaras i högst 10 timmar vid 25 °C. Om produkten används under andra förvaringstider eller förhållanden sker det under användarens ansvar.

### **Särskilda förvaringsanvisningar**

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Även om lomerons känslighet för röntgenstrålning är låg är det tillrådligt att förvara produkten utom räckhåll för joniserande strålning.

### **Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering**

Flaskor med kontrastmedel är inte avsedda för uttag av multipeldoser.

Gummiproppen skall aldrig genomborras mer än en gång.

Användning av lämpliga uppdragningskanyler för genomgång av gummiproppen och uppdragning av kontrastmedlet rekommenderas.

Flaskorna skall kontrolleras före användning så att de inte är skadade, att lösningen ej missfärgats eller att inga partiklar förekommer.

Hantering av injektionsflaskorna, uppdragning av kontrastmedel och administrering av lösningen skall ske under iakttagande av aseptisk teknik och med sterila sprutor.

Steril teknik skall användas vid varje spinalpunktion eller intravaskulär injektion samt med katetrar och guidewires. Då flergångsutrustning används skall särskild noggrannhet vidtagas för att undvika kontamination och spår av rengöringsmedel. Lösningen bör vid intravaskulärt och intratekalt bruk vara uppvärmd till kroppstemperatur

Kontrastmedlet bör ej dras upp i sprutan förrän omedelbart före användning.

Överblivet innehåll kasseras.

Flaskor innehållande 500 ml är avsedda för användning tillsammans med multidospumpar/autoinjektorer.

Slangset och övriga engångsdelar slängs efter varje patient. Vid arbetspassets slut slängs alla engångsdelar för injektorsystemet. Instruktionsen från tillverkaren måste följas.

Joderade kontrastmedel kan reagera med metallytor innehållande koppar t ex mässing. Utrustning i vilka lomeron kan komma i kontakt med sådana ytor skall undvikas.

## **Egenskaper hos läkemedelsformen**

Injektionsvätska, lösning.

Klar vattenlösning i färglösa injektionsflaskor av glas.

## **Förpackningsinformation**

*Injektionsvätska, lösning 150 mg I/ml (klar vattenlösning)*

10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*

*Injektionsvätska, lösning 200 mg I/ml (klar vattenlösning)*

10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*

10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*

*Injektionsvätska, lösning 250 mg I/ml (klar vattenlösning)*

10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*

10 x 200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*

*Injektionsvätska, lösning 300 mg I/ml (klar vattenlösning)*

10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
6 x 500 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*  
10 x 75 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*  
10 x 150 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*  
*Injektionsvätska, lösning 350 mg l/ml (klar vattenlösning)*  
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 150 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
6 x 500 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*  
*Injektionsvätska, lösning 400 mg l/ml (klar vattenlösning)*  
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
6 x 500 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF  
10 x 75 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*  
10 x 150 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*