

Rabisin vet.

R_x

Boehringer Ingelheim Animal Health

Injektionsvätska, suspension

(Vit homogen suspension)

Vaccin mot rabies

Djurslag:

Får

Hund

Häst

Katt

Nötkreatur

Aktiv substans:

Rabiesvirus, stam G52, inaktiverat

ATC-kod:

QI07AA02

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2023-02-01

Innehåll

1 ml (1 dos) av vaccinet innehåller: Inaktiverat rabiesvirus, stam G52 $\geq 2,09 \log_{10} OD_{50}^*$ och $\geq 1 IE^{**}$
Aluminiumhydroxid 1,7 mg (som adjuvans), GMEM-medium.

Egenskaper

Det avdödade rabiesviruset är framställt av stam G52 genom odling på NIL cellkulturer och inaktiverat med betapropiolakton och därefter adsorberat vid aluminiumhydroxid (adjuvans). 1 dos (=1 ml) innehåller 1 IE rabiesvirus. Immuniteten är helt färdigutvecklad efter 2-3 veckor. Efter omskakning fås en vit, homogen suspension.

Indikationer

För aktiv immunisering av hund, katt, häst, nötkreatur och får mot rabies.

Kontraindikationer

Injicera ej vaccinet subkutant på häst.

Försiktighet

Endast friska djur bör vaccineras.

Djuret bör inte utsättas för hårt arbete innan full immunitet har uppnåtts.

Dräktighet och laktation

Kan användas vid dräktighet och laktation.

Biverkningar

Som för alla vacciner kan en överkänslighetsreaktion uppkomma. Sådana är sällsynta och lämplig symptomatisk behandling skall då sättas in.

Injektion av vaccinet kan i enstaka fall orsaka en mindre och övergående svullnad på injektionsstället.

Dosering

Hund och katt: 1 ml subkutant eller intramuskulärt.

Nötkreatur och får: 1 ml subkutant.

Häst: 1 ml intramuskulärt. Vaccinet omskakas före användning. Injicera ej vaccinet subkutant på häst.

Djurslag	Grundvaccinering	Revaccinering
Hund	En injektion från 12 veckors ålder.	Ett år efter grundvaccinering, därefter vart 3:e år.
Katt	Två injektioner från 12 veckors ålder med 3-4 veckors intervall.	Årligen.
Häst, nötkreatur och får	En injektion fr.o.m. två månaders ålder. Djur födda av immuniserade moderdjur skall vaccineras först vid 6 månaders ålder.	Årligen.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: nötkreatur, får och häst: Noll dygn.

Mjölk: Noll dygn.

Interaktioner

Inga kända. Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat saknas. Därför bör inga andra vacciner administreras inom 14 dagar före eller efter vaccination med denna produkt.

Överdoser

Injektion av flera doser orsakar inga besvär.

Observera

Omskakas väl före användning.

Tillämpa vanlig aseptisk procedur. Använd steril utrustning.

Hållbarhet

3 år.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Vit homogen suspension

10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd