

Verruxin

EF

Karo Healthcare

Kutan lösning 200 mg/200 mg

(Kutan lösning. Ofärgad till lätt gulaktig lösning med lukt av eter.)

Övriga dermatologiska medel, Vårmedel

Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Mjölksyra

Salicylsyra

ATC-kod:

D11AF

Läkemedlet omfattas *inte* av Läkemedelsförsäkringen.

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-28.

Indikationer

För behandling av envisa och återkommande vårtor på händer och fötter samt av envisa och återkommande liktornar och förhådnader.

Kontraindikationer

Personer med känslig hud eller med perifera cirkulationsstörningar, t ex vid diabetes mellitus eller arterioskleros, skall inte själva behandla vårtor.

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Pediatrisk population

Rekommenderas inte till barn under 6 år.

Vuxna och barn över 6 år:

Vårtor

Behandla vårtan en gång om dagen enligt följande:

1. Luckra upp vårtan i varmt vatten ca 5 min.
2. Skrapa försiktigt bort lös och uppluckrad hud på vårtan med t ex fotfil avsedd endast för detta ändamål.
3. Pensla vårtan med Verruxin. Undvik att pensla hudområdet utanför vårtan.

Det tar tid att behandla vårtor. Behandlingen skall pågå till dess vårtan försvunnit helt. Har inte vårtan försvunnit efter 3 månaders behandling avbryts fortsatt behandling och läkare konsulteras.

Liktornar och förhårdnader:

Behandla liktornen eller förhårdsnaden en gång om dagen enligt följande:

1. Luckra upp liktornen eller förhårdsnaden i varmt vatten ca 5 min.
2. Skrapa försiktigt bort lös och uppluckrad hud på liktornen eller förhårdsnaden med t ex fotfil avsedd endast för detta ändamål.
3. Pensla liktornen eller förhårdsnaden med Verruxin. Undvik att pensla utanför liktornen eller förhårdsnaden.

Behandlingen skall pågå till dess liktornen eller förhårdsnaden försvunnit helt. Har inte liktornen eller förhårdsnaden försvunnit efter 2 veckors behandling avbryts fortsatt behandling och fotspecialist konsulteras.

Varningar och försiktighet

Verruxin får inte komma i kontakt med ögon och slemhinnor. Vid stänk i ögonen, ska de genast spolas med mycket vatten i 15 minuter och läkare konsulteras.

Vårtor smittar. Därför skall händerna tvättas efter beröring eller behandling av vårtor. Använd helst engångshandduk då vårtan och omgivande hud torkas. Gå ej barfota då fotvårtor konstaterats.

Verruxin skall inte användas på infekterad eller kraftigt inflammerad hud eller om sveda och ömhet uppkommer vid administreringen.

Pediatrisk population

Verruxin har en retande effekt på tunn hud hos mindre barn.

Interaktioner

Effekten av samtidig applikation av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

Graviditet

Vid användning av Verruxin kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra tas upp genom huden. Vid graviditet skall Verruxin endast användas på små hudområden.

Amning

Salicylsyra passerar över i modersmjölken men risk för påverkan på barnet synes osannolik med dessa små mängder. Verruxin kan därför användas också under amning. Undvik att barnet kommer i kontakt med behandlat hudområde.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats men förefaller osannolik vid korrekt användning.

Trafik

Verruxin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sveda och ömhet kan uppträda efter applicering av Verruxin. Vid stora besvär kan uppehåll i behandlingen göras en eller ett par dagar.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdoser

Uppgifter saknas.

Farmakodynamik

Salicylsyra verkar uppmjukande och löser upp förhårdnade celler i vårtor, liktornar och andra hudförhårdnader. Mjölksyran har en viss huduppluckrande effekt samt vattenbindande egenskaper, vilket gör det lättare för salicylsyran att lösa upp de förhårdnade cellerna. Kollodion ger en skyddande hinna runt det behandlade området.

Farmakokinetik

Uppgifter saknas.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömning utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 g lösning innehåller: 200 mg mjölksyra, 200 mg salicylsyra, kollodion (lösning av pyroxylin, etanol och eter), eter.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackningen vid högst 25° C. Tillslut förpackningen väl.

Särskilda anvisningar för destruktion

Verruxin innehåller eter och är därför brandfarligt.

Förpackningsinformation

Kutan lösning 200 mg/200 mg Kutan lösning. Ofärgad till lätt gulaktig lösning med lukt av eter.
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF