

Provera[®]

Pfizer

Tablett 250 mg

(rund, vit, skårad, 11,1 mm, märkt U403)

Medel mot tumörer, endokrint verksamt

Aktiv substans:

Medroxiprogesteronacetat

ATC-kod:

L02AB02

Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

R F

Texten nedan gäller för:

Provera[®] tablett 100 mg, 200 mg och 250 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-05-25.

Indikationer

Avancerad cancer corporis uteri.

Avancerad bröstcancer då annan hormonell terapi sviktat.

Kontraindikationer

Provera är kontraindicerat vid:

- tromboflebit och tromboemboliska komplikationer, liksom hos patienter där risken är stor att utveckla sådana tillstånd (pågående eller tidigare förmaksflimmer, klaffsjukdomar, endokardit, hjärtsvikt, lungemboli, tromboembolisk ischemisk attack (TIA), hjärninfarkt, ateroskleros, omedelbart efter operation)
- metrorragi av okänd orsak
- kraftigt nedsatt leverfunktion

- överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

Dosering

Dos som vanligen ges varierar mellan 300 och 1000 mg per dag beroende på tumörtyp.

Föreslagna doser:

- vid bröstcancer: 500 till 1000 mg dagligen
- vid cancer corporis uteri: 300 till 500 mg dagligen

Administreringssätt

Den dagliga dosen Provera, speciellt vid högdos, kan delas upp på två eller flera doser.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning

Varningar och försiktighet

- Provera ska användas under överinseende av läkare med erfarenhet av cancerterapi.
- Provera förefaller påverka blodets förmåga att koagulera. Innan behandling med Provera startar rekommenderas att förekomst av trombotiska riskfaktorer kontrolleras och att den behandlande läkaren ska vara speciellt vaksam på tidiga tecken på tromboemboli-sjukdomar. Behandlingen ska omedelbart avbrytas om någon tromboembolisk komplikation uppträder såsom huvudvärk, hjärt- eller hjärninfarkt eller synproblem (som dubbelseende, plötslig partiell eller hel synförlust, vätskelesion på retina).
- Om vaginalblödning uppkommer, måste en adekvat diagnos ställas. Om histologisk undersökning är indicerad, ska laboratoriet underrättas att patienten har fått progesteron.
- Provera i höga doser har viss adrenokortikoid aktivitet. Patienter som behandlas med höga doser Provera under långa perioder ska observeras noggrant för att upptäcka sådant som har samband med adrenokortikoid terapi, som natriumretention, ödem etc. Provera måste ges med försiktighet till patienter med högt blodtryck, migrän, njursjukdomar, hjärtsjukdomar, astma eller epilepsi, liksom till patienter med hyperlipidemi, obesitas, diabetes eller depression.
- Provera kan orsaka förhöjda nivåer av kalcium i plasma; några fall av hyperkalcemi har rapporterats vid behandling av bröstcancer.

Hjälpämnen

Provera innehåller natriumbensoat (se avsnitt 2). Bensoater kan öka nivåer av okonjugerat bilirubin genom att tränga bort bilirubin från albumin, vilket kan öka neonatal gulsot. Neonatal hyperbilirubinemi kan utvecklas till kärnikterus (ickekonjugerat bilirubin som ansamlas i hjärnvävnad) och encefalopati. Detta läkemedel är dock inte indicerat för användning hos barn, så denna varning är endast tillagd för information.

Provera innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

Interaktioner

Medroxiprogesteronacetat (MPA) metaboliseras *in vitro* i huvudsak genom hydroxylering via CYP 3A4. Inga specifika interaktionsstudier har utförts för att utvärdera de kliniska effekterna av CYP 3A4-inducerare eller -hämmare på MPA. Påverkan på MPAs plasmakoncentrationer kan förväntas vid kombination med den typen av substanser.

Graviditet

Provera tabletter ska inte ges under graviditet.

Amning

Medroxiprogesteronacetat passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Provera har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Vanligast förekommande är viktökning. Biverkningarna är beroende av dosens storlek och behandlingstidens längd.

Behandlingen ska omedelbart avbrytas om tromboemboliska komplikationer (plötslig partiell eller hel synförlust, dubbelseende, papillödem, näthinneblödning eller migrän) uppträder.

I nedanstående tabell är alla biverkningar presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens enligt följande: vanliga ($\geq 1/100$, $< 1/10$), mindre vanliga ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$), sällsynta ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem-klass	Vanliga	Mindre vanliga	Sällsynta	Ingen känd frekvens
Immunsystemet			Anafylaktisk reaktion	
Endokrina systemet	Månansikte			
Metabolism och nutrition			Hyperkalcemi	
Psykiska störningar	Sömnlöshet, nedstämdhet, nedsatt libido		Eufori, förvirring	
Centrala och perifera nervsystemet	Huvudvärk, tremor		Koncentrations-svårigheter, yrsel	
Ögon			Diabeteskatarakt, synnedsättning	
Hjärtat			Kronisk hjärtinsufficiens, takykardi	
Blodkärl	Tromboflebit		Embolism och trombos, hypertoni	
Magtarmkanalen	Kräkningar, förstoppning, illamående, dyspepsi		Diarré, muntorrhet	
Lever och gallvägar			Onormal leverfunktion, gulsot	
Hud och subkutan vävnad	Hyperhidros, acne, hirsutism		Urtikaria, klåda, alopeci, utslag, angioödem	
Njurar och urinvägar			Glukosuri	

Organsystem-klass	Vanliga	Mindre vanliga	Sällsynta	Ingen känd frekvens
Reproduktionsorgan och bröstkörtel	Bröstspänningar, dysfunktionell uterin blödning (oregelbunden, ökad, minskad, stänklödning), amenorré, dysmenorré		Erosion i livmoderhalsen, cervixflytning, galaktorré	Erektill dysfunktion
Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället	Vätskeretention,		Trötthet, allmän sjukdoms-känsla	
Undersökningar	Viktökning		Förhöjt antal vita blodkroppar, förhöjt antal trombocyter	

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdoser

Doser på upp till 3,0 g/dag har tolererats väl.

Farmakodynamik

Provera innehåller medroxiprogesteronacetat (MPA) i mikroniserad form. Verkningsmekanismen för MPA är inte helt klarlagd. Experimentella data stöder emellertid teorin att den inhiberande effekten på bröstcancer är relaterad till en inhibering av östrogenreceptorsyntesen. Svartsfrekvensen är korrelerad till den kvantitativa förekomsten av progesteron- och östrogenreceptorer. Man har också observerat en inhibering av DNA-syntesen i humana bröstcancer celler *in vitro* vid höga progesteronkoncentrationer.

Farmakokinetik

Absorption

På grund av svårslösligheten är absorptionen av peroralt MPA låg och uppvisar en stor individuell variation. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 1-4 timmar. Plasmanivåerna är proportionella mot den givna dosen.

Metabolism

Metabolismen är ofullständigt utredd. Vid oxidativ metabolism i levern bildas hydroxi-MPA som konjugeras och elimineras i galla och urin. Metaboliternas farmakologiska aktivitet är okänd.

Eliminering

Moderssubstansens halveringstid i eliminationsfasen är ca 50 timmar.

Prekliniska uppgifter

Den akuta toxiciteten av MPA var låg efter peroral eller subkutan tillförsel till gnagare.

De toxiska effekterna efter upprepad administration undersöktes på råtta, apa, kanin och hund. De huvudsakliga målorganen för toxicitet var de manliga och kvinnliga reproduktionsorganen och binjurarna. Dessutom observerades tecken på levertoxicitet, hematologisk toxicitet och lokala reaktioner.

MPA påverkar reproduktionsorganen och visade sig vid parenteral tillförsel vara teratogent hos kanin. Information saknas om tillförsel av MPA till djur under peri- och postnatalperioden.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Provera 100 mg tabletter:

En tablett innehåller 100mg medroxiprogesteronacetat.

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 0,139 mg natriumbensoat.

Provera 200mg tabletter:

En tablett innehåller 200mg medroxiprogesteronacetat

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 0,278 mg natriumbensoat.

Provera 250 mg tabletter:

En tablett innehåller 250 mg medroxiprogesteronacetat

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 0,347 mg natriumbensoat

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Majsstärkelse

Byco C

Makrogol 400

Natriumstärkelseglykollat

Natriumdokusat med natriumbensoat (E211)

magnesiumstearat

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Tablettburk av glas eller plast: 3 år

Blister: 5 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 100 mg (rund, vit, skårad, 7,9 mm, märkt U467)

100 styck blister, 461:76, F

100 styck burk, *tillhandahålls ej*

Tablett 200 mg (rund, vit, skårad, 10,3 mm märkt U320)

50 styck blister, 439:77, F

50 styck burk, *tillhandahålls ej*

Tablett 250 mg (rund, vit, skårad, 11,1 mm, märkt U403)

50 styck blister, 537:63, F

50 styck burk, *tillhandahålls ej*