

Noroseal

R_x

VM Pharma

Intramammär suspension 2,6 g
(ljusbrun suspension)

Vismutsubnitrat, tungt

Djurslag:

Nötkreatur

Aktiv substans:

Vismutsubnitrat, tungt

ATC-kod:

QG52X

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-09-12.

Innehåll

Varje 4 g intramammär spruta innehåller: Vismutsubnitrat, tungt 2,6 g, aluminiumstearat, povidonjod, flytande paraffin.

Egenskaper

Infusion av produkten i varje spene skapar en fysisk barriär mot penetrationen av bakterier och minskar därmed incidensen av nya intramammära infektioner under sintidsperioden.

Tungt vismutsubnitrat absorberas inte systemiskt från juvret, utan stannar kvar som en försegling i spenen tills den avlägsnas fysiskt (har visats på kor med en sintidsperiod på upp till 100 dagar).

Indikationer

Prevention av nya intramammära infektioner under sintidsperioden. Till kor som sannolikt kan betraktas som fria från subklinisk mastit, kan produkten vara lämplig att använda fristående för hantering av sinkor när det gäller mastitkontroll.

Valet av kor som ska behandlas med produkten ska baseras på veterinärens kliniska bedömning. Urvalskriterier kan baseras på tidigare mastit och cellräkning för enskilda kor, eller vedertagna tester för detektion av subklinisk mastit eller bakteriologisk provtagning.

Kontraindikationer

Använd inte produkten fristående till kor med klinisk eller subklinisk mastit under sinläggningsperioden. Se avsnitt Försiktighet. Använd inte under laktation.

Försiktighet

Det är bra att observera sinkor regelbundet avseende tecken på klinisk mastit. Om en förseglad juverdel utvecklar klinisk mastit, ska den påverkade delen mjölkas ut för hand innan lämplig behandling sätts in.

För att minska risken för kontamination ska man undvika att doppa sprutan i vatten. Använd sprutan endast en gång. Det är viktigt att använda en noggrann aseptisk metod när produkten administreras, eftersom produkten saknar antimikrobiell verkan.

Ge inte någon annan intramammär produkt efter administrering av produkten.

Till kor som kan ha subklinisk mastit kan produkten användas efter administrering av en antibiotikabehandling som är lämplig för sinkor till den infekterade juverdelen.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Eftersom produkten inte absorberas systemiskt efter intramammär infusion, kan produkten användas på dräktiga djur. Vid kalvning kan kalven få i sig förseglingen. Intag av produkten är ofarligt för kalven och ger inga biverkningar.

Laktation: Om produkten oavsiktligt används till en lakterande ko kan en övergående höjning av antalet somatiska celler (upp till 2-faldigt) observeras. I ett sådant fall ska förseglingen mjölkas ut manuellt, inga ytterligare försiktighetsåtgärder behövs.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Intramammär användning.

Spruta innehållet av en spruta med produkten i varje spene omedelbart efter den sista mjölkningen under laktationen (vid sinläggningen). **Massera inte** spenen eller juvret efter infusion av produkten.

Man måste vara försiktig så att inga patogener förs in i spenen, detta för att minska risken för mastit efter infusionen (aseptisk metod).

Det är mycket viktigt att spenen rengörs och desinficeras noga med kirurgsprit eller spritimpregnerade torksuddar. Spenarna ska torkas av tills torksuddarna inte längre är synligt smutsiga. Spenarna ska få torka före infusionen. Spruta in aseptiskt och undvik att smutsa ned sprutmunstycket. Efter infusion är det tillrådligt att använda lämpligt spendipp/spray.

Vid lägre temperaturer kan produkten värmas till rumstemperatur för att öka sprutbarheten.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: noll dygn. Mjölk: noll timmar.

Interaktioner

I kliniska provningar har kompatibiliteten för produkten endast påvisats med ett preparat för sinkor som innehåller kloxacillin.

Överdoser

Två gånger den rekommenderade dosen har administrerats till kor utan några kliniska biverkningar.

Observera

I kliniska fältprovningar kombinerades användning av produkten med ett långtidsverkande intramammärt antimikrobiellt medel vid sinläggningstiden. Undvik kontakt med hud eller ögon. Om kontakt med hud eller ögon skulle uppstå, tvätta det berörda området noggrant med vatten. Om irritation kvarstår, sök läkare och ta med denna information. Personer som är allergiska mot vismutsalter ska

undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Intramammär suspension 2,6 g (ljusbrun suspension)

24 x 4 gram förfylld spruta, receptbelagd