

Uniferon

Salfarm Scandinavia

Injektionsvätska, lösning 200 mg Fe³⁺/ml
(Mörkbrun, kolloidal lösning)

Järn, parenterale preparat hos svin, får, nöt och hund

Djurslag:

Får

Hund

Nötkreatur

Svin

Aktiv substans:

Järndextran

ATC-kod:

QB03AC

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-03-07.

Innehåll

1 ml innehåller: Kolloidalt komplex av hydrerat dextran och järn-(III)-hydroxid motsvarande järn 200 mg. Fenol 5 mg, vatten för injektionsvätskor till 1 ml, natriumhydroxid (pH-reglerare).

Egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Järn, parenterala preparat

Uniferon innehåller en kolloidal lågmolekylär järnförening som genom dess OH-grupp (alkohol) ger en kemiskt mättad förening. Den mättade järnföreningen ger betydligt lägre koncentrationer i blodplasma än de omättade järnföreningarna. Orsaken till detta är inte nedsatt absorption från injektionsstället utan en snabb distribution, som för järnet till depåerna i lever, mjälte och benmärg snabbare, vilket reducerar

möjligheten för transferrinerna att mättas. Efter injektion uppnås en snabb stegring i hemoglobinhalt och hematokrivärden. Injektionslösningen är isoton med fysiologiskt pH och kan därför injiceras både subkutant och intramuskulärt utan vävnadsirritation.

Indikationer

Järnbristanemi, profylaktiskt och kurativt hos svin, nötkreatur, får och tikar. Anemi i samband med och som följd av infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något av innehållsämnen.

Försiktighet

Djur med dålig vitamin E/selenstatus bör ej järnbehandlas innan bristen avhjälpes.

Dräktighet och laktation

Kan användas.

Biverkningar

Järndextran kan i mycket sällsynta fall framkalla fatala reaktioner vid injektion till spädgrisar. Genetiska faktorer samt brist på vitamin E och/eller selen anges som troliga orsaker.

Dosering

Uniferon ges subkutant eller intramuskulärt som engångsdos.

Spädgrisar: Profylaktiskt 1-5 levnadsdagen och kurativt 1 ml per gris. *Gödsvin:* 1-2 ml. *Suggor:* 3 ml. *Lamm:* 1 ml. *Får:* 2-3 ml. *Kalvar:* 2-3 ml. *Nötkreatur:* 5-8 ml. *Tikar:* 1-2 ml.

Karenstider

Slakt: 0 dygn. Mjölk: 0 dygn.

Interaktioner

Vid samtidig injektion av stora doser D-vitamin (över 50.000 IE till spädgris) och järndextran föreligger risk för kalcifylaxi.

Överdoser

Inga kända reaktioner vid överdosering.

Observera

Inga särskilda varningar finns. Inga särskilda föreskrifter finns.

Hållbarhet

3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 200 mg Fe³⁺/ml Mörkbrun, kolloidal lösning

10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptfri

5 x 100 milliliter injektionsflaska, receptfri, *tillhandahålls ej*