

## Harvoni

R (F)

### Gilead

Filmdragerad tablett 90 mg/400 mg

(Orange, diamantformad, filmdragerad tablett med måtten 19 mm x 10 mm, präglad med "GSI" på den ena sidan och med "7985" på den andra sidan.)

Virushämmande medel, direkt verkande.

### Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Ledipasvir

Sofosbuvir

### ATC-kod:

J05AP51

Läkemedel från Gilead omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.

Texten nedan gäller för:

**Harvoni** filmdragerad tablett 45 mg/200 mg och 90 mg/400 mg

**FASS-text:** Denna text är avsedd för vårdpersonal.

*Subventioneras vid förskrivning av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion. Patienten ska också följas upp i samråd med sådan läkare.*

*Texten är baserad på produktresumé: 11/2022*

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats <http://www.ema.europa.eu>.

## Indikationer

Harvoni är avsett för behandling av vuxna och pediatrika patienter från 3 års ålder med kronisk hepatit C (CHC) (se avsnitt Dosering, Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

Se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik för genotyp-specifik aktivitet mot hepatit C-virus (HCV).

## Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Samtidig administrering med rosuvastatin (se avsnitt Interaktioner).

### Användning med starka P-gp-inducerare

Samtidig administrering av läkemedel som är starka intestinala P-glykoprotein-(P-gp)-inducerare (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin och johannesört) kommer att signifikant sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och kan leda till minskad effekt av Harvoni (se avsnitt Interaktioner).

## Dosering

Behandling med Harvoni ska inledas och ske under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av patienter med CHC.

### Dosering

Rekommenderad dos av Harvoni är en tablett en gång dagligen med eller utan föda (se avsnitt Farmakokinetik).

Rekommenderad dos av Harvoni för pediatrika patienter från 3 års ålder är baserad på vikt (enligt beskrivning i tabell 2) och kan tas med eller utan föda (se avsnitt Farmakokinetik).

En granulatformulering av Harvoni finns tillgänglig för behandling av kronisk HCV-infektion hos pediatrika patienter från 3 års ålder som har svårt att svälja filmdragerade tabletter. Se produktresumén för Harvoni 33,75 mg/150 mg eller 45 mg/200 mg granulat.

Tabell 1: Rekommenderad behandlingstid för Harvoni och rekommenderad användning av samtidigt administrerat ribavirin för vissa subgrupper

| Patientpopulation<br>(inklusive patienter med samtidig hiv-infektion)                                 | Behandling och behandlingstid                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vuxna och pediatrika patienter från 3 års ålder<sup>a</sup> med CHC av genotyp 1, 4, 5 eller 6</i> |                                                                                                                                                                                                                  |
| Patienter utan cirros                                                                                 | Harvoni i 12 veckor. <ul style="list-style-type: none"><li>• Harvoni i 8 veckor kan övervägas hos tidigare obehandlade patienter infekterade med genotyp 1 (se avsnitt Farmakodynamik, studien ION-3).</li></ul> |
| Patienter med kompenserad cirros                                                                      | Harvoni + ribavirin <sup>b,c</sup> i 12 veckor eller Harvoni (utan ribavirin) i 24 veckor.                                                                                                                       |

| Patientpopulation<br>(inklusive patienter med samtidig hiv-infektion)                     | Behandling och behandlingstid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Harvoni (utan ribavirin) i 12 veckor kan övervägas för patienter som bedöms ha låg risk för klinisk sjukdomsprogression och som har efterföljande ombehandlingsalternativ (se avsnitt Varningar och försiktighet).</li> </ul>                                                                              |
| Patienter som har genomgått levertransplantation utan cirros eller med kompenserad cirros | Harvoni + ribavirin <sup>b,c</sup> i 12 veckor (se avsnitt Farmakodynamik) <ul style="list-style-type: none"> <li>Harvoni (utan ribavirin) i 12 veckor (hos patienter utan cirros) eller 24 veckor (hos patienter med cirros) kan övervägas hos patienter där behandling med ribavirin är olämplig eller som inte tolererar ribavirin.</li> </ul> |
| Patienter med dekompenenserad cirros oberoende av transplantationsstatus                  | Harvoni + ribavirin <sup>d</sup> i 12 veckor (se avsnitt Farmakodynamik). <ul style="list-style-type: none"> <li>Harvoni (utan ribavirin) i 24 veckor kan övervägas hos patienter där behandling med ribavirin är olämplig eller som inte tolererar ribavirin.</li> </ul>                                                                         |
| <i>Vuxna och pediatrika patienter från 3 års ålder med CHC av genotyp 3</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Patienter med kompenserad cirros och/eller tidigare behandlingssvikt                      | Harvoni + ribavirin <sup>b</sup> i 24 veckor (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).                                                                                                                                                                                                                                          |

a→ Se tabell 2 för rekommendationer om viktbaserad dosering av Harvoni för pediatrika patienter från 3 års ålder.

b→ Vuxna: viktbaserat ribavirin (< 75 kg = 1 000 mg och ≥ 75 kg = 1 200 mg) givet oralt fördelat på två doser med föda.

c→ Pediatrika patienter: se tabell 4 nedan för rekommendationer om dosering av ribavirin.

d→ För rekommendationer för dosering av ribavirin hos vuxna patienter med dekompenenserad cirros, se tabell 3 nedan.

**Tabell 2: Dosering för pediatrika patienter från 3 års ålder som använder Harvoni tabletter\***

| Kroppsvikt (kg) | Dosering av Harvoni tabletter                                                                    | Daglig dos av ledipasvir/sofosbuvir |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ≥ 35            | en 90 mg/400 mg tablett en gång dagligen<br>eller<br>två 45 mg/200 mg tabletter en gång dagligen | 90 mg/400 mg/dag                    |
| 17 till < 35    | en 45 mg/200 mg tablett en gång dagligen                                                         | 45 mg/200 mg/dag                    |

\* Harvoni finns också tillgängligt som granulat för användning till pediatrika patienter med CHC från 3 års ålder (se avsnitt Farmakodynamik). Tabletter rekommenderas inte för patienter som väger < 17 kg. Se produktresumén för Harvoni 33,75 mg/150 mg eller 45 mg/200 mg granulat.

**Tabell 3: Riktlinjer för dosering av ribavirin som administreras tillsammans med Harvoni till vuxna patienter med dekompenenserad cirros**

| Patient                                                       | Ribavirindos*                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Child-Pugh-Turcotte (CPT) klass B-cirros före transplantation | 1 000 mg per dag till patienter < 75 kg och 1 200 mg till patienter som väger ≥ 75 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| CPT klass C-cirros före transplantation                       | Startdos om 600 mg, som kan titreras upp till högst 1 000/1 200 mg (1 000 mg till patienter som väger < 75 kg och 1 200 mg till patienter som väger ≥ 75 kg) om behandlingen tolereras väl. Om startdosen inte tolereras väl ska dosen sänkas i enlighet med klinisk indikation på basis av hemoglobinvärdet. |
| CPT klass B- eller C-cirros efter transplantation             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* - Om en mer normaliserad dos ribavirin (efter vikt och njurfunktion) inte kan användas av skäl som t.ex. tolerabilitet, ska behandling med Harvoni + ribavirin under 24 veckor övervägas för att minska risken för recidiv.

Se även produktresumén för ribavirin då ribavirin läggs till Harvoni hos vuxna.

För pediatrika patienter från 3 års ålder rekommenderas följande dosering av ribavirin, där ribavirin ges fördelat på två dagliga doser som tas med föda:

**Tabell 4: Riktlinjer för dosering av ribavirin som administreras tillsammans med Harvoni till ungdomar från 12 till < 18 år.**

| Kroppsvikt i kg | Ribavirindos* |
|-----------------|---------------|
| <47             | 15 mg/kg/dag  |
| 47-49           | 600 mg/dag    |
| 50-65           | 800 mg/dag    |
| 66-74           | 1000 mg/dag   |
| > eller = 75    | 1200 mg/dag   |

\* Den dagliga dosen av ribavirin är viktbaserad och ges oralt fördelat på två doser med föda.

#### *Dosändring av ribavirin för vuxna som tar 1 000-1 200 mg dagligen*

Om Harvoni används i kombination med ribavirin och en patient får en allvarlig biverkning som eventuellt är relaterad till ribavirin, ska ribavirindosen ändras eller sättas ut, om det är lämpligt, till dess att biverkningen klingar av eller svårighetsgraden minskar. Tabell 4 innehåller riktlinjer för ändringar och utsättning av dosen baserade på patientens hemoglobinvärde och hjärtstatus.

**Tabell 5: Riktlinjer för dosändring av ribavirin vid samtidig administrering av Harvoni till vuxna**

| Laboratorievärden                                            | Sänk ribavirindosen till 600 mg/dag om:                                 | Sätt ut ribavirin om:                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hemoglobin hos patienter utan hjärtsjukdom                   | < 10 g/dl                                                               | < 8,5 g/dl                             |
| Hemoglobin hos patienter med stabil hjärtsjukdom i anamnesen | ≥ 2 g/dl sänkning av hemoglobin under någon 4-veckors behandlingsperiod | < 12 g/dl trots 4 veckor med sänkt dos |

När ribavirin har satts ut på grund av antingen ett avvikande laborativvärde eller en klinisk manifestation, kan ett försök göras att återinsätta ribavirin 600 mg dagligen för att sedan öka dosen ytterligare till 800 mg dagligen. Det rekommenderas dock inte att ribavirindosen ökas till den ursprungliga dosen (1 000 mg till 1 200 mg dagligen).

#### *Pediatrisk population < 3 år*

Säkerhet och effekt för Harvoni för pediatriska patienter i åldern < 3 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

#### *Missad dos*

Patienterna ska instrueras att om kräkning inträffar inom 5 timmar efter dosintag ska en ny tablett tas. Om kräkning inträffar mer än 5 timmar efter dosintag krävs ingen ytterligare dos (se avsnitt Farmakodynamik).

Vid glömd dos som upptäcks inom 18 timmar efter den normala tidpunkten ska patienten instrueras att ta tabletten så snart som möjligt och patienten ska sedan ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Om det har gått mer än 18 timmar ska patienten instrueras att vänta och ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Patienter ska instrueras att inte ta dubbel dos.

#### *Äldre*

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter (se avsnitt Farmakokinetik).

#### *Nedsatt njurfunktion*

Ingen dosjustering av Harvoni krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Det finns begränsat med säkerhetsdata om patienter med gravt nedsatt njurfunktion (uppskattad glomerulär filtrationshastighet [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) och dialyskrävande terminal njursjukdom (ESRD, *end stage renal disease*). Harvoni kan användas utan dosjustering till dessa patienter när inga andra lämpliga behandlingsalternativ finns att tillgå (Se avsnitt Varningar och försiktighet, Biverkningar, Farmakodynamik, Farmakokinetik).

#### *Nedsatt leverfunktion*

Ingen dosjustering av Harvoni krävs för patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-Turcotte [CPT] av klass A, B eller C) (se avsnitt Farmakokinetik). Säkerhet och effekt för ledipasvir/sofosbuvir har fastställts hos patienter med dekomenserad cirros (se avsnitt Farmakodynamik).

### **Administreringssätt**

För oral användning.

Patienterna ska instrueras att svälja tabletterna hela med eller utan föda. På grund av den bittra smaken bör filmdragerade tabletter inte tuggas eller krossas (se avsnitt Farmakokinetik).

## **Varningar och försiktighet**

Harvoni ska inte administreras samtidigt med andra läkemedel som innehåller sofosbuvir.

### **Genotyp-specifik aktivitet**

Beträffande rekommenderade regimer för olika HCV-genotyper, se avsnitt Dosering. Beträffande genotyp-specifik virologisk och klinisk aktivitet, se avsnitt Farmakodynamik.

De kliniska data som stöder användningen av Harvoni till vuxna infekterade med HCV av genotyp 3 är begränsade (se avsnitt Farmakodynamik). Den relativa effekten av en 12 veckors regim bestående av

ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, jämfört med en 24 veckors regim med sofosbuvir + ribavirin, har inte undersökts. En konservativ 24 veckors behandling rekommenderas för alla behandlingserfarna patienter med genotyp 3 och de behandlingsnaiva patienter med genotyp 3 som har cirros (se avsnitt Dosering). Vid genotyp 3-infektion bör användning av Harvoni (alltid i kombination med ribavirin) endast övervägas till patienter som anses ha hög risk för klinisk sjukdomsprogression och för vilka det inte finns alternativa behandlingsmöjligheter.

De kliniska data som stöder användningen av Harvoni till vuxna infekterade med HCV av genotyp 2 och 6 är begränsade (se avsnitt Farmakodynamik).

### **Allvarlig bradykardi och hjärtblock**

Livshotande fall av allvarlig bradykardi och hjärtblock har setts vid användning av regimer som innehåller sofosbuvir i kombination med amiodaron. Bradykardi har i allmänhet inträffat inom några timmar till några dagar men fall har också observerats efter längre tid, upp till två veckor efter påbörjad HCV-behandling.

Amiodaron får därför bara ges till patienter som får Harvoni när andra alternativa antiarytmibehandlingar inte tolereras eller är kontraindicerade.

Om samtidig användning av amiodaron anses nödvändig rekommenderas en hjärtövervakning av patienten på sjukhus under de första 48 timmarna av samtidig administrering. Därefter ska övervakningen av hjärtfrekvensen ske dagligen på en öppenvårdsmottagning eller av patienterna själva, åtminstone under de första två veckorna av behandlingen.

Till följd av den långa halveringstiden för amiodaron ska hjärtövervakning enligt ovanstående beskrivning även genomföras för patienter som avbrutit sin behandling med amiodaron under de senaste månaderna och som ska påbörja behandling med Harvoni.

Alla patienter som samtidigt använder eller nyligen har använt amiodaron ska varnas för symtomen på bradykardi och hjärtblock och ska uppmanas att genast uppsöka läkare om de får dessa symtom.

### **Användning till diabetespatienter**

Diabetiker kan uppleva förbättrad blodsockerkontroll, som kan leda till symtomatisk hypoglykemi, efter att behandling av HCV med direktverkande antivirala medel har inletts. Blodsockernivåerna hos diabetespatienter som påbörjar behandling med direktverkande antivirala medel ska övervakas noga, särskilt under de 3 första månaderna. Patienternas diabetesläkemedel ska justeras vid behov. Läkaren som ansvarar för patientens diabetesbehandling ska informeras när behandling med direktverkande antivirala medel påbörjas.

### **Samtidig infektion med HCV/HBV (hepatit B-virus)**

Fall av reaktivering av hepatit B-virus (HBV), vissa med dödlig utgång, har rapporterats under och efter behandling med direktverkande antivirala läkemedel. Alla patienter ska screenas för HBV innan behandling inleds. Patienter som har både HBV- och HCV-infektion löper risk för HBV-reaktivering och ska därför övervakas och behandlas i enlighet med befintlig klinisk praxis.

### **Behandling av patienter med tidigare exponering för direkt verkande virushämmande medel mot HCV**

Hos patienter med behandlingssvikt på ledipasvir/sofosbuvir ses i majoriteten av fallen selektering av NS5A-resistensmutationer som kraftigt minskar känsligheten för ledipasvir (se avsnitt Farmakodynamik). Begränsade data indikerar att sådana NS5A-mutationer inte går tillbaka vid långvarig uppföljning. Det finns för närvarande inga data som stöder effekten av ombehandling av patienter med behandlingssvikt på ledipasvir/sofosbuvir med en efterföljande regim som består av en NS5A-hämmare. På samma sätt finns det

för närvarande inga data som stöder effekten av NS3/4A-proteashämmare hos patienter med svikt på tidigare behandling som inkluderade en NS3/4A-proteashämmare. Sådana patienter kan därför vara beroende av andra läkemedelsklasser för utläkning av HCV-infektion. Följaktligen ska mer långvarig behandling övervägas för patienter med osäkra efterföljande ombehandlingsalternativ.

### **Nedsatt njurfunktion**

Det finns begränsat med säkerhetsdata om patienter med gravt nedsatt njurfunktion (uppskattad glomerulär filtrationshastighet [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) och hemodialyskrävande ESRD. Harvoni kan användas utan dosjustering till dessa patienter när inga andra lämpliga behandlingsalternativ finns att tillgå (se avsnitt Biverkningar, Farmakodynamik, Farmakokinetik). Vid användning av Harvoni i kombination med ribavirin, se även produktresumén för ribavirin för patienter med kreatininclearance (CrCl) < 50 ml/min (se avsnitt Farmakokinetik).

### **Vuxna med dekompenenserad cirros och/eller som väntar på eller har genomgått levertransplantation**

Effekten av ledipasvir/sofosbuvir hos patienter infekterade med HCV av genotyp 5 och genotyp 6 med dekompenenserad cirros och/eller som väntar på eller har genomgått levertransplantation har inte studerats. Behandling med Harvoni ska ske utifrån en bedömning av den potentiella nyttan och risken för den enskilda patienten.

### **Användning med måttliga P-gp-inducerare**

Läkemedel som är måttliga intestinala P-gp-inducerare (t.ex. oxkarbazepin) kan sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och leda till minskad terapeutisk effekt av Harvoni. Samtidig administrering av sådana läkemedel rekommenderas inte med Harvoni (se avsnitt Interaktioner).

### **Användning med vissa antiretrovirala regimer mot hiv**

Harvoni har visats öka exponeringen av tenofovir, särskilt vid användning tillsammans med en hiv-regim innehållande tenofovirdisoproxilfumarat och en farmakokinetisk förstärkare (ritonavir eller kobicistat). Säkerheten för tenofovirdisoproxilfumarat vid användning av Harvoni och en farmakokinetisk förstärkare har inte fastställts. Den potentiella risken och nyttan associerad med samtidig administrering av Harvoni och fast doskombination innehållande elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat eller tenofovirdisoproxilfumarat administrerat tillsammans med en boosterad hiv-proteashämmare (t.ex. atazanavir eller darunavir) bör beaktas, särskilt hos patienter med ökad risk för njurdysfunktion. Patienter som får Harvoni samtidigt med elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat eller med tenofovirdisoproxilfumarat och en boosterad hiv-proteashämmare ska övervakas för tenofovirassocierade biverkningar. Se produktresumén för tenofovirdisoproxilfumarat, emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat eller elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat för rekommendationer om njurövervakning.

### **Användning med HMG-CoA-reduktashämmare**

Samtidig administrering av Harvoni och HMG-CoA-reduktashämmare (statiner) kan signifikant öka koncentrationen av statinet, vilket ökar risken för myopati och rabdomyolys (se avsnitt Interaktioner).

### **Pediatrisk population**

Harvoni rekommenderas inte för användning till pediatriska patienter < 3 år eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts hos denna population.

### **Hjälpämnen**

Harvoni innehåller azofärgämnet para-orange (E110), som kan orsaka allergiska reaktioner. Det innehåller också laktos. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## Interaktioner

Eftersom Harvoni innehåller ledipasvir och sofosbuvir kan alla interaktioner som har identifierats med dessa aktiva substanser förekomma med Harvoni.

### Harvonis potential att påverka andra läkemedel

Ledipasvir är en *in vitro*-hämmare av läkemedelstransportproteinet P-gp och bröstcancerresistensprotein (BCRP) och kan öka den intestinala absorptionen av samtidigt administrerade substrat för dessa transportörer.

### Andra läkemedels potential att påverka Harvoni

Ledipasvir och sofosbuvir är substrat för läkemedelstransportörerna P-gp och BCRP medan GS-331007 inte är det.

Läkemedel som är starka P-gp-inducerare (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin och johannesört) kan signifikant sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och medföra minskad terapeutisk effekt av ledipasvir/sofosbuvir och är därför kontraindicerade med Harvoni (se avsnitt Kontraindikationer). Läkemedel som är måttliga intestinala P-gp-inducerare (t.ex. oxkarbazepin) kan sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och leda till minskad terapeutisk effekt av Harvoni. Samtidig administrering med sådana läkemedel rekommenderas inte med Harvoni (se avsnitt Varningar och försiktighet). Samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-gp och/eller BCRP kan öka plasmakoncentrationer av ledipasvir och sofosbuvir utan att öka plasmakoncentrationen av GS-331007. Harvoni kan administreras samtidigt med P-gp- och/eller BCRP-hämmare. Kliniskt betydelsefulla läkemedelsinteraktioner med ledipasvir/sofosbuvir medierade av CYP450- eller UGT1A1-enzymerna förväntas inte.

### Patienter som behandlas med vitamin K-antagonister

Eftersom leverfunktionen kan förändras under behandling med Harvoni, rekommenderas en noggrann övervakning av värdena för INR (International Normalised Ratio).

### Effekten av direktverkande antiviral behandling på läkemedel som metaboliseras av levern

Farmakokinetiken hos läkemedel som metaboliseras av levern (t.ex. immunhämmande medel som kalcineurinhämmare) kan påverkas av förändringar av leverfunktionen vid behandling med direktverkande antivirala läkemedel, relaterade till eliminering av hepatit C-virus.

### Interaktioner mellan Harvoni och andra läkemedel

Tabell 6 innehåller en lista med fastställda eller potentiella kliniskt betydelsefulla läkemedelsinteraktioner (där 90 % konfidensintervall [KI] för kvoten för geometriska minstakvadratmedelvärdena låg inom "↔", låg över "↑" eller låg under "↓" de förutbestämda ekvivalensgränserna). De läkemedelsinteraktioner som beskrivs bygger på studier utförda med antingen ledipasvir/sofosbuvir eller ledipasvir och sofosbuvir som enskilda substanser eller är förutsedda läkemedelsinteraktioner som kan förekomma med ledipasvir/sofosbuvir. Tabellen är inte heltäckande.

Tabell 6: Interaktioner mellan Harvoni och andra läkemedel

| Läkemedel efter terapeutiskt område                                                                                                                                                                                                                                     | Effekt på läkemedelsnivåer. Genomsnittlig kvot (90 % konfidensintervall) för AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> <sup>a,b</sup>                                                                                                                                                | Rekommendation avseende samtidig administrering med Harvoni                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYRAREducerande LÄKEMEDEL                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ledipasvirs löslighet minskar när pH ökar. Läkemedel som ökar pH i magsäcken förväntas sänka koncentrationen av ledipasvir.                                                                            |
| Antacida                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| t.ex. aluminium- eller magnesiumhydroxid; kalciumkarbonat                                                                                                                                                                                                               | Inga interaktionsstudier har utförts.<br>Förväntat:<br>↓ Ledipasvir<br>↔ Sofosbuvir<br>↔ GS-331007<br><br>(Ökat pH i magsäcken)                                                                                                                                                     | Det bör gå 4 timmar mellan administrering av antacida och Harvoni.                                                                                                                                     |
| H <sub>2</sub> -receptorantagonister                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| Famotidin (40 mg engångsdos)/ ledipasvir (90 mg engångsdos) <sup>c</sup> / sofosbuvir (400 mg engångsdos) <sup>c, d</sup><br><br>Famotidin doserat samtidigt med Harvoni <sup>d</sup><br><br>Cimetidin <sup>e</sup><br>Nizatidin <sup>e</sup><br>Ranitidin <sup>e</sup> | Ledipasvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,80 (0,69; 0,93)<br>↔ AUC 0,89 (0,76; 1,06)<br><br>Sofosbuvir<br>↑ C <sub>max</sub> 1,15 (0,88; 1,50)<br>↔ AUC 1,11 (1,00; 1,24)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,06 (0,97; 1,14)<br>↔ AUC 1,06 (1,02; 1,11)<br><br>(Ökat pH i magsäcken) | H <sub>2</sub> -receptorantagonister kan administreras samtidigt med eller med ett tidsintervall från Harvoni vid en dos som inte överstiger doser jämförbara med famotidin 40 mg två gånger dagligen. |
| Famotidin (40 mg engångsdos)/ ledipasvir (90 mg engångsdos) <sup>c</sup> / sofosbuvir (400 mg engångsdos) <sup>c, d</sup><br><br>Famotidin doserat 12 timmar före Harvoni <sup>d</sup>                                                                                  | Ledipasvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,83 (0,69; 1,00)<br>↔ AUC 0,98 (0,80; 1,20)<br><br>Sofosbuvir<br>↔ C <sub>max</sub> 1,00 (0,76; 1,32)<br>↔ AUC 0,95 (0,82; 1,10)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,13 (1,07; 1,20)<br>↔ AUC 1,06 (1,01; 1,12)<br><br>(Ökat pH i magsäcken) |                                                                                                                                                                                                        |
| Protonpumpshämmare                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |

| Läkemedel efter terapeutiskt område                                                                                                                                                                                                                                                                        | Effekt på läkemedelsnivåer.<br>Genomsnittlig kvot (90 %<br>konfidsintervall) för AUC, C <sub>max</sub> ,<br>C <sub>min</sub> <sup>a,b</sup>                                                                                                                                         | Rekommendation avseende<br>samtidig administrering med<br>Harvoni                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omeprazol<br>(20 mg en gång dagligen)/<br>ledipasvir (90 mg engångsdos) <sup>c</sup> /<br>sofosbuvir (400 mg engångsdos) <sup>c</sup><br><br>Omeprazol doserat samtidigt med<br>Harvoni<br><br>Lansoprazol <sup>e</sup><br>Rabeprazol <sup>e</sup><br>Pantoprazol <sup>e</sup><br>Esomeprazol <sup>e</sup> | Ledipasvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,89 (0,61; 1,30)<br>↓ AUC 0,96 (0,66; 1,39)<br><br>Sofosbuvir<br>↔ C <sub>max</sub> 1,12 (0,88; 1,42)<br>↔ AUC 1,00 (0,80; 1,25)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,14 (1,01; 1,29)<br>↔ AUC 1,03 (0,96; 1,12)<br><br>(Ökat pH i magsäcken) | Doser av protonpumpshämmare jämförbara med omeprazol 20 mg kan administreras samtidigt med Harvoni. Protonpumpshämmare ska inte tas före Harvoni. |

| <b>ANTIARYTMIKA</b>    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiodaron              | Effekt på amiodaron- sofosbuvir- och ledipasvirkoncentrationer är okänd.                                                                        | Samtidig administrering av amiodaron och en behandling som innehåller sofosbuvir kan leda till allvarlig symtomatisk bradykardi. Använd endast om inga andra alternativ finns. Noga övervakning rekommenderas om detta läkemedel administreras med Harvoni (se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar). |
| Digoxin                | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↑ Digoxin<br>↔ Ledipasvir<br>↔ Sofosbuvir<br>↔ GS-331007<br><br>(Hämning av P-gp) | Samtidig administrering av Harvoni med digoxin kan öka koncentrationen av digoxin. Försiktighet krävs och monitorering av terapeutisk koncentration av digoxin rekommenderas vid samtidig administrering med Harvoni.                                                                                                |
| <b>ANTIKOAGULANTIA</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dabigatranetexilat     | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↑ Dabigatran<br>↔ Ledipasvir<br>↔ Sofosbuvir<br>↔ GS-331007                       | Klinisk övervakning avseende tecken på blödning och anemi, rekommenderas när dabigatranetexilat administreras samtidigt med Harvoni. Ett koagulationstest bidrar till att identifiera patienter med ökad                                                                                                             |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | (Hämning av P-gp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | blödningsrisk på grund av ökad dabigatranexponering.                                                                                                                                                                                                            |
| Vitamin K-antagonister                                                           | Inga interaktionsstudier har utförts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Noggrann övervakning av INR rekommenderas med alla vitamin K-antagonister. Detta beror på förändringar i leverfunktionen under behandling med Harvoni.                                                                                                          |
| <b>ANTIEPILEPTIKA</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fenobarbital<br>Fenytoin                                                         | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↓ Ledipasvir<br>↓ Sofosbuvir<br>↔ GS-331007<br><br>(Induktion av P-gp)                                                                                                                                                                                                                   | Harvoni är kontraindicerat med fenobarbital och fenytoin (se avsnitt Kontraindikationer).                                                                                                                                                                       |
| Karbamazepin                                                                     | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↓ Ledipasvir<br><br><i>Observerat:</i><br>Sofosbuvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,52 (0,43; 0,62)<br>↓ AUC 0,52 (0,46; 0,59)<br>C <sub>min</sub> (NA)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,04 (0,97; 1,11)<br>↔ AUC 0,99 (0,94; 1,04)<br>C <sub>min</sub> (NA)<br><br>(Induktion av P-gp) | Harvoni är kontraindicerat med karbamazepin (se avsnitt Kontraindikationer).                                                                                                                                                                                    |
| Oxkarbazepin                                                                     | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↓ Ledipasvir<br>↓ Sofosbuvir<br>↔ GS-331007<br><br>(Induktion av P-gp)                                                                                                                                                                                                                   | Samtidig administrering av Harvoni med oxkarbazepin förväntas sänka koncentrationen av ledipasvir och sofosbuvir och leda till minskad terapeutisk effekt av Harvoni. Sådan samtidig administrering rekommenderas inte (se avsnitt Varningar och försiktighet). |
| <b>ANTIMYKOBAKTERIELLA MEDEL</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rifampicin (600 mg en gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg engångsdos) <sup>d</sup> | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>Rifampicin<br>↔ C <sub>max</sub><br>↔ AUC<br>↔ C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                          | Harvoni är kontraindicerat med rifampicin (se avsnitt Kontraindikationer).                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <i>Observerat:</i><br>Ledipasvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,65 (0,56; 0,76)<br>↓ AUC 0,41 (0,36; 0,48)<br><br>(Induktion av P-gp)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| Rifampicin (600 mg en gång dagligen)/ sofosbuvir (400 mg engångsdos) <sup>d</sup> | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>Rifampicin<br>↔ C <sub>max</sub><br>↔ AUC<br>↔ C <sub>min</sub><br><br><i>Observerat:</i><br>Sofosbuvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,23 (0,19; 0,29)<br>↓ AUC 0,28 (0,24; 0,32)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,23 (1,14; 1,34)<br>↔ AUC 0,95 (0,88; 1,03)<br><br>(Induktion av P-gp) |                                                                                                                                       |
| Rifabutin                                                                         | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↓ Ledipasvir<br><br><i>Observerat:</i><br>Sofosbuvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,64 (0,53; 0,77)<br>↓ AUC 0,76 (0,63; 0,91)<br>C <sub>min</sub> (NA)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,15 (1,03; 1,27)<br>↔ AUC 1,03 (0,95; 1,12)<br>C <sub>min</sub> (NA)<br><br>(Induktion av P-gp)  | Harvoni är kontraindicerat med rifabutin (se avsnitt Kontraindikationer).                                                             |
| Rifapentin                                                                        | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↓ Ledipasvir<br>↓ Sofosbuvir<br>↔ GS-331007                                                                                                                                                                                                                                               | Samtidig administrering av Harvoni med rifapentin förväntas sänka koncentrationen av ledipasvir och sofosbuvir och medföra minskad te |

|                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | (Induktion av P-gp)                                                                                                      | rapeutisk effekt av Harvoni. Sådan samtidig administrering rekommenderas inte. |
| <b>SEDATIVA/HYPNOTIKA</b>                                       |                                                                                                                          |                                                                                |
| Midazolam (2,5 mg engångsdos)/<br>ledipasvir (90 mg engångsdos) | <i>Observerat:</i><br>Midazolam<br>↔ C <sub>max</sub> 1,07 (1,00; 1,14)<br>↔ AUC 0,99 (0,95; 1,04)<br>(Hämning av CYP3A) | Ingen dosjustering av Harvoni eller midazolam krävs.                           |
| Ledipasvir (90 mg en gång dagligen)                             | Midazolam<br>↔ C <sub>max</sub> 0,95 (0,87; 1,04)<br>↔ AUC 0,89 (0,84; 0,95)<br>(Induktion av CYP3A)                     |                                                                                |
|                                                                 | <i>Förväntat:</i><br>↔ Sofosbuvir<br>↔ GS-331007                                                                         |                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANTIVIRALA HIV-LÄKEMEDEL: OMVÄNDA TRANSKRIPTASHÄMMARE</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| Efavirenz/ emtricitabin/<br>tenofoviridisoproxilfumarat<br>(600 mg/ 200 mg/ 300 mg/ en<br>gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg<br>en gång dagligen) <sup>c</sup> / sofosbuvir<br>(400 mg en gång dagligen) <sup>c, d</sup> | Efavirenz<br>↔ C <sub>max</sub> 0,87 (0,79; 0,97)<br>↔ AUC 0,90 (0,84; 0,96)<br>↔ C <sub>min</sub> 0,91 (0,83; 0,99)<br><br>Emtricitabin<br>↔ C <sub>max</sub> 1,08 (0,97; 1,21)<br>↔ AUC 1,05 (0,98; 1,11)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,04 (0,98; 1,11)<br><br>Tenofovir<br>↑ C <sub>max</sub> 1,79 (1,56; 2,04)<br>↑ AUC 1,98 (1,77; 2,23)<br>↑ C <sub>min</sub> 2,63 (2,32; 2,97)<br><br>Ledipasvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,66 (0,59; 0,75)<br>↓ AUC 0,66 (0,59; 0,75)<br>↓ C <sub>min</sub> 0,66 (0,57; 0,76)<br><br>Sofosbuvir<br>↔ C <sub>max</sub> 1,03 (0,87; 1,23)<br>↔ AUC 0,94 (0,81; 1,10)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 0,86 (0,76; 0,96) | Ingen dosjustering av Harvoni eller efavirenz/ emtricitabin/ tenofoviridisoproxilfumarat krävs. |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | ↔ AUC 0,90 (0,83; 0,97)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,07 (1,02; 1,13)                                                             |                                                                                                 |
| Emtricitabin/ rilpivirin/ tenofovirdisoproxilfumarat (200 mg/ 25 mg/ 300 mg en gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg en gång dagligen) <sup>c</sup> / sofosbuvir (400 mg en gång dagligen) <sup>c, d</sup> | <p>Emtricitabin</p> ↔ C <sub>max</sub> 1,02 (0,98; 1,06)<br>↔ AUC 1,05 (1,02; 1,08)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,06 (0,97; 1,15) | Ingen dosjustering av Harvoni eller emtricitabin/ rilpivirin/ tenofovirdisoproxilfumarat krävs. |
|                                                                                                                                                                                                        | <p>Rilpivirin</p> ↔ C <sub>max</sub> 0,97 (0,88; 1,07)<br>↔ AUC 1,02 (0,94; 1,11)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,12 (1,03; 1,21)   |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        | <p>Tenofovir</p> ↔ C <sub>max</sub> 1,32 (1,25; 1,39)<br>↑ AUC 1,40 (1,31; 1,50)<br>↑ C <sub>min</sub> 1,91 (1,74; 2,10)    |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        | <p>Ledipasvir</p> ↔ C <sub>max</sub> 1,01 (0,95; 1,07)<br>↔ AUC 1,08 (1,02; 1,15)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,16 (1,08; 1,25)   |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        | <p>Sofosbuvir</p> ↔ C <sub>max</sub> 1,05 (0,93; 1,20)<br>↔ AUC 1,10 (1,01; 1,21)                                           |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        | <p>GS-331007</p> ↔ C <sub>max</sub> 1,06 (1,01; 1,11)<br>↔ AUC 1,15 (1,11; 1,19)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,18 (1,13; 1,24)    |                                                                                                 |
| Abakavir/ lamivudin (600 mg/ 300 mg en gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg en gång dagligen) <sup>c</sup> / sofosbuvir (400 mg en gång dagligen) <sup>c, d</sup>                                         | <p>Abakavir</p> ↔ C <sub>max</sub> 0,92 (0,87; 0,97)<br>↔ AUC 0,90 (0,85; 0,94)                                             | Ingen dosjustering av Harvoni eller abakavir/lamivudin krävs.                                   |
|                                                                                                                                                                                                        | <p>Lamivudin</p> ↔ C <sub>max</sub> 0,93 (0,87; 1,00)<br>↔ AUC 0,94 (0,90; 0,98)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,12 (1,05; 1,20)    |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        | <p>Ledipasvir</p> ↔ C <sub>max</sub> 1,10 (1,01; 1,19)<br>↔ AUC 1,18 (1,10; 1,28)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,26 (1,17; 1,36)   |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        | <p>Sofosbuvir</p>                                                                                                           |                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | ↔ C <sub>max</sub> 1,08 (0,85; 1,35)<br>↔ AUC 1,21 (1,09; 1,35)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,00 (0,94; 1,07)<br>↔ AUC 1,05 (1,01; 1,09)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,08 (1,01; 1,14) |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| <b>ANTIVIRALA HIV-LÄKEMEDEL: HIV-PROTEASHÄMMARE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atazanavir boostrat med ritonavir (300 mg/ 100 mg en gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg en gång dagligen) <sup>c</sup> / sofosbuvir (400 mg en gång dagligen) <sup>c, d</sup>                                                                                                                     | Atazanavir<br>↔ C <sub>max</sub> 1,07 (1,00; 1,15)<br>↔ AUC 1,33 (1,25; 1,42)<br>↑ C <sub>min</sub> 1,75 (1,58; 1,93)<br><br>Ledipasvir<br>↑ C <sub>max</sub> 1,98 (1,78; 2,20)<br>↑ AUC 2,13 (1,89; 2,40)<br>↑ C <sub>min</sub> 2,36 (2,08; 2,67)<br><br>Sofosbuvir<br>↔ C <sub>max</sub> 0,96 (0,88; 1,05)<br>↔ AUC 1,08 (1,02; 1,15)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,13 (1,08; 1,19)<br>↔ AUC 1,23 (1,18; 1,29)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,28 (1,21; 1,36) | Ingen dosjustering av Harvoni eller atazanavir (ritonavirboostrat) krävs.<br>Beträffande kombinationen tenofovir/emtricitabin + atazanavir/ritonavir, se nedan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Atazanavir boostrat med ritonavir (300 mg/ 100 mg en gång dagligen) + emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfumarat (200 mg/ 300 mg en gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg en gång dagligen) <sup>c</sup> / sofosbuvir (400 mg en gång dagligen) <sup>c, d</sup><br><br>Doserade samtidigt <sup>f</sup> | Atazanavir<br>↔ C <sub>max</sub> 1,07 (0,99; 1,14)<br>↔ AUC 1,27 (1,18; 1,37)<br>↑ C <sub>min</sub> 1,63 (1,45; 1,84)<br><br>Ritonavir<br>↔ C <sub>max</sub> 0,86 (0,79; 0,93)<br>↔ AUC 0,97 (0,89; 1,05)<br>↑ C <sub>min</sub> 1,45 (1,27; 1,64)<br><br>Emtricitabin<br>↔ C <sub>max</sub> 0,98 (0,94; 1,02)<br>↔ AUC 1,00 (0,97; 1,04)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,04 (0,96; 1,12)<br><br>Tenofovir<br>↑ C <sub>max</sub> 1,47 (1,37; 1,58)                           | Vid administrering av tenofovirdisoproxilfumarat använt tillsammans med atazanavir/ritonavir ökar Harvoni koncentrationen av tenofovir.<br><br>Säkerheten för tenofovirdisoproxilfumarat vid användning av Harvoni och en farmakokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.<br><br>Kombinationen ska användas med försiktighet med noggrann njurövervakning, om inga andra alternativ är tillgängliga (se avsnitt Varningar och försiktighet). |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>↔ AUC 1,35 (1,29; 1,42)<br/> ↑ C<sub>min</sub> 1,47 (1,38; 1,57)</p> <p>Ledipasvir<br/> ↑ C<sub>max</sub> 1,68 (1,54; 1,84)<br/> ↑ AUC 1,96 (1,74; 2,21)<br/> ↑ C<sub>min</sub> 2,18 (1,91; 2,50)</p> <p>Sofosbuvir<br/> ↔ C<sub>max</sub> 1,01 (0,88; 1,15)<br/> ↔ AUC 1,11 (1,02; 1,21)</p> <p>GS-331007<br/> ↔ C<sub>max</sub> 1,17 (1,12; 1,23)<br/> ↔ AUC 1,31 (1,25; 1,36)<br/> ↑ C<sub>min</sub> 1,42 (1,34; 1,49)</p> | Koncentrationen av atazanavir ökar också med risk för förhöjda bilirubinnivåer/ikterus. Den risken är ännu högre om ribavirin används som del i HCV-behandling en.                                  |
| Darunavir boostrat med ritonavir (800 mg/ 100 mg en gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg en gång dagligen) <sup>d</sup>                                                                                                                                      | <p>Darunavir<br/> ↔ C<sub>max</sub> 1,02 (0,88; 1,19)<br/> ↔ AUC 0,96 (0,84; 1,11)<br/> ↔ C<sub>min</sub> 0,97 (0,86; 1,10)</p> <p>Ledipasvir<br/> ↑ C<sub>max</sub> 1,45 (1,34; 1,56)<br/> ↑ AUC 1,39 (1,28; 1,49)<br/> ↑ C<sub>min</sub> 1,39 (1,29; 1,51)</p>                                                                                                                                                                 | <p>Ingen dosjustering av Harvoni eller darunavir (ritonavirboostrat) krävs.</p> <p>Beträffande kombinationen tenofovir/emtricitabin + darunavir/ritonavir, se nedan.</p>                            |
| Darunavir boostrat med ritonavir (800 mg/ 100 mg en gång dagligen)/ sofosbuvir (400 mg en gång dagligen)                                                                                                                                                  | <p>Darunavir<br/> ↔ C<sub>max</sub> 0,97 (0,94; 1,01)<br/> ↔ AUC 0,97 (0,94; 1,00)<br/> ↔ C<sub>min</sub> 0,86 (0,78; 0,96)</p> <p>Sofosbuvir<br/> ↑ C<sub>max</sub> 1,45 (1,10; 1,92)<br/> ↑ AUC 1,34 (1,12; 1,59)</p> <p>GS-331007<br/> ↔ C<sub>max</sub> 0,97 (0,90; 1,05)<br/> ↔ AUC 1,24 (1,18; 1,30)</p>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| Darunavir boostrat med ritonavir (800 mg/ 100 mg en gång dagligen)/ + emtricitabin/ tenofovirdisoproxilfumarat (200 mg/ 300 mg en gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg en gång dagligen) <sup>c</sup> / sofosbuvir (400 mg en gång dagligen) <sup>c, d</sup> | <p>Darunavir<br/> ↔ C<sub>max</sub> 1,01 (0,96; 1,06)<br/> ↔ AUC 1,04 (0,99; 1,08)<br/> ↔ C<sub>min</sub> 1,08 (0,98; 1,20)</p> <p>Ritonavir<br/> ↔ C<sub>max</sub> 1,17 (1,01; 1,35)<br/> ↔ AUC 1,25 (1,15; 1,36)</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>Vid administrering med darunavir/ritonavir använt tillsammans med tenofovirdisoproxilfumarat ökar Harvoni koncentrationen av tenofovir.</p> <p>Säkerheten för tenofovirdisoproxilfumarat vid</p> |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doserade samtidigt <sup>f</sup>                                             | <p>↑ C<sub>min</sub> 1,48 (1,34; 1,63)</p> <p>Emtricitabin</p> <p>↔ C<sub>max</sub> 1,02 (0,96; 1,08)</p> <p>↔ AUC 1,04 (1,00; 1,08)</p> <p>↔ C<sub>min</sub> 1,03 (0,97; 1,10)</p> <p>Tenofovir</p> <p>↑ C<sub>max</sub> 1,64 (1,54; 1,74)</p> <p>↑ AUC 1,50 (1,42; 1,59)</p> <p>↑ C<sub>min</sub> 1,59 (1,49; 1,70)</p> <p>Ledipasvir</p> <p>↔ C<sub>max</sub> 1,11 (0,99; 1,24)</p> <p>↔ AUC 1,12 (1,00; 1,25)</p> <p>↔ C<sub>min</sub> 1,17 (1,04; 1,31)</p> <p>Sofosbuvir</p> <p>↓ C<sub>max</sub> 0,63 (0,52; 0,75)</p> <p>↓ AUC 0,73 (0,65; 0,82)</p> <p>GS-331007</p> <p>↔ C<sub>max</sub> 1,10 (1,04; 1,16)</p> <p>↔ AUC 1,20 (1,16; 1,24)</p> <p>↔ C<sub>min</sub> 1,26 (1,20; 1,32)</p> | <p>användning av Harvoni och en far makokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.</p> <p>Kombinationen ska användas med försiktighet med noggrann njurövervakning, om inga andra alternativ är tillgängliga (se avsnitt Varningar och försiktighet).</p>                                                                                                                                                                                             |
| Lopinavir boosterat med ritonavir + emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat | <p>Inga interaktionsstudier har utförts.</p> <p><i>Förväntat:</i></p> <p>↑ Lopinavir</p> <p>↑ Ritonavir</p> <p>↔ Emtricitabin</p> <p>↑ Tenofovir</p> <p>↑ Ledipasvir</p> <p>↔ Sofosbuvir</p> <p>↔ GS-331007</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Vid administrering av lopinavir/ritonavir använt tillsammans med tenofovirdisoproxilfumarat ökar Harvoni koncentrationen av tenofovir.</p> <p>Säkerheten för tenofovirdisoproxilfumarat vid användning av Harvoni och en far makokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.</p> <p>Kombinationen ska användas med försiktighet med noggrann njurövervakning, om inga andra alternativ är tillgängliga (se avsnitt Varningar och försiktighet).</p> |
| Tipranavir boosterat med ritonavir                                          | <p>Inga interaktionsstudier har utförts.</p> <p><i>Förväntat:</i></p> <p>↓ Ledipasvir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Samtidig administrering av Harvoni med tipranavir (ritonavirboosterat) förväntas sänka koncentrationen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                        |                                                                                                                 |
|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ↓ Sofosbuvir<br>↔ GS-331007<br><br>(Induktion av P-gp) | av ledipasvir och medföra minskad terapeutisk effekt av Harvoni.<br>Samtidig administrering rekommenderas inte. |
|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>ANTIVIRALA HIV-LÄKEMEDEL: INTEGRASHÄMMARE</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raltegravir<br>(400 mg två gånger dagligen)/<br>ledipasvir (90 mg en gång dagligen) <sup>d</sup>                                                                                                                                    | Raltegravir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,82 (0,66; 1,02)<br>↔ AUC 0,85 (0,70; 1,02)<br>↑ C <sub>min</sub> 1,15 (0,90; 1,46)<br><br>Ledipasvir<br>↔ C <sub>max</sub> 0,92 (0,85; 1,00)<br>↔ AUC 0,91 (0,84; 1,00)<br>↔ C <sub>min</sub> 0,89 (0,81; 0,98)                                                                                                                                                                                     | Ingen dosjustering av Harvoni eller raltegravir krävs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raltegravir<br>(400 mg två gånger dagligen)/<br>sofosbuvir (400 mg en gång dagligen) <sup>d</sup>                                                                                                                                   | Raltegravir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,57 (0,44; 0,75)<br>↓ AUC 0,73 (0,59; 0,91)<br>↔ C <sub>min</sub> 0,95 (0,81; 1,12)<br><br>Sofosbuvir<br>↔ C <sub>max</sub> 0,87 (0,71; 1,08)<br>↔ AUC 0,95 (0,82; 1,09)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 1,09 (0,99; 1,19)<br>↔ AUC 1,02 (0,97; 1,08)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elvitegravir/ kobicistat/<br>emtricitabin/<br>tenofovirdisoproxilfumarat<br>(150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 300 mg en gång dagligen)/ ledipasvir (90 mg en gång dagligen) <sup>c</sup> / sofosbuvir (400 mg en gång dagligen) <sup>c</sup> | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↔ Emtricitabin<br>↑ Tenofovir<br><br><i>Observerat:</i><br>Elvitegravir<br>↔ C <sub>max</sub> 0,88 (0,82; 0,95)<br>↔ AUC 1,02 (0,95; 1,09)<br>↑ C <sub>min</sub> 1,36 (1,23; 1,49)<br><br>Kobicistat<br>↔ C <sub>max</sub> 1,25 (1,18; 1,32)<br>↑ AUC 1,59 (1,49; 1,70)<br>↑ C <sub>min</sub> 4,25 (3,47; 5,22)<br><br>Ledipasvir<br>↑ C <sub>max</sub> 1,63 (1,51; 1,75) | Vid administrering med elvitegravir/ kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat förväntas Harvoni öka koncentrationen av tenofovir.<br><br>Säkerheten för tenofovirdisoproxilfumarat vid användning av Harvoni och en farmakokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.<br><br>Kombinationen ska användas med försiktighet med noggrann njurövervakning, om inga andra alternativ är tillgängliga (se avsnitt Varningar och försiktighet). |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | <p>↑ AUC 1,78 (1,64; 1,94)<br/> ↑ C<sub>min</sub> 1,91 (1,76; 2,08)</p> <p>Sofosbuvir<br/> ↑ C<sub>max</sub> 1,33 (1,14; 1,56)<br/> ↑ AUC 1,36 (1,21; 1,52)</p> <p>GS-331007<br/> ↑ C<sub>max</sub> 1,33 (1,22; 1,44)<br/> ↑ AUC 1,44 (1,41; 1,48)<br/> ↑ C<sub>min</sub> 1,53 (1,47; 1,59)</p> |                           |
| Dolutegravir | <p>Inga interaktionsstudier har utförts.<br/> <i>Förväntat:</i><br/> ↔ Dolutegravir<br/> ↔ Ledipasvir<br/> ↔ Sofosbuvir<br/> ↔ GS-331007</p>                                                                                                                                                    | Ingen dosjustering krävs. |

| <b>VÅXTBASERADE LÄKEMEDEL</b>  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johannesört                    | <p>Inga interaktionsstudier har utförts.<br/> <i>Förväntat:</i><br/> ↓ Ledipasvir<br/> ↓ Sofosbuvir<br/> ↔ GS-331007</p> <p>(Induktion av P-gp)</p> | Harvoni är kontraindicerat med johannesört (se avsnitt Kontraindikationer).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>HMG-CoA-REDUKTASHÄMMARE</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rosuvastatin <sup>9</sup>      | <p>↑ Rosuvastatin</p> <p>(Hämning av läkemedelstransportörerna OATP och BCRP)</p>                                                                   | <p>Samtidig administrering av Harvoni med rosuvastatin kan signifikant öka koncentrationen av rosuvastatin (flerfaldig ökning av AUC), vilket är associerat med ökad risk för myopati, inklusive rabdomyolys.</p> <p>Samtidig administrering av Harvoni med rosuvastatin är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).</p> |
| Pravastatin <sup>9</sup>       | <p>↑ Pravastatin</p>                                                                                                                                | <p>Samtidig administrering av Harvoni med pravastatin kan signifikant öka koncentrationen av pravastatin, vilket är associerat med ökad risk för myopati. Klinisk och biokemisk kontroll rekommenderas för dessa patienter och en dosjustering kan bli nödvändig (se avsnitt Varningar och försiktighet).</p>                    |
| Andra statiner                 | <p><i>Förväntat:</i><br/> ↑ Statiner</p>                                                                                                            | Interaktioner med andra HMG-CoA-reduktashämmare kan                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inte uteslutas. Vid samtidig administrering med Harvoni ska sänkt statindos övervägas och noggrann övervakning med avseende på statinbiverkningar genomföras (se avsnitt Varningar och försiktighet). |
| <b>NARKOTISKA ANALGETIKA</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| Metadon                                                                                                                   | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↔ Ledipasvir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ingen dosjustering av Harvoni eller metadon krävs.                                                                                                                                                    |
| Metadon<br>(underhållsbehandling med metadon [30 till 130 mg/dagligen])/sofosbuvir (400 mg en gång dagligen) <sup>d</sup> | R-metadon<br>↔ C <sub>max</sub> 0,99 (0,85; 1,16)<br>↔ AUC 1,01 (0,85; 1,21)<br>↔ C <sub>min</sub> 0,94 (0,77; 1,14)<br><br>S-metadon<br>↔ C <sub>max</sub> 0,95 (0,79; 1,13)<br>↔ AUC 0,95 (0,77; 1,17)<br>↔ C <sub>min</sub> 0,95 (0,74; 1,22)<br><br>Sofosbuvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,95 (0,68; 1,33)<br>↑ AUC 1,30 (1,00; 1,69)<br><br>GS-331007<br>↓ C <sub>max</sub> 0,73 (0,65; 0,83)<br>↔ AUC 1,04 (0,89; 1,22) |                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMUNSUPPRESSIVA</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| Ciklosporin <sup>9</sup>                                                       | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i><br>↑ Ledipasvir<br>↔ Ciklosporin                                                                                                                                                             | Ingen dosjustering av Harvoni eller ciklosporin krävs vid initiering av samtidig administrering. Efteråt kan noggrann monitorering och potentiell dosjustering av ciklosporin behövas. |
| Ciklosporin<br>(600 mg engångsdos)/sofosbuvir (400 mg engångsdos) <sup>h</sup> | Ciklosporin<br>↔ C <sub>max</sub> 1,06 (0,94; 1,18)<br>↔ AUC 0,98 (0,85; 1,14)<br><br>Sofosbuvir<br>↑ C <sub>max</sub> 2,54 (1,87; 3,45)<br>↑ AUC 4,53 (3,26; 6,30)<br><br>GS-331007<br>↓ C <sub>max</sub> 0,60 (0,53; 0,69)<br>↔ AUC 1,04 (0,90; 1,20) |                                                                                                                                                                                        |
| Takrolimus                                                                     | Inga interaktionsstudier har utförts.<br><i>Förväntat:</i>                                                                                                                                                                                              | Ingen dosjustering av Harvoni eller takrolimus krävs vid initiering av                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | ↔ Ledipasvir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | samtidig administrering. Efteråt kan noggrann monitorering och potentiell dosjustering av takrolimus behövas. |
| Takrolimus<br>(5 mg engångsdos)/ sofosbuvir<br>(400 mg engångsdos) <sup>h</sup>                                                                                 | Takrolimus<br>↓ C <sub>max</sub> 0,73 (0,59; 0,90)<br>↑ AUC 1,09 (0,84; 1,40)<br><br>Sofosbuvir<br>↓ C <sub>max</sub> 0,97 (0,65; 1,43)<br>↑ AUC 1,13 (0,81; 1,57)<br><br>GS-331007<br>↔ C <sub>max</sub> 0,97 (0,83; 1,14)<br>↔ AUC 1,00 (0,87; 1,13)                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <b>P-PILLER</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| Norgestimat/ etinylöstradiol<br>(norgestimat 0,180 mg/ 0,215 mg/<br>0,25 mg/ etinylöstradiol 0,025 mg)/<br>ledipasvir (90 mg en gång<br>dagligen) <sup>d</sup>  | Norelgestromin<br>↔ C <sub>max</sub> 1,02 (0,89; 1,16)<br>↔ AUC 1,03 (0,90; 1,18)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,09 (0,91; 1,31)<br><br>Norgestrel<br>↔ C <sub>max</sub> 1,03 (0,87; 1,23)<br>↔ AUC 0,99 (0,82; 1,20)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,00 (0,81; 1,23)<br><br>Etinylöstradiol<br>↑ C <sub>max</sub> 1,40 (1,18; 1,66)<br>↔ AUC 1,20 (1,04; 1,39)<br>↔ C <sub>min</sub> 0,98 (0,79; 1,22) | Ingen dosjustering av p-piller krävs .                                                                        |
| Norgestimat/ etinylöstradiol<br>(norgestimat 0,180 mg/ 0,215 mg/<br>0,25 mg/ etinylöstradiol 0,025 mg)/<br>sofosbuvir (400 mg en gång<br>dagligen) <sup>d</sup> | Norelgestromin<br>↔ C <sub>max</sub> 1,07 (0,94; 1,22)<br>↔ AUC 1,06 (0,92; 1,21)<br>↔ C <sub>min</sub> 1,07 (0,89; 1,28)<br><br>Norgestrel<br>↔ C <sub>max</sub> 1,18 (0,99; 1,41)<br>↑ AUC 1,19 (0,98; 1,45)<br>↑ C <sub>min</sub> 1,23 (1,00; 1,51)<br><br>Etinylöstradiol<br>↔ C <sub>max</sub> 1,15 (0,97; 1,36)<br>↔ AUC 1,09 (0,94; 1,26)<br>↔ C <sub>min</sub> 0,99 (0,80; 1,23) |                                                                                                               |

a. Genomsnittlig kvot (90 % KI) för farmakokinetiska parametrar för läkemedel vid samtidig administrering med ett studieläkemedel eller i kombination med båda studieläkemedlen. Ingen effekt = 1,00.

b. Alla interaktionsstudier utfördes på friska frivilliga.

c. Administrerat som Harvoni.

d. Gränser inom vilka ingen farmakokinetisk interaktion förekommer 70-143 %.

- e. Dessa är läkemedel i en klass där likartade interaktioner kan förutses.
- f. Åtskild administrering (12 timmars intervall) av atazanavir/ritonavir + emtricitabin/tenofoviridisoproxilfumarat eller darunavir/ritonavir + emtricitabin/tenofoviridisoproxilfumarat och Harvoni gav likartade resultat.
- g. Denna studie utfördes i närvaro av ytterligare två direktverkande antivirala medel.
- h. Bioekvivalens-/ekvivalensgränser 80-125 %.

## Graviditet

### Fertila kvinnor/antikonception hos män och kvinnor

När Harvoni används i kombination med ribavirin, måste oerhört stor försiktighet iakttas för att undvika graviditet hos kvinnliga patienter och hos kvinnliga partners till manliga patienter. Signifikanta teratogena och/eller embryocida effekter har visats i alla djurarter som exponerats för ribavirin. Fertila kvinnor eller deras manliga partners måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och under en period efter det att behandlingen har avslutats i enlighet med rekommendationen i produktresumén för ribavirin. Se produktresumén för ribavirin för mer information.

### Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användning av ledipasvir, sofosbuvir eller Harvoni i gravida kvinnor.

Djurstudier visar inga direkta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter. Inga signifikanta effekter på fosterutveckling har observerats med ledipasvir eller sofosbuvir i råtta eller kanin. Det har dock inte varit möjligt att utförligt bestämma exponeringsmarginaler uppnådda för sofosbuvir i råtta jämfört med exponeringen för människa vid rekommenderad klinisk dos (se avsnitt *Prekliniska uppgifter*).

Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Harvoni under graviditet.

Om ribavirin administreras samtidigt med Harvoni gäller kontraindikationerna beträffande användning av ribavirin under graviditet och amning (se även produktresumén för ribavirin).

## Amning

Det är okänt om ledipasvir eller sofosbuvir och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölken.

Tillgängliga farmakokinetiska djurdata har visat att ledipasvir och metaboliter av sofosbuvir utsöndras i mjölk (se avsnitt *Prekliniska uppgifter*).

En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Harvoni ska därför inte användas under amning.

Om ribavirin administreras samtidigt med Harvoni gäller kontraindikationerna beträffande användning av ribavirin under graviditet och amning (se även produktresumén för ribavirin).

## Fertilitet

Inga data om effekten av Harvoni på människans fertilitet är tillgängliga. Djurstudier tyder inte på skadliga effekter av ledipasvir eller sofosbuvir på fertilitet.

## Trafik

Harvoni (administrerat ensamt eller i kombination med ribavirin) har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna ska emellertid upplysas om att trötthet var vanligare hos patienter som behandlades med ledipasvir/sofosbuvir jämfört med placebo.

## Biverkningar

### Sammanfattning av biverkningsprofilen hos vuxna

Säkerhetsbedömningen av Harvoni bygger i huvudsak på poolade kliniska fas 3-studier utan kontrollgrupp, hos 1952 patienter som fick Harvoni i 8, 12 eller 24 veckor (inklusive 872 patienter som fick Harvoni i kombination med ribavirin).

Andelen patienter som permanent avbröt behandlingen på grund av biverkningar var 0 %, < 1 % och 1 % för patienter som fick ledipasvir/sofosbuvir i 8, 12 respektive 24 veckor; och < 1 %, 0 % och 2 % för patienter som fick kombinationsbehandling med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin i 8, 12 respektive 24 veckor.

I kliniska studier var trötthet och huvudvärk vanligare hos patienter som behandlades med ledipasvir/sofosbuvir jämfört med placebo. När ledipasvir/sofosbuvir studerades med ribavirin överensstämde de vanligaste biverkningarna av kombinationsbehandling med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin med den kända säkerhetsprofilen för behandling med ribavirin, utan att de förväntade biverkningarna ökade i frekvens eller svårighetsgrad.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har identifierats med Harvoni (tabell 7). Biverkningarna anges nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga ( $\geq 1/10$ ), vanliga ( $\geq 1/100$ , <  $1/10$ ), mindre vanliga ( $\geq 1/1\,000$ , <  $1/100$ ), sällsynta ( $\geq 1/10\,000$ , <  $1/1\,000$ ) eller mycket sällsynta (<  $1/10\,000$ ).

Tabell 7: Biverkningar identifierade med Harvoni

| Frekvens                                   | Biverkning |
|--------------------------------------------|------------|
| <i>Centrala och perifera nervsystemet:</i> |            |
| Mycket vanliga                             | huvudvärk  |
| <i>Hud och subkutan vävnad:</i>            |            |
| Vanliga                                    | utslag     |
| Okänd                                      | angioödem  |
| <i>Allmänna symtom:</i>                    |            |
| Mycket vanliga                             | trötthet   |

### Vuxna med dekompenenserad cirros och/eller som väntar på eller har genomgått levertransplantation

Säkerhetsprofilen för ledipasvir/sofosbuvir i kombination med ribavirin i 12 eller 24 veckor hos vuxna med dekompenenserad leversjukdom och/eller de som har genomgått en levertransplantation utvärderades i två öppna studier (SOLAR-1 och SOLAR-2). Inga nya biverkningar upptäcktes i bland patienter med dekompenenserad cirros och/eller som hade genomgått en levertransplantation och som fick ledipasvir/sofosbuvir i kombination med ribavirin. Även om biverkningar, inklusive allvarliga biverkningar, förekom oftare i den här studien jämfört med studier i vilka dekompenenserade patienter och/eller patienter som hade genomgått en levertransplantation exkluderades, var biverkningarna som observerades de förväntade kliniska följsjukdomarna av framskriden leversjukdom och/eller transplantation eller i

överensstämmelse med den kända säkerhetsprofilen för behandling med ribavirin (se avsnitt Farmakodynamik för detaljer om denna studie).

Sänkningar av hemoglobin till < 10 g/dl och < 8,5 g/dl under behandling upplevdes av 39 % respektive 13 % av patienter behandlade med ledipasvir/sofosbuvir med ribavirin. Behandling med ribavirin avbröts hos 15 % av patienterna.

Den immunsupprimerande behandlingen modifierades hos 7 % av de patienter som genomgått en levertransplantation.

### **Patienter med nedsatt njurfunktion**

I en öppen studie (studie 0154) administrerades ledipasvir/sofosbuvir under 12 veckor till 18 patienter med genotyp 1 CHC och som hade gravt nedsatt njurfunktion. Det sågs ingen tydligt förhöjd frekvens av biverkningar i denna begränsade uppsättning av kliniska säkerhetsdata, jämfört med vad som förväntas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Säkerheten för Harvoni har utvärderats i en 12 veckor lång, icke-kontrollerad studie (studie 4063) med 95 patienter som hade dialyskrävande ESRD. Under dessa förhållanden ökar exponeringen för sofosbuvirmetaboliten GS-331007 20-faldigt och överskrider de mängder vid vilka biverkningar har observerats i prekliniska prövningar. Det sågs ingen förhöjd frekvens av biverkningar och inget tydligt förhöjt antal dödsfall i denna begränsade uppsättning av kliniska säkerhetsdata, jämfört med vad som förväntas hos patienter med ESRD.

### **Pediatrisk population**

Säkerhet och effekt för Harvoni för pediatriska patienter från 3 års ålder baseras på data från en öppen klinisk fas 2-studie (studie 1116) som omfattade 226 patienter som behandlades med ledipasvir/sofosbuvir under 12 eller 24 veckor eller ledipasvir/sofosbuvir plus ribavirin under 24 veckor. De biverkningar som observerades var i överensstämmelse med dem som observerats i kliniska studier av ledipasvir/sofosbuvir hos vuxna (se tabell 7).

### **Beskrivning av utvalda biverkningar**

#### *Hjärtarytmier*

Fall av allvarlig bradykardi och hjärtblock har setts när Harvoni används samtidigt med amiodaron och/eller andra läkemedel som sänker hjärtfrekvensen (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).

#### *Hudsjukdomar:*

Okänd frekvens: Stevens-Johnsons syndrom

#### *Rapportering av misstänkta biverkningar*

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **Överdoser**

De högsta dokumenterade doserna av ledipasvir och sofosbuvir var 120 mg två gånger dagligen i 10 dagar respektive en engångsdos på 1 200 mg. I dessa studier på friska frivilliga sågs inga ogynnsamma effekter vid dessa dosnivåer och biverkningar förekom med likartad frekvens och svårighetsgrad som i placebogrupperna. Effekterna av högre doser är okänd.

Det finns ingen specifik antidot vid överdosering av Harvoni. Om överdosering sker, måste patienten monitoreras för tecken på toxicitet. Behandling av överdosering av Harvoni består av allmänna understödjande åtgärder, däribland monitorering av vitala tecken liksom observation av patientens kliniska status. Hemodialys resulterar sannolikt inte i något betydande avlägsnande av ledipasvir eftersom ledipasvir i hög grad är bundet till plasmaproteiner. Hemodialys kan effektivt avlägsna den huvudsakliga cirkulerande metaboliten av sofosbuvir, GS-331007 med en extraktionskvot på 53 %.

## Farmakodynamik

### Verkningsmekanism

Ledipasvir är en HCV-hämmare riktad mot HCV NS5A-protein, som är nödvändigt för både RNA-replikation och hopsättning av HCV-virioner ("assembly"). För närvarande är det inte möjligt att biokemiskt bekräfta ledipasvirs hämning av NS5A eftersom NS5A inte har någon enzymatisk funktion. In vitro studier av resistensselektion och korsresistens tyder på att ledipasvirs verkningsmekanism är riktad mot NS5A.

Sofosbuvir är en pan-genotypisk hämmare av hepatit C-virusets NS5B RNA-beroende RNA-polymeras, som är nödvändigt för virusreplikation. Sofosbuvir är en nukleotid prodrug som metaboliseras intracellulärt till det farmakologiskt aktiva uridinanalogtrifosfatet (GS-461203), som kan inkorporeras i HCV-RNA av NS5B-polymeras och verka som en kedjeterminator. GS-461203 (den aktiva metaboliten för sofosbuvir) hämmar varken humant DNA- och RNA-polymeras eller mitokondriskt RNA-polymeras.

### Antiviral aktivitet

EC50-värdena för ledipasvir och sofosbuvir mot fullängds- eller chimära NS5A- och NS5B-kodande replikoner från kliniska isolat anges i tabell 8. Närvaro av 40 % humant serum hade ingen effekt på sofosbuvirs HCV-hämmande aktivitet men minskade 12-faldigt ledipasvirs HCV hämmande aktivitet mot HCV-replikoner från genotyp 1a.

Tabell 8: Ledipasvirs och sofosbuvirs aktivitet mot chimära replikoner

| Replikongenotyp | Ledipasvirs aktivitet (EC <sub>50</sub> , nM) |                                                               | Sofosbuvirs aktivitet (EC <sub>50</sub> , nM) |                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | Stabila replikoner                            | Transienta NS5A-replikoner<br>Median (intervall) <sup>a</sup> | Stabila replikoner                            | Transienta NS5B-replikoner<br>Median (intervall) <sup>a</sup> |
| Genotyp 1a      | 0,031                                         | 0,018 (0,009-0,085)                                           | 40                                            | 62 (29-128)                                                   |
| Genotyp 1b      | 0,004                                         | 0,006 (0,004-0,007)                                           | 110                                           | 102 (45-170)                                                  |
| Genotyp 2a      | 21-249                                        | -                                                             | 50                                            | 29 (14-81)                                                    |
| Genotyp 2b      | 16-530 <sup>b</sup>                           | -                                                             | 15 <sup>b</sup>                               | -                                                             |
| Genotyp 3a      | 168                                           | -                                                             | 50                                            | 81 (24-181)                                                   |
| Genotyp 4a      | 0,39                                          | -                                                             | 40                                            | -                                                             |
| Genotyp 4d      | 0,60                                          | -                                                             | -                                             | -                                                             |
| Genotyp 5a      | 0,15 <sup>b</sup>                             | -                                                             | 15 <sup>b</sup>                               | -                                                             |
| Genotyp 6a      | 1,1 <sup>b</sup>                              | -                                                             | 14 <sup>b</sup>                               | -                                                             |

| Replikongenotyp | Ledipasvirs aktivitet (EC <sub>50</sub> , nM) |                                                               | Sofosbuvirs aktivitet (EC <sub>50</sub> , nM) |                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | Stabila replikoner                            | Transienta NS5A-replikoner<br>Median (intervall) <sup>a</sup> | Stabila replikoner                            | Transienta NS5B-replikoner<br>Median (intervall) <sup>a</sup> |
| Genotyp 6e      | 264 <sup>b</sup>                              | -                                                             | -                                             | -                                                             |

a. Transienta NS5A- eller NS5B-bärande replikoner från patientisolat.

b. De chimära NS5A-genbärande replikonerna från genotyp 2b, 5a, 6a och 6e användes för att testa ledipasvir medan de chimära NS5B-genbärande replikonerna från genotyp 2b, 5a eller 6a användes för att testa sofosbuvir.

## Resistens

### *I cellodling*

HCV-replikoner med minskad känslighet för ledipasvir har selekterats i cellodling för genotyp 1a och 1b. Minskad känslighet för ledipasvir var förenad med den primära NS5A-substitutionen Y93H i både genotyp 1a och 1b. Dessutom utvecklades en Q30E-substitution i replikoner från genotyp 1a. Riktad mutagenes med NS5A-RAV visade att substitutioner som gav en > 100- och ≤ 1 000-faldig förändring av känsligheten för ledipasvir var Q30H/R, L31I/M/V, P32L och Y93T i genotyp 1a och P58D och Y93S i genotyp 1b, och substitutioner som gav en > 1 000-faldig förändring var M28A/G, Q30E/G/K, H58D, Y93C/H/N/S i genotyp 1a och A92K och Y93H i genotyp 1b.

HCV-replikoner med minskad känslighet för sofosbuvir har selekterats i cellodling för flera genotyper, t.ex. 1b, 2a, 2b, 3a, 4a, 5a och 6a. Minskad känslighet för sofosbuvir var förenad med den primära NS5B-substitutionen S282T i samtliga undersökta replikongenotyper. Riktad mutagenes med S282T-substitutionen i replikoner av 8 genotyper gav 2- till 18-faldigt minskad känslighet för sofosbuvir och försämrade virusets replikationskapacitet med 89 % till 99 % jämfört med motsvarande vildtyp.

### *I kliniska studier - Vuxna-genotyp 1*

I en poolad analys av patienter som fick ledipasvir/sofosbuvir i fas 3-studier (ION-3, ION-1 och ION-2) var 37 patienter (29 med genotyp 1a och 8 med genotyp 1b) kvalificerade för resistensanalys på grund av virologisk svikt eller förtida behandlingsavbrott med studieläkemedlet och HCV-RNA > 1 000 IE/ml. NS5A- och NS5B-djupsekvenseringsdata (analysgräns vid 1 %) från tidpunkter efter baseline fanns för 37/37 respektive 36/37 patienter.

NS5A -resistensassocierade varianter (RAV) observerades i isolat från tidpunkter efter baseline från 29/37 patienter (22/29 genotyp 1a och 7/8 genotyp 1b) som inte uppnådde kvarstående virologiskt svar (*sustained virologic response*, SVR). Av de 29 patienter med genotyp 1a som var kvalificerade för resistensanalys hade 22/29 (76 %) patienter en eller flera NS5A-RAV i positionerna K24, M28, Q30, L31, S38 och Y93 vid svikt, medan ingen NS5A-RAV påvisades hos resterande 7/29 patienter vid svikt. De vanligaste varianterna var Q30R, Y93H och L31M. Av de 8 patienter med genotyp 1b som var kvalificerade för resistensanalys hade 7/8 (88 %) en eller flera NS5A-RAV i positionerna L31 och Y93 vid svikt, medan 1/8 patienter inte hade någon NS5A-RAV vid svikt. Den vanligaste varianten var Y93H. Av de 8 patienter som inte hade någon NS5A-RAV vid svikt fick 7 patienter 8 veckors behandling (n = 3 med ledipasvir/sofosbuvir; n = 4 med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin) och 1 patient fick ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor. I fenotypanalyser visade isolat från tidpunkter efter baseline från patienter som hade NS5A-RAV vid svikt 20- till en minst 243-faldigt (den högsta testade dosen) minskad känslighet för ledipasvir. Riktad mutagenes med Y93H-substitutionen i både genotyp 1a och 1b liksom Q30R- och L31M-substitutionen i genotyp 1a gav höga nivåer av minskad känslighet för ledipasvir (mellan 544-faldig och 1 677-faldig förändring av EC<sub>50</sub>).

Hos transplanterade patienter med kompenserad leversjukdom, eller hos patienter med dekompenenserad leversjukdom antingen före eller efter transplantation (studierna SOLAR-1 och SOLAR-2), kunde återfall kopplas till påvisande av en eller flera av följande NS5A-RAV: K24R, M28T, Q30R/H/K, L31V, H58D och Y93H/C hos 12/14 patienter med genotyp 1a, samt L31M och Y93H/N hos 6/6 patienter med genotyp 1b.

NS5B-substitution E237G påvisades hos 3 patienter (1 med genotyp 1b och 2 med genotyp 1a) i fas 3-studierna (ION-3, ION-1 och ION-2) och hos 3 patienter med genotyp 1a-infektion i SOLAR-1- och SOLAR-2-studierna vid tiden för recidiv. E237G-substitutionen gav en 1,3-faldig minskning av känsligheten för sofosbuvir i replikonanalysen av genotyp 1a. Den kliniska betydelsen av denna substitution är för närvarande okänd.

Den sofosbuvir-resistensassocierade substitutionen S282T i NS5B påvisades inte i något isolat med virologisk svikt från fas 3-studierna. Emellertid påvisades NS5B S282T-substitutionen i kombination med NS5A-substitutionerna L31M, Y93H och Q30L hos en patient vid svikt efter 8 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir i en fas 2-studie (LONESTAR). Denna patient ombehandlades sedan med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin i 24 veckor och uppnådde SVR efter ombehandling.

I studien SIRIUS (se "Klinisk effekt och säkerhet" nedan) inträffade recidiv hos 5 patienter med genotyp 1-infektion efter behandling med ledipasvir/sofosbuvir med eller utan ribavirin. NS5A-RAV sågs vid recidiv hos 5/5 patienter (för genotyp 1a: Q30R/H + L31M/V [n = 1] och Q30R [n = 1] och för genotyp 1b: Y93H [n = 3]).

#### *I kliniska studier – Vuxna-genotyp 2, 3, 4, 5 och 6*

NS5A-RAV: Inga patienter infekterade med genotyp 2 drabbades av recidiv i den kliniska studien och därför finns det inga data om NS5A-RAV vid tidpunkten för svikt.

Hos patienter infekterade med genotyp 3 som drabbades av virologisk svikt påvisades vanligen inte utveckling av NS5A-RAV (inklusive ökning av RAV som förelåg vid baseline) vid tidpunkten för svikt (n = 17).

Endast ett litet antal patienter infekterade med genotyp 4, 5 och 6 har utvärderats (totalt 5 patienter med svikt). NS5A-substitutionen Y93C utvecklades i HCV hos 1 patient (genotyp 4), medan NS5A-RAV som förelåg vid baseline observerades vid tidpunkten för svikt hos samtliga patienter. I SOLAR-2-studien utvecklade en patient med genotyp 4d NS5B-substitution E237G vid tidpunkten för recidiv. Den kliniska betydelsen av denna substitution är för närvarande okänd.

NS5B-RAV: NS5B-substitutionen S282T utvecklades i HCV hos 1/17 patienter med svikt som hade genotyp 3 och i HCV hos 1/3, 1/1 och 1/1 av patienterna med svikt som hade genotyp 4, 5 respektive 6.

#### **Effekt av resistensassocierade HCV-varianter vid baseline på behandlingsresultat**

##### *Vuxna-Genotyp 1*

Analysen utfördes för att undersöka sambandet mellan NS5A-RAV som förelåg vid baseline och behandlingsresultat. I den poolade analysen av fas 3-studierna hade 16 % av patienterna NS5A-RAV vid baseline identifierade med populations- eller djupsekvensering oavsett subtyp. NS5A-RAV vid baseline var överrepresenterade hos patienter som drabbades av recidiv i fas 3-studierna (se "Klinisk effekt och säkerhet").

Efter 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir (utan ribavirin) hos behandlingserfarna patienter (arm 1 i studien ION-2) uppnåddes SVR hos 4/4 patienter med NS5A-RAV vid baseline som gav en  $\leq$  100-faldig förändring av känsligheten för ledipasvir. I samma behandlingsarm inträffade recidiv hos 4/13 patienter (31 %) med NS5A-RAV vid baseline som gav en  $>$  100-faldig förändring, jämfört med 3/95 (3 %) av dem utan RAV vid baseline eller RAV som gav en  $\leq$  100-faldig förändring.

Efter 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir i kombination med ribavirin hos behandlingserfarna patienter med kompenserad cirros (SIRIUS, n = 77) uppnåddes SVR12 hos 8/8 patienter med NS5A-RAV vid baseline som gav en  $>$  100-faldigt minskad känslighet för ledipasvir.

Hos patienter med kompenserad leversjukdom som genomgått transplantation (studierna SOLAR-1 och SOLAR-2), inträffade inget recidiv hos patienter med NS5A-RAV vid baselinjen (n = 23) efter 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin. Hos patienter med dekompenenserad leversjukdom (före och efter transplantation) inträffade recidiv hos 4/16 patienter (25 %) med NS5A-RAV som gav en  $>$  100-faldig resistens efter 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, jämfört med 7/120 (6 %) av dem utan NS5A-RAV vid baseline eller RAV som gav en  $\leq$  100-faldig förändring.

Gruppen av NS5A-RAV som gav  $>$  100-faldig förändring och som observerades hos patienter var följande substitutioner i genotyp 1a (M28A, Q30H/R/E, L31M/V/I, H58D, Y93H/N/C) eller i genotyp 1b (Y93H). Andelen av sådana NS5A-RAV vid baseline som sågs med djupsekvensering varierade från mycket liten (analysgräns = 1 %) till stor (merparten av plasmapopulationen).

Den sofosbuvir- resistensassocierade substitutionen S282T i NS5B påvisades inte med populations- eller djupsekvensering vid baseline hos någon patient i fas 3-studierna. SVR uppnåddes hos alla 24 patienter (n = 20 med L159F+C316N; n = 1 med L159F; och n = 3 med N142T) som hade varianter vid baseline associerade med resistens mot nukleosida NS5B-hämmare.

#### *Vuxna-Genotyp 2, 3, 4, 5 och 6*

På grund av studiernas begränsade omfattning har effekten av NS5A-RAV vid baseline på behandlingsresultatet för patienter med CHC av genotyp 2, 3, 4, 5 eller 6 inte utvärderats fullt ut. Inga stora skillnader i resultaten observerades baserat på förekomst eller frånvaro av NS5A-RAV vid baseline.

#### **Pediatriska patienter**

Förekomst av NS5A- och/eller NS5B-RAV före behandling påverkade inte behandlingsresultatet eftersom alla patienter med RAV före behandling uppnådde SVR12 och SVR24. En 8-årig patient infekterad med HCV av genotyp 1a som inte uppnådde SVR12 hade inga nukleosida NS5A- eller NS5B-hämmar-RAV vid baseline och hade nyuppkommen NS5A-RAV Y93H vid återfall.

#### **Korsresistens**

Ledipasvir var fullt aktivt mot den sofosbuvir-resistensassocierade substitutionen S282T i NS5B medan alla ledipasvir-resistensassocierade substitutioner i NS5A var fullt känsliga för sofosbuvir. Både sofosbuvir och ledipasvir var fullt aktiva mot substitutioner associerade med resistens mot andra direktverkande virushämmare med olika verkningsmekanismer, såsom icke nukleosida NS5B-hämmare och NS3-proteashämmare. NS5A-substitutioner som ger resistens mot ledipasvir kan minska andra NS5A-hämmares antivirala aktivitet.

#### **Klinisk effekt och säkerhet**

Effekten av ledipasvir [LDV]/sofosbuvir [SOF] utvärderades i tre öppna fas 3-studier med data tillgängliga från sammanlagt 1 950 patienter med CHC orsakad av infektion med HCV av genotyp 1. De tre fas 3-studierna omfattade en studie utförd på icke-cirrotiska behandlingsnaiva patienter (ION-3); en studie på cirrotiska och icke-cirrotiska behandlingsnaiva patienter (ION-1); och en studie på cirrotiska och icke-cirrotiska patienter med svikt under tidigare behandling med en interferonbaserad regim, inklusive regimer innehållande en HCV-proteashämmare (ION-2). Patienter i dessa studier hade kompenserad leversjukdom. Alla tre fas 3-studier utvärderade effekten av ledipasvir/sofosbuvir med eller utan ribavirin.

Behandlingstiden var fast i samtliga studier. Serumvärden för HCV-RNA mättes under de kliniska studierna med COBAS TaqMan HCV-testet (version 2.0) för användning med High Pure System. Analysen hade en nedre gräns för kvantifiering (LLOQ) på 25 IE/ml. SVR var det primära effektmåttet för att bestämma utläkningsfrekvensen för HCV som fastställdes till HCV-RNA under LLOQ 12 veckor efter avslutad behandling.

#### *Behandlingsnaiva vuxna utan cirros – ION-3 (studie 0108) - genotyp 1*

ION-3 utvärderade 8 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir med eller utan ribavirin och 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir hos behandlingsnaiva icke-cirrotiska patienter med CHC orsakad av infektion med HCV av genotyp 1. Patienterna randomiserades i förhållandet 1:1:1 till en av de tre behandlingsgrupperna och stratifierades efter HCV-genotyp (1a kontra 1b).

Tabell 9: Demografi och karakteristika vid baseline i studien ION 3

| Patientgruppering                                  | LDV/SOF<br>8 veckor (n = 215) | LDV/SOF+RBV<br>8 veckor (n = 216) | LDV/SOF<br>12 veckor (n = 216) | TOTALT<br>(n = 647)     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Ålder (år): median<br>(intervall)                  | 53 (22-75)                    | 51 (21-71)                        | 53 (20-71)                     | 52 (20-75)              |
| Manligt kön                                        | 60 % (130)                    | 54 % (117)                        | 59 % (128)                     | 58 % (375)              |
| Etnicitet:                                         |                               |                                   |                                |                         |
| - Svart/<br>afroamerikan                           | 21 % (45)                     | 17 % (36)                         | 19 % (42)                      | 19 % (123)              |
| - Kaukasier                                        | 76 % (164)                    | 81 % (176)                        | 77 % (167)                     | 78 % (507)              |
| Genotyp 1a                                         | 80 % (171)                    | 80 % (172)                        | 80 % (172)                     | 80 % (515) <sup>a</sup> |
| IL28CC-genotyp                                     | 26 % (56)                     | 28 % (60)                         | 26 % (56)                      | 27 % (172)              |
| <i>FibroTest bestämd Metavir-poäng<sup>b</sup></i> |                               |                                   |                                |                         |
| - F0-F1                                            | 33 % (72)                     | 38 % (81)                         | 33 % (72)                      | 35 % (225)              |
| - F2                                               | 30 % (65)                     | 28 % (61)                         | 30 % (65)                      | 30 % (191)              |
| - F3-F4                                            | 36 % (77)                     | 33 % (71)                         | 37 % (79)                      | 35 % (227)              |
| - Ej tolkningsbart                                 | < 1 % (1)                     | 1 % (3)                           | 0 % (0)                        | < 1 % (4)               |

a. En patient i behandlingsarmen som fick LDV/SOF i 8 veckor hade inte en bekräftad subtyp av genotyp 1.

b. Icke-saknade FibroTest-resultat tilldelades Metavir-poäng enligt: 0-0,31 = F0-F1; 0,32-0,58 = F2; 0,59-1,00 = F3-F4.

Tabell 10: Svarsfrekvenser i studien ION-3

|     | LDV/SOF<br>8 veckor (n = 215) | LDV/SOF+RBV<br>8 veckor (n = 216) | LDV/SOF<br>12 veckor (n = 216) |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| SVR | 94 % (202/215)                | 93 % (201/216)                    | 96 % (208/216)                 |

|                                        | LDV/SOF<br>8 veckor (n = 215) | LDV/SOF+RBV<br>8 veckor (n = 216) | LDV/SOF<br>12 veckor (n = 216) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <i>Resultat för patienter utan SVR</i> |                               |                                   |                                |
| - Virologisk svikt under behandling    | 0/215                         | 0/216                             | 0/216                          |
| - Recidiv <sup>a</sup>                 | 5 % (11/215)                  | 4 % (9/214)                       | 1 % (3/216)                    |
| Övrigt <sup>b</sup>                    | < 1 % (2/215)                 | 3 % (6/216)                       | 2 % (5/216)                    |
| <i>Genotyp</i>                         |                               |                                   |                                |
| - Genotyp 1a                           | 93 % (159/171)                | 92 % (159/172)                    | 96 % (165/172)                 |
| - Genotyp 1b                           | 98 % (42/43)                  | 95 % (42/44)                      | 98 % (43/44)                   |

a. Nämnare för recidiv är antalet patienter med HCV-RNA < LLOQ vid den sista bedömningen under behandling.

b. Övrigt inkluderar patienter som inte uppnådde SVR och inte uppfyllde kriterierna för virologisk svikt (t.ex. förlorad för uppföljning).

Den 8 veckor långa behandlingen med ledipasvir/sofosbuvir utan ribavirin var inte sämre ("*non-inferior*") än 8 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin (behandlingskillnad 0,9 %; 95 % konfidensintervall: -3,9 % till 5,7 %) och 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir (behandlingskillnad -2,3 %; 97,5 % konfidensintervall: -7,2 % till 3,6 %). Bland patienterna med HCV-RNA < 6 miljoner IE/ml vid baseline var SVR 97 % (119/123) vid 8 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir och 96 % (126/131) vid 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir.

Tabell 11: Recidivfrekvenser per karakteristika vid baseline i studien ION-3, population med virologisk svikt\*

|                                         | LDV/SOF<br>8 veckor (n= 213) | LDV/SOF+RBV<br>8 veckor (n= 210) | LDV/SOF<br>12 veckor (n= 211) |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <i>Kön</i>                              |                              |                                  |                               |
| - Man                                   | 8 % (10/129)                 | 7 % (8/114)                      | 2 % (3/127)                   |
| - Kvinna                                | 1 % (1/84)                   | 1 % (1/96)                       | 0 % (0/84)                    |
| <i>IL28-genotyp</i>                     |                              |                                  |                               |
| - CC                                    | 4 % (2/56)                   | 0 % (0/57)                       | 0 % (0/54)                    |
| - Icke-CC                               | 6 % (9/157)                  | 6 % (9/153)                      | 2 % (3/157)                   |
| <i>HCV-RNA vid baseline<sup>a</sup></i> |                              |                                  |                               |
| - HCV-RNA < 6 miljoner IE/ml            | 2 % (2/121)                  | 2 % (3/136)                      | 2 % (2/128)                   |
| - HCV-RNA ≥ 6 miljoner IE/ml            | 10 % (9/92)                  | 8 % (6/74)                       | 1 % (1/83)                    |

\* Patienter förlorade för uppföljning eller som återkallade samtycket exkluderades.

a. HCV-RNA-värden bestämdes med Roche TaqMan-analys; en patients HCV-RNA kan variera från besök till besök.

*Behandlingsnaiva vuxna med eller utan cirros – ION-1 (studie 0102) - genotyp 1*

ION-1 var en randomiserad, öppen studie som utvärderade 12 och 24 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir med eller utan ribavirin hos 865 behandlingsnaiva patienter med CHC orsakad av infektion med HCV av genotyp 1 inklusive patienter med cirros (randomiserade 1:1:1:1). Randomiseringen stratifierades efter förekomst eller frånvaro av cirros och HCV-genotyp (1a kontra 1b).

Tabell 12: Demografi och karakteristika vid baseline i studien ION-1

| Patientgrupperin<br>g                              | LDV/SOF<br>12 veckor (n =<br>214) | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor (n =<br>217) | LDV/SOF<br>24 veckor (n =<br>217) | LDV/SOF+RBV<br>24 veckor (n =<br>217) | Totalt<br>(n = 865) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Ålder (år):<br>median<br>(intervall)               | 52 (18-75)                        | 52 (18-78)                            | 53 (22-80)                        | 53 (24-77)                            | 52 (18-80)          |
| Manligt kön                                        | 59 % (127)                        | 59 % (128)                            | 64 % (139)                        | 55 % (119)                            | 59 % (513)          |
| Etnicitet:<br>- Svart/<br>afroamerikan             | 11 % (24)                         | 12 % (26)                             | 15 % (32)                         | 12 % (26)                             | 12 % (108)          |
| - Kaukasier                                        | 87 % (187)                        | 87 % (188)                            | 82 % (177)                        | 84 % (183)                            | 85 % (735)          |
| Genotyp 1a <sup>a</sup>                            | 68 % (145)                        | 68 % (148)                            | 67 % (146)                        | 66 % (143)                            | 67 % (582)          |
| IL28CC-genotyp                                     | 26 % (55)                         | 35 % (76)                             | 24 % (52)                         | 34 % (73)                             | 30 % (256)          |
| <i>FibroTest-bestämd Metavir-poäng<sup>b</sup></i> |                                   |                                       |                                   |                                       |                     |
| - F0-F1                                            | 27 % (57)                         | 26 % (56)                             | 29 % (62)                         | 30 % (66)                             | 28 % (241)          |
| - F2                                               | 26 % (56)                         | 25 % (55)                             | 22 % (47)                         | 28 % (60)                             | 25 % (218)          |
| - F3-F4                                            | 47 % (100)                        | 48 % (104)                            | 49 % (107)                        | 42 % (91)                             | 46 % (402)          |
| - Ej tolkningsbart                                 | < 1 % (1)                         | 1 % (2)                               | < 1 % (1)                         | 0 % (0)                               | < 1 % (4)           |

a. Två patienter i behandlingsarmen som fick LDV/SOF i 12 veckor, en patient i behandlingsarmen som fick LDV/SOF + RBV i 12 veckor, två patienter i behandlingsarmen som fick LDV/SOF i 24 veckor och två patienter i behandlingsarmen som fick LDV/SOF+RBV i 24 veckor hade inte en bekräftad subtyp av genotyp 1.

b. Icke-saknade FibroTest-resultat tilldelades Metavir-poäng enligt: 0-0,31 = F0-F1; 0,32-0,58 = F2; 0,59-1,00 = F3-F4.

Tabell 13: Svarsfrekvenser i studien ION-1

|                                            | LDV/SOF<br>12 veckor (n = 214) | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor (n = 217) | LDV/SOF<br>24 veckor (n = 217) | LDV/SOF+RBV<br>24 veckor (n = 217) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| SVR                                        | 99 % (210/213)                 | 97 % (211/217)                     | 98 % (213/217)                 | 99 % (215/217)                     |
| <i>Resultat för patienter utan SVR</i>     |                                |                                    |                                |                                    |
| - Virologisk svikt<br>under behandling     | 0/213 <sup>a</sup>             | 0/217                              | < 1 % (1/217)                  | 0/216                              |
| - Recidiv <sup>b</sup>                     | < 1 % (1/212)                  | 0/217                              | < 1 % (1/215)                  | 0/216                              |
| - Övrigt <sup>c</sup>                      | < 1 % (2/213)                  | 3 % (6/217)                        | < 1 % (2/217)                  | < 1 % (2/217)                      |
| <i>SVR-frekvenser för valda subgrupper</i> |                                |                                    |                                |                                    |
| <i>Genotyp</i>                             |                                |                                    |                                |                                    |
| - Genotyp 1a                               | 98 % (142/145)                 | 97 % (143/148)                     | 99 % (144/146)                 | 99 % (141/143)                     |
| - Genotyp 1b                               | 100 % (67/67)                  | 99 % (67/68)                       | 97 % (67/69)                   | 100 % (72/72)                      |

|                     | LDV/SOF<br>12 veckor (n = 214) | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor (n = 217) | LDV/SOF<br>24 veckor (n = 217) | LDV/SOF+RBV<br>24 veckor (n = 217) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Cirros <sup>d</sup> |                                |                                    |                                |                                    |
| - Nej               | 99 % (176/177)                 | 97 % (177/183)                     | 98 % (181/184)                 | 99 % (178/180)                     |
| - Ja                | 94 % (32/34)                   | 100 % (33/33)                      | 97 % (32/33)                   | 100 % (36/36)                      |

- a. En patient exkluderades från behandlingsarmen som fick LDV/SOF i 12 veckor och en patient exkluderades från behandlingsarmen som fick LDV/SOF+RBV i 24 veckor eftersom båda patienterna hade infektion med CHC av genotyp 4.
- b. Nämnare för recidiv är antalet patienter med HCV-RNA < LLOQ vid den sista bedömningen under behandling.
- c. Övrigt inkluderar patienter som inte uppnådde SVR och inte uppfyllde kriterierna för virologisk svikt (t.ex. förlorad för uppföljning).
- d. Patienter som saknade cirrosstatus uteslöts från denna subgruppsanalys.

#### *Tidigare behandlade vuxna med eller utan cirros - ION-2 (studie 0109) - genotyp 1*

ION-2 var en randomiserad, öppen studie som utvärderade 12 och 24 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir med eller utan ribavirin (randomiserade 1:1:1:1) hos patienter med HCV-infektion av genotyp 1 med eller utan cirros med svikt på tidigare behandling med en interferonbaserad regim, inklusive regimer innehållande en HCV-proteashämmare. Randomiseringen stratifierades efter förekomst eller frånvaro av cirros, HCV-genotyp (1a *kontra* 1b) och svar på tidigare HCV-behandling (recidiv/genombrott *kontra* uteblivet svar).

Tabell 14: Demografi och karakteristika vid baseline för studien ION-2

| Patientgrupperin<br>g                              | LDV/SOF<br>12 veckor (n =<br>109) | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor (n =<br>111) | LDV/SOF<br>24 veckor (n =<br>109) | LDV/SOF+RBV<br>24 veckor (n =<br>111) | TOTALT<br>(n = 440)     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Ålder (år):<br>median<br>(intervall)               | 56 (24-67)                        | 57 (27-75)                            | 56 (25-68)                        | 55 (28-70)                            | 56 (24-75)              |
| Manligt kön                                        | 68 % (74)                         | 64 % (71)                             | 68 % (74)                         | 61 % (68)                             | 65 % (287)              |
| Etnicitet:<br>- Svart/afroamerik<br>an             | 22 % (24)                         | 14 % (16)                             | 16 % (17)                         | 18 % (20)                             | 18 % (77)               |
| - Kaukasier                                        | 77 % (84)                         | 85 % (94)                             | 83 % (91)                         | 80 % (89)                             | 81 % (358)              |
| Genotyp 1a                                         | 79 % (86)                         | 79 % (88)                             | 78 % (85)                         | 79 % (88)                             | 79 % (347)              |
| <i>Tidigare HCV-behandling</i>                     |                                   |                                       |                                   |                                       |                         |
| - PEG-IFN+RBV                                      | 39 % (43)                         | 42 % (47)                             | 53 % (58)                         | 53 % (59)                             | 47 % (207) <sup>a</sup> |
| - HCV-proteashä<br>mmare +<br>PEG-IFN+RBV          | 61 % (66)                         | 58 % (64)                             | 46 % (50)                         | 46 % (51)                             | 53 % (231) <sup>a</sup> |
| IL28CC-genotyp                                     | 9 % (10)                          | 10 % (11)                             | 14 % (16)                         | 16 % (18)                             | 13 % (55)               |
| <i>FibroTest-bestämd Metavir-poäng<sup>b</sup></i> |                                   |                                       |                                   |                                       |                         |
| - F0-F1                                            | 14 % (15)                         | 10 % (11)                             | 12 % (13)                         | 16 % (18)                             | 13 % (57)               |
| - F2                                               | 28 % (31)                         | 26 % (29)                             | 28 % (31)                         | 30 % (33)                             | 28 % (124)              |

| Patientgrupperin<br>g | LDV/SOF<br>12 veckor (n =<br>109) | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor (n =<br>111) | LDV/SOF<br>24 veckor (n =<br>109) | LDV/SOF+RBV<br>24 veckor (n =<br>111) | TOTALT<br>(n = 440) |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| - F3-F4               | 58 % (63)                         | 64 % (71)                             | 58 % (63)                         | 54 % (60)                             | 58 % (257)          |
| - Ej tolkningsbart    | 0 % (0)                           | 0 % (0)                               | 2 % (2)                           | 0 % (0)                               | < 1 % (2)           |

a. En patient i behandlingsarmen som fick LDV/SOF i 24 veckor och en patient i behandlingsarmen som fick LDV/SOF+RBV i 24 veckor hade svikt på tidigare behandling med en regim baserad på icke-pegylerat interferon.

b. Icke-saknade FibroTest-resultat tilldelades Metavir-poäng enligt: 0-0,31 = F0-F1; 0,32-0,58 = F2; 0,59-1,00 = F3-F4

Tabell 15: Svarsfrekvenser i studien ION-2

|                                            | LDV/SOF<br>12 veckor (n = 109) | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor (n = 111) | LDV/SOF<br>24 veckor (n = 109) | LDV/SOF+RBV<br>24 veckor (n = 111) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| SVR                                        | 94 % (102/109)                 | 96 % (107/111)                     | 99 % (108/109)                 | 99 % (110/111)                     |
| <i>Resultat för patienter utan SVR</i>     |                                |                                    |                                |                                    |
| - Virologisk svikt under behandling        | 0/109                          | 0/111                              | 0/109                          | < 1 % (1/111)                      |
| - Recidiv <sup>a</sup>                     | 6 % (7/108)                    | 4 % (4/111)                        | 0/109                          | 0/110                              |
| - Övrigt <sup>b</sup>                      | 0/109                          | 0/111                              | < 1 % (1/109)                  | 0/111                              |
| <i>SVR-frekvenser för valda subgrupper</i> |                                |                                    |                                |                                    |
| <i>Genotyp</i>                             |                                |                                    |                                |                                    |
| - Genotyp 1a                               | 95 % (82/86)                   | 95 % (84/88)                       | 99 % (84/85)                   | 99 % (87/88)                       |
| - Genotyp 1b                               | 87 % (20/23)                   | 100 % (23/23)                      | 100 % (24/24)                  | 100 % (23/23)                      |
| <i>Cirros</i>                              |                                |                                    |                                |                                    |
| - Nej                                      | 95 % (83/87)                   | 100 % (88/88) <sup>c</sup>         | 99 % (85/86) <sup>c</sup>      | 99 % (88/89)                       |
| - Ja <sup>d</sup>                          | 86 % (19/22)                   | 82 % (18/22)                       | 100 % (22/22)                  | 100 % (22/22)                      |
| <i>Tidigare HCV-behandling</i>             |                                |                                    |                                |                                    |
| - PEG-IFN+RBV                              | 93 % (40/43)                   | 96 % (45/47)                       | 100 % (58/58)                  | 98 % (58/59)                       |
| - HCV- proteashämmare + PEG-IFN+RBV        | 94 % (62/66)                   | 97 % (62/64)                       | 98 % (49/50)                   | 100 % (51/51)                      |

a. Nämnare för recidiv är antalet patienter med HCV-RNA < LLOQ vid den sista bedömningen under behandling.

b. Övrigt inkluderar patienter som inte uppnådde SVR och inte uppfyllde kriterierna för virologisk svikt (t.ex. förlorad för uppföljning).

c. Patienter som saknade cirrosstatus uteslöts från denna subgruppsanalys.

d. Metavir-poäng = 4 eller Ishak-poäng ≥ 5 genom leverbiposi, eller FibroTest-poäng > 0,75 och (APRI) > 2.

Tabell 16 visar recidivfrekvensen för 12 veckors regimerna (med eller utan ribavirin) för valda subgrupper (se även ovanstående avsnitt "Effekt av resistensassocierade HCV- varianter vid baseline på behandlingsresultat"). Hos icke- cirrotiska patienter förekom recidiv endast i närvaro av NS5A-RAV vid baseline, och under behandling med ledipasvir/sofosbuvir utan ribavirin. Hos cirrotiska patienter förekom recidiv med båda regimerna, och i frånvaro och närvaro av NS5A-RAV vid baseline.

Tabell 16: Recidivfrekvens för valda subgrupper i studien ION-2

|                                                                                       | LDV/SOF<br>12 veckor (n = 109) | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor (n = 111) | LDV/SOF<br>24 veckor (n = 109) | LDV/SOF+RBV<br>24 veckor (n = 111) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Antal med svar vid slutet av behandlingen                                             | 108                            | 111                                | 109                            | 110                                |
| <i>Cirros</i>                                                                         |                                |                                    |                                |                                    |
| - Nej                                                                                 | 5 % (4/86) <sup>a</sup>        | 0 % (0/88) <sup>b</sup>            | 0 % (0/86) <sup>b</sup>        | 0 % (0/88)                         |
| - Ja                                                                                  | 14 % (3/22)                    | 18 % (4/22)                        | 0 % (0/22)                     | 0 % (0/22)                         |
| <i>Förekomst av resistensassocierade NS5A-substitutioner vid baseline<sup>c</sup></i> |                                |                                    |                                |                                    |
| - Nej                                                                                 | 3 % (3/91) <sup>d</sup>        | 2 % (2/94)                         | 0 % (0/96)                     | 0 % (0/95) <sup>f</sup>            |
| - Ja                                                                                  | 24 % (4/17) <sup>e</sup>       | 12 % (2/17)                        | 0 % (0/13)                     | 0 % (0/14)                         |

a. Dessa 4 icke-cirrotiska patienter med recidiv hade alla resistensassocierade NS5A-polymorfismer vid baseline.

b. Patienter som saknade cirrosstatus uteslöts från denna subgruppsanalys.

c. Analysen (genom djupsekvensering) inkluderade NS5A-resistensassocierade polymorfismer som gav 2,5-faldig förändring av EC50 (K24G/N/R, M28A/G/T, Q30E/G/H/L/K/R/T, L31I/F/M/V, P32L, S38F, H58D, A92K/T och Y93C/F/H/N/S för HCV-infektion av genotyp 1a och L31I/F/M/V, P32L, P58D, A92K och Y93C/H/N/S för HCV-infektion av genotyp 1b).

d. 3/3 av dessa patienter hade cirros.

e. 0/4 av dessa patienter hade cirros.

f. En patient som uppnådde en virusbelastning < LLOQ vid slutet av behandlingen saknade NS5A-data vid baseline och uteslöts från analysen.

#### *Tidigare behandlade vuxna med cirros – SIRIUS – genotyp 1*

I SIRIUS ingick patienter med kompenserad cirros med initial behandlingssvikt av pegylerat interferon (PEG-IFN) + ribavirin och därefter en misslyckad behandlingsregim bestående av pegylerat interferon + ribavirin + en NS3/4A-proteashämmare. Cirros bekräftades med biopsi, Fibroscan, (> 12,5 kPa) eller FibroTest > 0,75 och ett AST:platelet ratio index (APRI) på > 2.

Studien (dubbelblind och placebokontrollerad) utvärderade 24 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir (med ribavirinplacebo) *kontra* 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir i kombination med ribavirin. Patienter i den senare behandlingsarmen fick placebo (för ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin) under de första 12 veckorna följt av aktiv blindad behandling under de efterföljande 12 veckorna. Patienter stratifierades efter HCV-genotyp (1a *kontra* 1b) och tidigare behandlingssvar (huruvida HCV-RNA <LLOQ hade uppnåtts).

Demografi och karakteristika vid baseline var balanserade mellan de två behandlingsgrupperna.

Medianålder var 56 år (intervall 23 till 77); 74 % av patienterna var män; 97 % var vita; 63 % hade en HCV-infektion av genotyp 1a; 94 % hade icke-CC IL28B-alleler (CT eller TT).

Av de 155 patienter som rekryterades avbröt 1 patient behandlingen medan denna stod på placebo. Av de återstående 154 patienterna uppnådde totalt 149 SVR12 i bägge behandlingsgrupperna. 96 % (74/77) av patienterna i gruppen ledipasvir/sofosbuvir i kombination med ribavirin i 12 veckor och 97 % (75/77) av patienterna i gruppen ledipasvir/sofosbuvir i 24 veckor. Alla 5 patienterna som inte uppnådde SVR12 fick recidiv efter svar vid slutet av behandlingen (se avsnittet "Resistens" – "I kliniska studier" ovan).

#### *Tidigare behandlade vuxna som haft svikt på sofosbuvir + ribavirin ± PEG-IFN*

Effekten av ledipasvir/sofosbuvir hos patienter som tidigare haft svikt på behandling med sofosbuvir + ribavirin ± PEG-IFN stöds av två kliniska studier. I studien 1118 behandlades 44 patienter med infektion av genotyp 1, inklusive 12 cirrotiska patienter, som tidigare haft svikt behandling med på sofosbuvir + ribavirin + PEG-IFN eller med sofosbuvir + ribavirin, med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin i 12 veckor. SVR var 100 % (44/44). I studien ION-4 rekryterades 13 patienter med samtidig infektion med HCV/hiv-1 med genotyp 1, inklusive 1 cirrotisk patient, som hade haft svikt på en regim med sofosbuvir + ribavirin. SVR var 100 % (13/13) efter 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir.

#### *Vuxna med samtidig infektion med HCV/hiv - ION-4*

ION-4 var en öppen klinisk studie för att utvärdera säkerhet och effekt av 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir utan ribavirin, hos behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter med CHC av genotyp 1 eller 4 och samtidig infektion med hiv-1. Behandlingserfarna patienter hade behandlingssvikt på tidigare behandling med PEG-IFN + ribavirin ± en HCV-proteashämmare eller sofosbuvir + ribavirin ± PEG-IFN. Patienter stod på stabil hiv-1 antiretroviral behandling som inkluderade emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat, administrerat med efavirenz, rilpivirin eller raltegravir.

Medianåldern var 52 år (intervall: 26 till 72); 82 % av patienterna var män; 61 % var vita; 34 % var svarta; 75 % hade en HCV-infektion av genotyp 1a; 2 % hade en infektion av genotyp 4; 76 % hade icke-CC IL28B-alleler (CT eller TT) och 20 % hade kompenserad cirros. Femtiofem procent (55 %) av patienterna var behandlingserfarna.

**Tabell 17: Svarsfrekvens i ION-4-studien**

|                                            | <b>LDV/SOF<br/>12 veckor<br/>(n = 335)</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SVR                                        | 96 % (321/335) <sup>a</sup>                |
| <i>Resultat för patienter utan SVR</i>     |                                            |
| Virologisk svikt under behandling          | < 1 % (2/335)                              |
| Recidiv <sup>b</sup>                       | 3 % (10/333)                               |
| Övrigt <sup>c</sup>                        | < 1 % (2/335)                              |
| <i>SVR-frekvenser för valda subgrupper</i> |                                            |
| Patienter med cirros                       | 94 % (63/67)                               |
| Tidigare behandlade patienter med cirros   | 98 % (46/47)                               |

a. 8 patienter med HCV-infektion av genotyp 4 rekryterades till studien varav 8/8 uppnådde SVR12.

b. Nämnare för recidiv är antalet patienter med HCV-RNA < LLOQ vid den sista bedömningen under behandling.

c. Övrigt inkluderar patienter som inte uppnådde SVR och inte uppfyllde kriterierna för virologisk svikt (t.ex. förlorad för uppföljning).

#### *Vuxna med samtidig infektion med HCV/hiv - ERADICATE*

ERADICATE var en öppen studie för att utvärdera 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir på 50 patienter med CHC av genotyp 1 och samtidig infektion med hiv. Samtliga patienter var behandlingsnaiva för HCV-behandling och utan cirros, 26 % (13/50) av patienterna var naiva för antiretroviral hiv-behandling och 74 % (37/50) av patienterna fick samtidig antiretroviral hiv-behandling. Vid tidpunkten för interimsanalysen hade 40 patienter nått 12 veckor efter behandling och SVR12 var 98 % (39/40).

### *Patienter som väntar på eller har genomgått levertransplantation - SOLAR-1 och SOLAR-2*

SOLAR-1 och SOLAR-2 var två öppna kliniska studier som utvärderade 12 och 24 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir i kombination med ribavirin hos patienter med HCV av genotyp 1 och 4 som har genomgått levertransplantation och/eller har dekompenenserad leversjukdom. De två studierna hade identisk design. Patienterna rekryterades till en av sju grupper baserat på levertransplantationsstatus och leversviktens svårighetsgrad (se tabell 18). Patienter med CPT-klass > 12 exkluderades. Inom varje grupp randomiserades patienterna i förhållandet 1:1 till att få ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin i 12 eller 24 veckor.

Demografi och karakteristiska vid baslinjen var balanserade mellan behandlingsgrupperna. Bland de 670 behandlade patienterna var medianåldern 59 år (intervall: 21–81 år); 77 % av patienterna var män; 91 % var vita; genomsnittligt BMI-värde var 28 kg/m<sup>2</sup> (intervall: 18–49 kg/m<sup>2</sup>); 94 % och 6 % hade HCV av genotyp 1 respektive 4; 78 % av patienterna hade sviktat på en tidigare HCV-behandling. Av de patienter som hade dekompenenserad cirros (före eller efter transplantation) hade 64 % CPT-klass B och 36 % CPT-klass C vid screening, och 24 % hade ett MELD-värde (*model for end stage liver disease*) som översteg 15.

**Tabell 18: Sammantagna svarsfrekvenser (SVR12) i studierna SOLAR-1 och SOLAR-2**

|                       | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor<br>(n = 307) <sup>a,b</sup> | LDV/SOF+RBV<br>24 veckor<br>(n = 307) <sup>a,b</sup> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                       | SVR                                                  | SVR                                                  |
| Före transplantation  |                                                      |                                                      |
| CPT B                 | 87 % (45/52)                                         | 92 % (46/50)                                         |
| CPT C                 | 88 % (35/40)                                         | 83 % (38/46)                                         |
| Efter transplantation |                                                      |                                                      |
| Metavir-poäng F0-F3   | 95 % (94/99)                                         | 99 % (99/100)                                        |
| CPT A <sup>c</sup>    | 98 % (55/56)                                         | 96 % (51/53)                                         |
| CPT B <sup>c</sup>    | 89 % (41/46)                                         | 96 % (43/45)                                         |
| CPT C <sup>c</sup>    | 57 % (4/7)                                           | 78 % (7/9)                                           |
| FCH                   | 100 % (7/7)                                          | 100 % (4/4)                                          |

a. Tolv patienter, transplanterade före efterbehandling vecka 12 med HCV RNA < LLOQ vid sista mätningen före transplantationen, exkluderades..

b. Två patienter, som inte hade dekompenenserad cirros och inte heller genomgått levertransplantation, exkluderades på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna för någon av behandlingsgrupperna.

c. CPT = Child-Pugh-Turcotte. FCH = fibrotiserande kolestatisk hepatit, CPT A = CPT-klass 5-6 (kompenserad), CPT B = CPT-klass 7-9 (dekompenenserad), CPT C = CPT-klass 10-12 (dekompenenserad).

Fyrtio patienter med CHC av genotyp 4 rekryterades till studierna SOLAR-1 och SOLAR-2. SVR12 var 92 % (11/12) och 100 % (10/10) hos patienter som genomgått transplantation utan dekompenenserad cirros, samt 60 % (6/10) och 75 % (6/8) hos patienterna med dekompenenserad cirros (före och efter levertransplantation) som behandlades i 12 respektive 24 veckor. Av de 7 patienter som inte uppnådde SVR12 fick 3 recidiv, samtliga hade dekompenenserad cirros och behandlades med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin i 12 veckor.

Förändring av MELD-värde och CPT-klass från baseline till vecka 12 efter behandlingen analyserades hos samtliga patienter med dekompenenserad cirros (före eller efter transplantation) som uppnådde SVR12 och för vilka data fanns tillgängliga (n = 123) för att bedöma effekten av SVR12 på leverfunktionen.

*Förändring i MELD:* Hos de patienter som uppnådde SVR12 med 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, fick 57 % (70/123) respektive 19 % (23/123) en förbättring eller ingen förändring av MELD-värdet från baslinjen till vecka 12 efter behandlingen. Av de 32 patienter vars MELD-värde var  $\geq 15$  vid baslinjen hade 59 % (19/32) en MELD på  $< 15$  12 veckor efter behandling. Observerade förbättringar i MELD orsakades i hög grad av förbättringar i totalt bilirubin.

*Förändring i CPT-värde och -klass:* Hos de patienter som uppnådde SVR12 med 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, fick 60 % (74/123) respektive 34 % (42/123) en förbättring eller ingen förändring av CPT-värdet från baslinjen till vecka 12 efter behandlingen. Av de 32 patienter som hade CPT C-cirros vid baslinjen hade 53 % (17/32) CPT B-cirros 12 veckor efter behandling. Av de 88 patienter som hade CPT-B-cirros vid baslinjen hade 25 % (22/88) CPT A-cirros efter behandling vecka 12. Observerade förbättringar i CPT-klass orsakades i hög grad av förbättringar i totalt bilirubin och albumin.

*Klinisk effekt och säkerhet för genotyp 2, 3, 4, 5 och 6 (se även avsnitt Varningar och försiktighet)*  
Ledipasvir/sofosbuvir har utvärderats för behandling av infektion med icke-genotyp 1 i små fas 2-studier, som sammanfattas nedan.

I de kliniska studierna inkluderades patienter med eller utan cirros som tidigare var obehandlade eller med tidigare behandlingssvikt med PEG-IFN + ribavirin +/- en HCV-proteashämmare.

Vid infektion med genotyp 2, 4, 5 och 6 bestod behandlingen av ledipasvir/sofosbuvir utan ribavirin, givet i 12 veckor (tabell 19). Vid infektion med genotyp 3 gavs ledipasvir/sofosbuvir med eller utan ribavirin, också i 12 veckor (tabell 20).

**Tabell 19: Svarsfrekvenser (SVR12) med ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor hos patienter infekterade med HCV av genotyp 2, 4, 5 och 6**

| Studie                   | GT | n  | TE <sup>a</sup> | SVR12        |               | Recidiv <sup>b</sup> |
|--------------------------|----|----|-----------------|--------------|---------------|----------------------|
|                          |    |    |                 | Totalt       | Cirros        |                      |
| Studie 1468 (LEPTON)     | 2  | 26 | 19 % (5/26)     | 96 % (25/26) | 100 % (2/2)   | 0 % (0/25)           |
| Studie 1119              | 4  | 44 | 50 % (22/44)    | 93 % (41/44) | 100 % (10/10) | 7 % (3/44)           |
| Studie 1119              | 5  | 41 | 49 % (20/41)    | 93 % (38/41) | 89 % (8/9)    | 5 % (2/40)           |
| Studie 0122 (ELECTRON-2) | 6  | 25 | 0 % (0/25)      | 96 % (24/25) | 100 % (2/2)   | 4 % (1/25)           |

a. TE: antal tidigare behandlade patienter.

b. Nämnare för recidiv är antalet patienter med HCV-RNA  $< \text{LLOQ}$  vid den sista bedömningen under behandling.

**Tabell 20: Svarsfrekvenser (SVR12) hos patienter med infektion av genotyp 3 (ELECTRON-2)**

|                             | LDV/SOF+RBV<br>12 veckor |                      | LDV/SOF<br>12 veckor |                      |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | SVR                      | Recidiv <sup>a</sup> | SVR                  | Recidiv <sup>a</sup> |
| <i>Tidigare obehandlade</i> | 100 % (26/26)            | 0 % (0/26)           | 64 % (16/25)         | 33 % (8/24)          |
| Patienter utan cirros       | 100 % (20/20)            | 0 % (0/21)           | 71 % (15/21)         | 25 % (5/20)          |
| Patienter med cirros        | 100 % (6/6)              | 0 % (0/5)            | 25 % (1/4)           | 75 % (3/4)           |
| <i>Tidigare behandlade</i>  | 82 % (41/50)             | 16 % (8/49)          | NS                   | NS                   |
| Patienter utan cirros       | 89 % (25/28)             | 7 % (2/27)           | NS                   | NS                   |
| Patienter med cirros        | 73 % (16/22)             | 27 % (6/22)          | NS                   | NS                   |

NS: inte studerat.

a. Nämnare för recidiv är antalet patienter med HCV-RNA < LLOQ vid den sista bedömningen under behandling.

#### *Patienter med nedsatt njurfunktion*

Studie 0154 var en öppen klinisk studie som utvärderade säkerhet och effekt efter 12 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir hos 18 patienter infekterade med HCV av genotyp 1 och gravt nedsatt njurfunktion som inte krävde dialys. Vid baslinjen hade två patienter cirros och genomsnittligt eGFR var 24,9 ml/min (intervall: 9,0–39,6). SVR12 uppnåddes hos 18/18 patienter.

Studie 4063 var en öppen klinisk studie med tre grupper där 8, 12 och 24 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir utvärderades hos totalt 95 patienter med genotyp 1 (72 %), 2 (22 %), 4 (2 %), 5 (1 %) eller 6 (2 %) CHC och dialyskrävande ESRD: 45 behandlingsnaiva patienter infekterade med HCV av genotyp 1 utan cirros som fick ledipasvir/sofosbuvir i 8 veckor; 31 behandlingserfarna patienter infekterade med HCV av genotyp 1, samt behandlingsnaiva eller behandlingserfarna patienter med infektion av genotyp 2, 5 och 6 utan cirros som fick ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor; samt 19 patienter infekterade med HCV av genotyp 1, 2 och 4 med kompenserad cirros som fick ledipasvir/sofosbuvir i 24 veckor. Av totalt 95 patienter hade 20 % av patienterna cirros vid baslinjen, 22 % var behandlingserfarna, 21 % hade genomgått en njurtransplantation, 92 % gick på hemodialys och 8 % gick på peritonealdialys; genomsnittstiden för dialys var 11,5 år (intervall: 0,2 till 43,0 år). SVR-frekvenserna för grupperna med 8, 12 och 24 veckors behandling av ledipasvir/sofosbuvir var 93 %, (42/45), 100 % (31/31) respektive 79 % (15/19). Av de 7 patienter som inte uppnådde SVR12 fanns ingen som upplevde virologisk svikt eller återfall.

#### *Pediatrisk population*

Effekten av ledipasvir/sofosbuvir hos HCV-infekterade patienter från 3 års ålder utvärderades i en öppen klinisk fas 2-studie som omfattade 226 patienter: 221 patienter med CHC av genotyp 1, 2 patienter med CHC av genotyp 3 och 3 patienter med CHC av genotyp 4 (studie 1116) (se avsnitt Dosering för information om pediatrik användning).

#### *Patienter i åldern 12 till < 18 år:*

Ledipasvir/sofosbuvir utvärderades hos 100 patienter i åldern 12 till < 18 år med HCV-infektion av genotyp 1. Totalt 80 patienter (n=80) var behandlingsnaiva, medan 20 patienter (n=20) var behandlingserfarna. Alla patienter behandlades med ledipasvir/sofosbuvir under 12 veckor.

Demografi och karakteristika vid baslinjen balanserades mellan behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter. Medianåldern var 15 år (intervall: 12 till 17), 63 % av patienterna var flickor, 91 % var vita, 7 %

var svarta och 2 % var asiater, 13 % var latinamerikaner, genomsnittlig vikt var 61,3 kg (intervall: 33,0 till 126,0 kg), 55 % hade baslinjenivåer av HCV-RNA som var större än eller lika med 800 000 IE/ml, 81 % hade HCV-infektion av genotyp 1a och 1 patient som var behandlingsnaiv hade känd cirros. Majoriteten av patienterna (84 %) hade blivit infekterade genom vertikal transmission.

Andelen som uppnådde SVR12 var totalt 98 % (98 % [78/80] hos behandlingsnaiva patienter och 100 % [20/20] hos behandlingserfarna patienter). Totalt 2 av 100 patienter (2 %), båda behandlingsnaiva, uppnådde inte SVR12 (på grund av förlust av uppföljning). Ingen patient upplevde virologisk svikt.

#### *Patienter i åldern 6 till < 12 år:*

Ledipasvir/sofosbuvir utvärderades hos 92 patienter i åldern 6 till < 12 år med HCV-infektion av genotyp 1, 3 eller 4. Totalt 72 patienter (78 %) var behandlingsnaiva och 20 patienter (22 %) var behandlingserfarna. Åttionio av patienterna (87 patienter med HCV-infektion av genotyp 1 och 2 patienter med HCV-infektion av genotyp 4) behandlades med ledipasvir/sofosbuvir under 12 veckor, 1 behandlingserfaren patient med HCV-infektion av genotyp 1 och cirros behandlades med ledipasvir/sofosbuvir under 24 veckor och 2 behandlingserfarna patienter med HCV-infektion av genotyp 3 behandlades med ledipasvir/sofosbuvir plus ribavirin under 24 veckor.

Medianåldern var 9 år (intervall: 6 till 11), 59 % av patienterna var pojkar, 79 % var vita, 8 % var svarta och 5 % var asiater, 10 % var latinamerikaner. Genomsnittlig vikt var 32,8 kg (intervall: 17,5 till 76,4 kg), 59 % hade baslinjenivåer av HCV-RNA som var större än eller lika med 800 000 IE/ml, 84 % hade HCV-infektion av genotyp 1a, 2 patienter (1 behandlingsnaiv, 1 behandlingserfaren) hade känd cirros. Majoriteten av patienterna (97 %) hade blivit infekterade genom vertikal transmission.

Andelen som uppnådde SVR var 99 % totalt (99 % [88/89], 100 % [1/1] och 100 % [2/2] av patienterna som behandlades med ledipasvir/sofosbuvir under 12 veckor, ledipasvir/sofosbuvir under 24 veckor respektive ledipasvir/sofosbuvir plus ribavirin under 24 veckor). Den behandlingsnaiva patienten med HCV-infektion av genotyp 1 och cirros som behandlades med Harvoni under 12 veckor uppnådde inte SVR12 och fick återfall.

#### *Patienter i åldern 3 till < 6 år:*

Ledipasvir/sofosbuvir utvärderades hos 34 patienter i åldern 3 till < 6 år med HCV-infektion av genotyp 1 (n = 33) eller genotyp 4 (n = 1). Alla patienter var behandlingsnaiva och behandlades med ledipasvir/sofosbuvir under 12 veckor. Medianåldern var 5 år (intervall: 3 till 5), 71 % av patienterna var flickor, 79 % var vita, 3 % var svarta och 6 % var asiater, 18 % var latinamerikaner, genomsnittlig vikt var 19,2 kg (intervall: 10,7 till 33,6 kg), 56 % hade baslinjenivåer av HCV-RNA som var större än eller lika med 800 000 IE/ml, 82 % hade HCV-infektion av genotyp 1a; ingen patient hade känd cirros. Alla patienter (100 %) hade blivit infekterade genom vertikal transmission.

Andelen som uppnådde SVR var totalt 97 % (97 % [32/33] av patienterna med HCV-infektion av genotyp 1 och 100 % [1/1] av patienterna med HCV-infektion av genotyp 4). En patient som avbröt studiebehandlingen i förtid efter fem dagar på grund av läkemedlets onormala smak uppnådde inte SVR.

## **Farmakokinetik**

### **Absorption**

Efter peroral administrering av ledipasvir/sofosbuvir till HCV-infekterade patienter observerades medianvärdet för maximal plasmakoncentration av ledipasvir 4,0 timmar efter dosering. Sofosbuvir absorberades snabbt och medianvärdet för maximala plasmakoncentrationer observerades ~ 1 timme efter dosering. Medianvärdet för maximal plasmakoncentration av GS-331007 observerades 4 timmar efter dosering.

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys av HCV-infekterade patienter var det geometriska medelvärde för  $AUC_{0-24}$  vid steady state för ledipasvir ( $n = 2\,113$ ), sofosbuvir ( $n = 1\,542$ ) och GS-331007 ( $n = 2\,113$ ) 7 290, 1 320 respektive 12 000 ng•h/ml.  $C_{max}$  vid steady state för ledipasvir, sofosbuvir och GS-331007 var 323, 618 respektive 707 ng/ml.  $AUC_{0-24}$  och  $C_{max}$  för sofosbuvir och GS-331007 var likartade hos friska vuxna frivilliga och patienter med HCV-infektion. I förhållande till friska frivilliga ( $n = 191$ ) var  $AUC_{0-24}$  och  $C_{max}$  för ledipasvir 24 % lägre respektive 32 % lägre hos HCV-infekterade patienter.  $AUC$  för ledipasvir är dosproportionell över dosintervallet 3 till 100 mg.  $AUC$  för sofosbuvir och GS-331007 är i det närmaste dosproportionella över dosintervallet 200 mg till 400 mg.

#### *Effekt av föda*

Vid administrering av en engångsdos ledipasvir/sofosbuvir med en måttligt fettrik eller fettrik måltid ökade  $AUC_{0-inf}$  för sofosbuvir ungefär 2-faldigt men  $C_{max}$  för sofosbuvir påverkades inte signifikant jämfört med fasteförhållanden. Exponeringen för GS-331007 och ledipasvir förändrades inte av någondera måltiden. Harvoni kan administreras utan hänsyn till föda.

#### **Distribution**

Ledipasvir binds till > 99,8 % till humana plasmaproteiner. Efter en engångsdos på 90 mg av [ $^{14}$ C]-ledipasvir till friska frivilliga var blod:plasma-kvoten för [ $^{14}$ C]-radioaktivitet mellan 0,51 och 0,66.

Sofosbuvir binds till cirka 61-65 % till humana plasmaproteiner och bindningen är oberoende av läkemedelskoncentrationen över intervallet 1 µg/ml till 20 µg/ml. Proteinbindningen av GS-331007 var minimal i human plasma. Efter en engångsdos på 400 mg av [ $^{14}$ C]-sofosbuvir till friska frivilliga var blod:plasma-kvoten för [ $^{14}$ C]-radioaktivitet cirka 0,7.

#### **Metabolism**

*In vitro* observerades ingen påvisbar metabolism av ledipasvir av humant CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 och CYP3A4. Tecken på långsam oxidativ metabolism via en okänd mekanism har observerats. Efter en engångsdos på 90 mg av [ $^{14}$ C]-ledipasvir orsakas den systemiska exponeringen nästan uteslutande av modersubstansen (> 98 %). Oförändrat ledipasvir är också den huvudsakliga form som förekommer i feces.

Sofosbuvir metaboliseras i omfattande grad i levern och bildar det farmakologiskt aktiva nukleosidanalogtrifosfatet GS-461203. Den aktiva metaboliten observeras inte. Den metabola aktiveringsvägen omfattar sekventiell hydrolys av karboxylesterdelen katalyserad av humant cathepsin A eller karboxylesteras 1 och fosforamidatklyvning av histidin-triad-nukleotidbindande protein 1 följt av fosforylering via biosyntesvägen för pyrimidinnukleotider. Defosforylering leder till bildandet av nukleosidmetaboliten GS-331007 som inte kan refosfolyseras effektivt och som saknar aktivitet mot HCV *in vitro*. Vad avser ledipasvir/sofosbuvir står GS-331007 för cirka 85 % av den totala systemiska exponeringen.

#### **Eliminering**

Efter en peroral engångsdos på 90 mg av [ $^{14}$ C]-ledipasvir var den genomsnittliga totala återvinningen av [ $^{14}$ C]-radioaktivitet i feces och urin 87 % och merparten av den radioaktiva dosen återvanns från feces (86 %). Oförändrat ledipasvir utsöndrat i feces stod för i genomsnitt 70 % av den administrerade dosen och den oxidativa metaboliten M19 stod för 2,2 % av dosen. Dessa data tyder på att biliär utsöndring av oförändrat ledipasvir är den huvudsakliga elimineringsvägen och att renal utsöndring är en mindre väg (cirka 1 %). Medianvärdet för terminal halveringstid för ledipasvir hos friska frivilliga efter administrering av ledipasvir/sofosbuvir under fasta var 47 timmar.

Efter en peroral engångsdos på 400 mg av [<sup>14</sup>C]-sofosbuvir var den genomsnittliga totala återvinningen större än 92 %, varav cirka 80 % återvanns i urin, 14 % i feces och 2,5 % i utandningsluft. Merparten av den del av sofosbuvirdosen som återvanns i urin förelåg som GS-331007 (78 %) medan 3,5 % återvanns som sofosbuvir. Dessa data visar att renalt clearance är den huvudsakliga elimineringsvägen för GS-331007 och en stor del utsöndras aktivt. Medianvärdet för terminal halveringstid för sofosbuvir och GS-331007 efter administrering av ledipasvir/sofosbuvir var 0,5 respektive 27 timmar.

Varken ledipasvir eller sofosbuvir är substrat för leverupptagstransportörer, organisk katjontransportör (OCT) 1, organisk anjontransportpolypeptid (OATP) 1B1 eller OATP1B3. GS-331007 är inte substrat för renala transportörer, inklusive organisk anjontransportör (OAT) 1 eller OAT3 eller OCT2.

### Ledipasvirs/sofosbuvirs potential att påverka andra läkemedel *in vitro*

Vid koncentrationer som uppnås kliniskt är ledipasvir inte en hämmare av hepatiska transportörer inklusive OATP 1B1 eller 1B3, BSEP, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, MATE (*multidrug and toxic compound extrusion transporter*) 1, MRP (*multidrug resistance protein*) 2 eller MRP4. Sofosbuvir och GS-331007 är inte hämmare av läkemedelstransportörerna P-gp, BCRP, MRP2, BSEP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1 och GS-331007 är inte en hämmare av OAT1, OCT2 och MATE1.

Sofosbuvir och GS-331007 är inte hämmare eller inducerare av CYP- eller uridindifosfatglukuronosyltransferas (UGT) 1A1-enzymen.

### Farmakokinetik hos särskilda populationer

#### Etnicitet och kön

Inga kliniskt relevanta farmakokinetiska skillnader kopplade till etnicitet har identifierats för ledipasvir, sofosbuvir eller GS-331007. Inga kliniskt relevanta farmakokinetiska skillnader kopplade till kön har identifierats för sofosbuvir eller GS-331007. AUC och C<sub>max</sub> för ledipasvir var 77 % respektive 58 % högre hos kvinnor än hos män. Sambandet mellan kön och exponering för ledipasvir ansågs emellertid inte kliniskt relevant.

#### Äldre

Populationsfarmakokinetisk analys av HCV-infekterade patienter visade att ålder inte hade någon kliniskt relevant effekt på exponeringen för ledipasvir, sofosbuvir eller GS-331007 inom det analyserade åldersintervallet (18 till 80 år). Kliniska studier av ledipasvir/sofosbuvir omfattade 235 patienter (8,6 % av det totala antalet patienter) i åldern 65 år och äldre.

#### Nedsatt njurfunktion

I tabell 21 ges en sammanfattning av hur olika grader av nedsatt njurfunktion inverkar på exponeringen för komponenterna i Harvoni, jämfört med försökspersoner som har normal njurfunktion, se beskrivning i nedanstående text.

**Tabell 21: Hur olika grader av nedsatt njurfunktion inverkar på exponeringen (AUC) för sofosbuvir, GS-331007 och ledipasvir jämfört med försökspersoner som har normal njurfunktion.**

|  | HCV-negativa patienter                          |                             |                          |                     | Patienter infekterade med HCV |                      |
|--|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | Lätt nedsatt njurfunkt. (eGFR ≥ 50 och < 80 ml/ | Måttligt nedsatt njurfunkt. | Gravt nedsatt njurfunkt. | Dialyskrävande ESRD | Gravt nedsatt njurfunkt.      | Dialys-krävande ESRD |

|            | min/<br>1,73 m <sup>2</sup> ) | (eGFR ≥ 30<br>och < 50<br>ml/min/1,73<br>m <sup>2</sup> ) | (eGFR < 30<br>ml/min/<br>1,73 m <sup>2</sup> ) | Dosering 1<br>tim före dial<br>ys | Dosering 1<br>tim efter dial<br>ys | (eGFR < 30<br>ml/<br>min/<br>1,73 m <sup>2</sup> ) |         |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Sofosbuvir | 1,6 x ↑                       | 2,1 x ↑                                                   | 2,7 x ↑                                        | 1,3 x ↑                           | 1,6 x ↑                            | ~ 2 x ↑                                            | 1,9 x ↑ |
| GS-331007  | 1,6 x ↑                       | 1,9 x ↑                                                   | 5,5 x ↑                                        | ≥ 10 x ↑                          | ≥ 20 x ↑                           | ~ 6 x ↑                                            | 23 x ↑  |
| Ledipasvir | -                             | -                                                         | ↔                                              | -                                 | -                                  | -                                                  | 1,6 x ↑ |

↔ anger ingen klinisk relevant förändring av exponeringen för ledipasvir.

Farmakokinetiken för ledipasvir studerades med en engångsdos på 90 mg av ledipasvir hos HCV-negativa vuxna patienter med gravt nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min enligt Cockcroft-Gault, median [intervall] CrCl 22 [17-29] ml/min).

Farmakokinetiken för sofosbuvir studerades hos HCV-negativa vuxna patienter med lätt (eGFR ≥ 50 och < 80 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>), måttligt (eGFR ≥ 30 och < 50 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>), gravt nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) och patienter med hemodialyskrävande ESRD efter en engångsdos på 400 mg av sofosbuvir, i förhållande till patienter med normal njurfunktion (eGFR > 80 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>). GS-331007 avlägsnas effektivt med hemodialys med en extraktionskoefficient på cirka 53 %. Efter en engångsdos på 400 mg av sofosbuvir avlägsnade en 4 timmars hemodialys cirka 18 % av den administrerade sofosbuvirdosen.

Hos HCV-infekterade vuxna patienter med gravt nedsatt njurfunktion som behandlades med ledipasvir/sofosbuvir under 12 veckor (n = 18), stämde farmakokinetiken för ledipasvir, sofosbuvir och GS-331007 överens med den som observerats hos HCV-negativa patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Farmakokinetiken för ledipasvir, sofosbuvir och GS-331007 studerades hos HCV-infekterade vuxna patienter med dialyskrävande ESRD som behandlades med ledipasvir/sofosbuvir (n = 94) i 8, 12 eller 24 veckor, och jämfördes med patienter utan nedsatt njurfunktion i fas 2-/3-prövningarna av ledipasvir/sofosbuvir.

#### *Nedsatt leverfunktion*

Farmakokinetiken för ledipasvir studerades med en engångsdos på 90 mg av ledipasvir hos HCV-negativa vuxna patienter med gravt nedsatt leverfunktion (CPT klass C). Ledipasvirs plasmaexponering (AUC<sub>inf</sub>) var likartad hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion och kontrollpatienter med normal leverfunktion. En populationsfarmakokinetisk analys av HCV-infekterade vuxna patienter visade att cirros (vilket inkluderade dekompenenserad cirros) inte hade någon kliniskt relevant effekt på exponeringen för ledipasvir.

Farmakokinetiken för sofosbuvir studerades efter 7 dagars dosering av 400 mg sofosbuvir hos HCV-infekterade vuxna patienter med måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (CPT klass B och C). I förhållande till patienter med normal leverfunktion var AUC<sub>0-24</sub> för sofosbuvir 126 % och 143 % högre vid måttligt respektive gravt nedsatt leverfunktion medan AUC<sub>0-24</sub> för GS-331007 var 18 % respektive 9 % högre. En populationsfarmakokinetisk analys av HCV infekterade patienter visade att cirros (vilket inkluderade dekompenenserad cirros) inte hade någon kliniskt relevant effekt på exponeringen för sofosbuvir och GS-331007.

#### *Kroppsvikt*

Kroppsvikten hade inte någon signifikant effekt på exponeringen för sofosbuvir enligt en populationsfarmakokinetisk analys. Exponeringen för ledipasvir minskar med ökande kroppsvikt men effekten anses inte vara kliniskt relevant.

#### *Pediatrisk population*

Exponering för ledipasvir, sofosbuvir och GS-331007 hos pediatrika patienter från 3 års ålder var liknande dem för vuxna i fas 2/3-studier, efter administrering av ledipasvir/sofosbuvir. 90% konfidensintervall för kvoten för geometriska minstakvadratmedelvärden för alla PK-parametrar av intresse låg inom de förutbestämda ekvivalensgränserna på mindre än 2-faldigt (50 % till 200 %), med undantag av  $C_{\text{tau}}$  för ledipasvir hos pediatrika patienter från 12 års ålder vilket var 84 % högre (90 % KI: 168 % till 203 %) och ansågs inte kliniskt relevant.

Farmakokinetiken för ledipasvir, sofosbuvir och GS-331007 har inte fastställts för pediatrika patienter < 3 år (se avsnitt Dosering).

## **Prekliniska uppgifter**

### **Ledipasvir**

Inga målorgan för toxicitet identifierades i studier på råtta och hund med ledipasvir vid AUC-exponeringar cirka 7 gånger högre än exponeringen hos människa vid rekommenderad klinisk dos.

Ledipasvir var inte gentoxiskt i ett batteri av *in vitro*- eller *in vivo*-analyser, däribland bakteriell mutagenicitet, kromosomavvikelse vid användning av lymfocyter från humant perifert blod och råttmikrokärnanalyser *in vivo*.

Ledipasvir var inte karcinogent i 26-veckorsstudien på transgena rasH2-möss och den 2 år långa karcinogenicitetsstudien på råtta vid exponeringar hos möss upp till 26 gånger högre och hos råtta 8 gånger högre än exponeringen hos människa.

Ledipasvir hade inga ogynnsamma effekter på parning och fertilitet. Hos honråttor var det genomsnittliga antalet corpora lutea och implantationsställen något reducerat vid maternell exponering 6 gånger högre än exponeringen hos människa vid rekommenderad klinisk dos. Vid nivån för ingen observerad effekt var AUC-exponeringen för ledipasvir cirka 7 och 3 gånger högre hos hanar respektive honor än exponeringen hos människa vid rekommenderad klinisk dos.

Inga teratogena effekter observerades i utvecklingstoxicitetsstudier med ledipasvir på råtta och kanin.

I en pre- och postnatal studie på råtta, med en maternell toxisk dos, uppvisade råttavkomma under utveckling genomsnittligt minskad kroppsvikt och kroppsviktsökning vid exponering *in utero* (via maternell dosering) och under laktation (via maternell mjölk) vid en maternell exponering 4 gånger högre än exponeringen hos människa vid rekommenderad klinisk dos. Inga effekter på överlevnad, fysisk och beteendemässig utveckling och reproduktionsförmåga observerades hos avkomman vid maternella exponeringar som var likartade exponeringen hos människa vid rekommenderad klinisk dos.

Vid administrering till lakterande råttor påvisades ledipasvir i plasma hos diande råttor, troligen på grund av utsöndring av ledipasvir via mjölk.

### Miljöriskbedömning

Miljöriskbedömningsstudier har visat att ledipasvir potentiellt är mycket persistent och mycket bioackumulativ (vPvB) i miljön (se avsnitt Anvisningar för destruktion).

### **Sofosbuvir**

I toxicitetsstudier med upprepad dosering till råtta och hund orsakade höga doser av 1:1 diastereomisk blandning biverkningar i lever (hund), hjärta (råtta) och magtarmkanalen (hund). Exponering för sofosbuvir hos gnagare kunde inte påvisas, sannolikt på grund av hög esterasaktivitet. Exponering för den främsta metaboliten GS-331007 vid doser som orsakar biverkningar var dock 16 gånger (råtta) respektive 71 gånger (hund) högre än den kliniska exponeringen på 400 mg sofosbuvir. Inga lever- eller hjärtfynd observerades i studier avseende kronisk toxicitet vid exponeringar 5 gånger (råtta) och 16 gånger (hund) högre än klinisk exponering. Inga lever- eller hjärtfynd observerades i de 2-åriga karcinogenicitetsstudierna vid exponeringar 17 gånger (mus) och 9 gånger (råtta) högre än klinisk exponering.

Sofosbuvir var inte gentoxiskt i ett batteri av *in vitro*- eller *in vivo*- analyser, däribland bakteriell mutagenicitet, kromosomavvikelse vid användning av lymfocyter från humant perifert blod och musmikrokärnanalyser *in vivo*.

Studier avseende karcinogenicitet i mus och råtta visade inte någon karcinogen potential hos sofosbuvir givet i doser upp till 600 mg/kg/dag i mus och 750 mg/kg/dag i råtta. Exponering för sofosbuvir i GS-331007 i dessa studier var upp till 17 gånger (mus) och 9 gånger (råtta) högre än den kliniska exponeringen på 400 mg sofosbuvir.

Sofosbuvir hade inga effekter på embryofetal livsduglighet eller på fertilitet hos råtta och var icke-teratogent i tillväxtstudier på råtta och kanin. Inga biverkningar på beteende, reproduktion eller utveckling hos avkomman i råtta rapporterades. I kaninstudier var exponering för sofosbuvir 6 gånger den förväntade kliniska exponeringen. I råttstudierna kunde exponering för sofosbuvir inte fastställas men exponeringsmarginaler var, baserade på den huvudsakliga metaboliten hos människa, cirka 5 gånger högre än den kliniska exponeringen på 400 mg sofosbuvir.

Sofosbuvir-härlett material passerade placentan hos dräktiga råttor och ut till mjölken hos lakterande råttor.

## **Innehåll**

Varje filmdragerad tablett innehåller 90 mg ledipasvir och 400 mg sofosbuvir.

### **Hjälpämnen med känd effekt:**

Varje filmdragerad tablett innehåller 156,8 mg laktos (som monohydrat) och 261 mikrogram para-orange aluminiumlack.

### **Tablettkärna**

Kopovidon, Laktosmonohydrat, Mikrokristallin cellulosa, Kroskarmellosnatrium, Kolloidal vattenfri kiseldioxid, Magnesiumstearat

### **Filmdragering**

Partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol, Titandioxid, Makrogol, Talk, Paraorange (E110) (endast Harvoni 90 mg/400 mg filmdragerad tablett)

## **Blandbarhet**

Ej relevant.

## Hållbarhet, förvaring och hantering

### Hållbarhet

6 år.

### Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

### Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Detta läkemedel kan utgöra en risk för miljön (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

## Förpackningsinformation

*Filmdragerad tablett 45 mg/200 mg Vit*, kapselformad, filmdragerad tablett med de ungefärliga måtten 14 mm x 7 mm, präglad med "GSI" på den ena sidan och med "HRV" på den andra sidan.

burk (fri prissättning), *tillhandahålls ej*

*Filmdragerad tablett 90 mg/400 mg Orange*, diamantformad, filmdragerad tablett med måtten 19 mm x 10 mm, präglad med "GSI" på den ena sidan och med "7985" på den andra sidan.

28 tablett(er) burk, 125120:-, (F)

Följande produkter har även paralleldistribuerade förpackningar:

Filmdragerad tablett 90 mg/400 mg