

Benzylpenicillin Vetcare

R_x

Boehringer Ingelheim Animal Health

Intramammär suspension 600 mg
(Tillhandahålls ej) (vit oljesuspension)

Intramammär suspension till lakterande ko

Djurslag:

Nötkreatur

Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Benzylpenicillin

Prokain

ATC-kod:

QJ51CE09

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2023-11-15

Innehåll

Varje förfylld spruta för intramammarium à 10 g innehåller:

Benzylpenicillinprokain 600 mg (600 000 IE). *Hjälpämnen:*

Methylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), pionier MMA, lecitin (E322), flytande paraffin.

Egenskaper

Bensylpenicillin är ett betalaktam-antibiotikum med baktericid effekt. Det verkar genom att blockera peptidoglukansyntesen hos grampositiva bakterier. Bensylpenicillin har ingen effekt på bakterier i vilofas och inte heller på de flesta Gram-negativa bakterier.

Streptokocker, som orsakar mastit, är normalt känsliga för penicillin. Vissa *Staphylococcus aureus* och koagulasnegativa stafylokocker producerar betalaktamas. Dessa stammar är resistenta mot penicillin. Penicillin är dock fortfarande det antibiotikum som rekommenderas för behandling av mastit orsakad av stafylokocker hos lakterande kor om det inte med känslighetstest konstaterats, att den patogena bakterien är resistent mot penicillin. Penicillin är verksamt mot betalaktamas-negativa bakterier i mycket mindre koncentrationer än annan antibiotika. MIC-värden för penicillin mot känsliga patogener är normalt mindre än 0,15 µg/ml.

Penicillin absorberas i mindre grad från juvret. Ödem och vätskeutsöndring från mjölkkörteln kan hämma fördelningen av penicillin i körtelvävnaden och kan medföra att tillräcklig läkemedelskoncentration inte uppnås. På friska djur är en dos CAREPEN VET. intramammarium tillräcklig för att upprätthålla koncentrationen i mjölken över MIC-värdet (0,15 µg/ml) för de penicillinkänsliga bakterierna i minst 24 timmar, även om urmjolkning sker varannan timme.

Största delen av penicillinet utsöndras oförändrat med mjölken. Ca. 40% av läkemedlet elimineras med mjölken vid första urmjolkningen och ca. 10% vid andra urmjolkningen. Hälften av den angivna penicillindosen är härmed eliminerad efter två urmjolkningar. Systemiskt absorberat penicillin utsöndras via njurarna i oförändrad form.

Indikationer

Mastit hos lakterande kor orsakad av penicillinkänsliga bakterier. Som komplement till parenteral behandling med penicillin vid klinisk mastit orsakad av invasiva bakteriearter, t.ex. *S. aureus*.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot penicillin eller prokain.

Försiktighet

Icke adekvat användning av läkemedlet kan öka prevalensen av penicillinresistenta bakterier. Användning av läkemedlet skall ske i överensstämmelse med nationella behandlingsrekommendationer. I vissa geografiska områden eller i vissa individuella besättningar är resistensen mot penicillin hos *S. aureus* utbredd.

Dräktighet och laktation

Läkemedlet är avsett att användas vid behandling av mastit hos lakterande kor. Läkemedlet kan användas till dräktiga kor.

Biverkningar

Vid överkänslighet mot penicillin eller prokain kan biverkningar som ödem, hudförändringar och anafylaktisk chock förekomma.

Dosering

En spruta per juverfjärdedel efter urmjolkning en gång om dagen. För att uppnå högre läkemedelskoncentration i vävnaden rekommenderas samtidig parenteral administration, speciellt vid fall orsakade av invasiva bakteriearter, t.ex. *S. aureus*. Behandlingen bör pågå i 3-5 dagar.

Rengör spenspetsen noggrant före administrering. Ta av hylsan på sprutans spets och töm sprutans innehåll i spenkanalen. Sprutan

har en dubbel spets. I vanliga fall rekommenderas att bara ta av den yttersta hylsan, då får man en ca. 5 mm lång spets. Genom att använda den korta spetsen minskas den mekaniska irritationen av spenkanalen, när läkemedlet administreras. Om även den inre hylsan avlägsnas får man en ca. 20 mm lång spets. Denna kan användas för att underlätta administrering, t.ex. i en spene med tydligt ödem. Efter administrering masseras juverdelen för att fördela läkemedlet jämnt. Juverdelen kan mjölkas ur varannan timme.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn. Mjolk: 6 dygn.

Interaktioner

Den baktericida effekten hos penicillin motverkas av bakteriostatiskt verkande antibiotika såsom tetracyklin eller spiramycin.

Överdoser

Inga kända risker.

Observera

Tvätta händerna efter användande av läkemedlet. Personer, som är överkänsliga mot penicillin eller andra betalaktam-antibiotika, bör undvika beröring med läkemedlet. Bensylpenicillin kan förorsaka överkänslighetsreaktioner vid hudkontakt och intagande. Utslag, svullnad i svalget, läppar och ansikte samt andnöd kan förekomma. Uppsök läkare om du upplever dessa symptom vid hantering av läkemedlet.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Intramammär suspension 600 mg vit oljesuspension

3 x 10 gram förfylld spruta, receptbelagd, *tillhandahålls ej*

5 x 10 gram förfylld spruta, receptbelagd, *tillhandahålls ej*

100 x 10 gram förfylld spruta, receptbelagd, *tillhandahålls ej*