

Banminth[®] vet.

R_x

Pharmaxim

Oral pasta 44 %

(Ljusgul)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:

Häst

Aktiv substans:

Pyrantel

ATC-kod:

QP52AF02

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2022-06-01.

Innehåll

Aktiv substans:

1 g pasta innehåller pyrantelembonat 439 mg.

Sorbitol

Natriumalginat

Polysorbat

Propylparaben E216

Methylparaben E218

Renat vatten

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Pyrantelembonat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk parlys av masken. Hos bandmask hämmar pyrantel ett antal biologiskt aktiva aminer. Pyrantel har hög aktivitet (>90 %) mot matura och imatura stadier av stora och små strongylider, spolmask och springmask. Substansen har vidare god effekt mot matura stadier av bandmask.

Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantelembonat är svårslösligt i vatten och absorberas dåligt från tarmkanalen.

De små mängder som absorberas (ca 10 %) metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

Indikationer

För behandling av adulta infektioner av strongylider (inkl. benzimidazol-resistenta små strongylider), *Oxyuris*, *Parascaris* och *Anoplocephala perfoliata*.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Dos och administreringsätt

Dosering

Rundmaskar: Normaldos 19 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 600 kg.

Bandmask: Normaldos 38 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 300 kg.

Administreringsätt

Banminth vet. oral pasta ska ges i munnen åt häst. Sprutan är graderad med 150 kg's intervall, som gäller vid behandling mot rundmaskar (t ex små blodmaskar). Ställ in doseringsringen på aktuell kroppsvikt. Vid behandling mot bandmask skall doseringsringen ställas in på den dubbla kroppsvikten. Ta därefter bort skyddshuven från sprutspetsen. För in sprutans pip i mungipan på hästen, mot tungans bakre del, och tryck ut önskad mängd pasta.

Blandbarhet

Inga kända.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 0 dygn

Interaktioner

Inga kända.

Överdoser

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
Ej relevant.

Hållbarhet

3 år

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25° C.

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktions av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Oral pasta 44 % Ljusgul

26 gram förfylld spruta, receptbelagd

10 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd

2 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd, *tillhandahålls ej*

10 x 10 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd, *tillhandahålls ej*