

## Bupremyl

### Mylan

Depotplåster 5 mikrog/timme

Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (Tillhandahålls ej) (Rektangulära, beigefärgade plåster med rundade hörn, märkta med "Buprenorphin" och 5 µg/h i blå färg.)



Narkotikaklass: IV - Narkotika med medicinsk användning

Analgetika, opioider, oripavinderivat

### Aktiv substans:

Buprenorfin

### ATC-kod:

N02AE01

För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Läs mer om avregistrerade läkemedel

Texten nedan gäller för:

**Bupremyl** depotplåster 5 mikrog/timme, 10 mikrog/timme och 20 mikrog/timme

**FASS-text:** Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-02-01.

## Indikationer

Behandling av icke maligna smärtor av måttlig intensitet när en opioid krävs för att uppnå tillräcklig smärtlindring.

Bupremyl är inte lämpligt för behandling av akuta smärttillstånd.

Bupremyl är avsett för vuxna.

## Kontraindikationer

- hos patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen buprenorfin eller något av hjälpämnen (se avsnitt Innehåll)
- hos opioidberoende patienter och för behandling av narkotikaabstinens
- vid tillstånd med potentiell eller pågående kraftigt försämrad funktion hos andningscentrum och andningsfunktion
- hos patienter som behandlas eller har behandlats med MAO-hämmare under de senaste två veckorna (se avsnitt Interaktioner)
- hos patienter som lider av myasthenia gravis
- hos patienter som lider av delirium tremens

## Dosering

### Dosering

#### *Patienter från 18 år och uppåt*

Då Bupremyl endast finns i styrkorna 10 mikrogram/timme depotplåster och 20 mikrogram/timme depotplåster är inte alla doseringar möjliga. Vid behov av annan styrka eller läkemedelsform bör andra bupremylprodukter användas. Hänsyn bör tas till patientens tidigare användning av opioider (se avsnitt Interaktioner), samt patientens aktuella allmäntillstånd och medicinska status.

#### *Titring*

Under inledande behandling med Bupremyl, kan kortverkande kompletterande smärtstillande läkemedel behövas (se avsnitt Interaktioner) tills smärtstillande effekt av Bupremyl har uppnåtts.

Dosen av Bupremyl kan titreras upp efter tre dagar, när maximal effekt av given dos uppnåtts. Efterföljande dosökningar kan därefter titreras utifrån behov av kompletterande smärtlindring och patientens respons på depotplåstrets analgetiska effekt.

För att öka dosen skall det aktuella depotplåstret bytas ut mot ett större depotplåster, eller också kan en kombination av plåster användas på olika ställen för att uppnå den önskade dosen. Det rekommenderas att inte mer än två plåster appliceras samtidigt, med en maximal buprenorfindos på 40 mikrogram/timme. Ett nytt plåster bör inte användas på samma hudparti under de följande 3-4 veckorna (se avsnitt Farmakokinetik). Patienten skall observeras noggrant och regelbundet för att bedöma den optimala dosen och behandlingstiden.

Bupremyl skall administreras var 7:e dag.

#### *Övergång från opioider*

Bupremyl kan användas som alternativ till behandling med andra opioider. Sådana patienter skall starta med den lägsta tillgängliga dosen. Då Bupremyl endast finns i styrkorna 10 mikrogram/timme depotplåster och 20 mikrogram/timme depotplåster är inte alla doseringar möjliga. Vid behov av annan styrka eller läkemedelsform bör andra bupremylprodukter användas och vid behov fortsätta ta kortverkande smärtstillande läkemedel (se avsnitt Interaktioner) under titringen.

#### *Behandlingstid*

Bupremyl bör under inga omständigheter administreras längre än vad som är absolut nödvändigt. Om långvarig smärtbehandling med Bupremyl är nödvändig mot bakgrund av sjukdomens art och svårighetsgrad bör noggrann och regelbunden övervakning ske (om det behövs med avbrott i behandlingen) för att fastställa om ytterligare behandling krävs och i så fall i vilken omfattning.

#### *Avslutning av behandlingen*

Den smärtstillande effekten varar en tid efter att plåstret har tagits bort, medan koncentrationen av buprenorfin i serum gradvis minskar. Detta bör man ta hänsyn till om man planerar att behandlingen med Bupremyl skall följas av behandling med någon annan opioid. Som en huvudregel bör inte efterföljande opioid ges inom 24 timmar efter att plåstret tagits bort. För närvarande finns det endast begränsad information tillgänglig om startdosen för andra opioider som administreras efter att behandlingen med plåstret har avslutats (se avsnitt Interaktioner).

## **Speciella patientgrupper**

### *Äldre*

Det är inte nödvändigt att justera dosen Bupremyl för äldre patienter.

### *Nedsatt njurfunktion*

Ingen särskild dosjustering av Bupremyl krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

### *Nedsatt leverfunktion*

Buprenorfin metaboliseras i levern. Effektens intensitet och duration kan påverkas hos patienter med nedsatt leverfunktion. Därför bör patienter med leverinsufficiens övervakas noggrant under behandling med Bupremyl.

Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion kan ackumulera buprenorfin under behandling med Bupremyl. Man bör då överväga alternativ behandling, och Bupremyl skall användas med försiktighet, om över huvud taget, på sådana patienter.

### *Patienter som behandlas med CYP3A4-hämmare*

Eftersom CYP3A4-hämmare kan öka koncentrationen av buprenorfin (se avsnitt Interaktioner), bör patienter som redan behandlas med CYP3A4-hämmare få sin dos av Bupremyl försiktigt titrerad eftersom en reducerad dos kan vara tillräcklig för dessa patienter.

### *Pediatrisk population*

Säkerheten och effekten av Bupremyl till barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

## **Administreringssätt**

Bupremyl är avsett för transdermal användning.

Depotplåster för att bäras i 7 dagar.

Plåstret får inte delas eller klippas i bitar.

Plåstret bör inte användas om förseglingen är bruten.

### *Applicering av plåstret:*

Bupremyl skall placeras på icke-irriterad, intakt hud på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen men inte på hud med stora ärr. Bupremyl skall placeras på en relativt hårfri eller nästan helt hårfri hudyta. Om en sådan plats inte finns bör huden på platsen klippas med sax, inte rakas.

Om applikationsplatsen måste rengöras skall detta endast göras med rent vatten. Tvål, alkohol, olja, lotioner och slipande produkter får ej användas. Huden måste vara torr innan plåstret appliceras. Bupremyl skall appliceras omedelbart efter uttagning från den förslutna påsen. När skyddslagret tagits bort skall plåstret tryckas bestämt på plats med handflatan i cirka 30 sekunder. Se till att kontakten är fullständig, särskilt runt kanterna. Om plåstrets kanter börjar släppa kan de tejpas fast med lämplig hudtejp, för att säkerställa en 7 dagars behandling. Plåstret skall sitta på kontinuerligt i 7 dagar.

Att bada, duscha eller simma skall inte påverka plåstret. Om plåstret lossnar skall ett nytt sättas på och bäras i 7 dagar.

## Varningar och försiktighet

Buprenorfin bör användas med särskild försiktighet hos patienter med akut alkoholförgiftning, skallskada, chock, nedsatt medvetandegrad av okänd orsak, intrakraniella lesioner eller ökat intrakraniellt tryck samt hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering).

Buprenorfin kan sänka kramptröskeln hos patienter med anamnes på krampfall.

*Risker med samtidig användning av sedativa läkemedel såsom benzodiazepiner eller liknande läkemedel*  
Samtidig användning av Bupremyl och sedativa läkemedel såsom benzodiazepiner eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning med sedativa läkemedel till patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva Bupremyl samtidigt med sedativa läkemedel ska lägsta effektiva dos användas och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

Signifikant andningsdepression har associerats med buprenorfin, särskilt vid intravenös administrering. Ett antal dödsfall på grund av överdos har inträffat när missbrukare använt buprenorfin intravenöst, oftast tillsammans med benzodiazepiner. Ytterligare dödsfall på grund av överdos har rapporterats då etanol och benzodiazepiner har använts i kombination med buprenorfin.

Patienterna ska följas noga med avseende på tecken och symtom på andningsdepression och sedering. I detta avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess omgivning om att vara uppmärksamma på dessa symtom (se avsnitt Interaktioner).

Buprenorfin rekommenderas ej för smärtlindring omedelbart postoperativt eller i andra situationer som kännetecknas av ett smalt terapeutiskt fönster eller snabbt varierande behov av smärtlindring.

Kontrollerade studier på människor och djur tyder på att buprenorfin är mindre beroendeframkallande än rena agonistanalgetika. Hos människor har endast begränsade euforiska effekter observerats med buprenorfin. Detta kan leda till ett visst missbruk av produkten och man bör därför vara försiktig vid ordination till patienter som är kända för att, eller misstänks, ha missbrukat läkemedel, alkohol eller har allvarlig psykisk sjukdom

Som med alla opioider kan kroniskt användning av buprenorfin leda till utveckling av fysiskt beroende. Om utsättningssymtom (abstinenssyndrom) inträffar är de i allmänhet lindriga, börjar efter två dagar och kan pågå i upp till två veckor. Abstinenssymtomen innefattar oro, ångest, nervositet, sömnlöshet, hyperkinesi, tremor och gastrointestinala störningar.

Bupremyl ska inte användas i högre doser än rekommenderat.

Idrottare bör vara medvetna om att detta läkemedel kan ge ett positiv utslag vid dopingkontroller.

*Patienter med feber eller som utsätts för extern värme*

Patienter som bär plåstret bör uppmanas att undvika att exponera applikationsområdet för externa värmekällor, exempelvis värmedynor, elektriska värmefiltar, värmelampor, bastu, heta bad, uppvärmda vattensängar och dylikt, eftersom detta kan leda till att absorptionen av buprenorfin ökar. Vid behandling av patienter med feber bör man vara medveten om att feber också kan öka absorptionen, vilket kan leda till ökade plasmakoncentrationer av buprenorfin och därmed ökad risk för biverkningar.

### *Serotonergt syndrom*

Samtidig administrering av Buprenyl och andra serotonerga läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller tricykliska antidepressiva läkemedel kan leda till serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd (se avsnitt Interaktioner).

Om samtidig behandling med andra serotonerga läkemedel är kliniskt motiverad, rekommenderas noggrann observation av patienten, särskilt vid behandlingsstart och vid dosökningar.

Symtom på serotonergt syndrom kan vara förändrad psykisk status, autonom instabilitet, neuromuskulära avvikelser och/eller gastrointestinala symtom.

Om serotonergt syndrom misstänks ska dosminskning eller utsättning av behandlingen övervägas, beroende på symtomens svårighetsgrad.

## **Interaktioner**

Buprenorfin får inte användas samtidigt med MAO-hämmare eller av patienter som fått MAO-hämmare under de senaste två veckorna (se avsnitt Kontraindikationer).

*Buprenyl ska användas med försiktighet när det ges tillsammans med:*

Serotonerga läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller tricykliska antidepressiva läkemedel, eftersom risken för serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, ökar (se avsnitt Varningar och försiktighet).

*Effekter av andra aktiva substanser på farmakokinetiken för buprenorfin*

Buprenorfin metaboliseras främst genom glukuronidering och i mindre utsträckning (omkring 30 %) via CYP3A4.

Samtidig behandling med CYP3A4-hämmare kan leda till förhöjda plasmakoncentrationer med en förstärkt buprenorfinverkan.

Studier med CYP3A4-hämmaren ketokonazol gav inga kliniskt relevanta öknings av högsta plasmakoncentration (C<sub>max</sub>) eller total (AUC) buprenorfinexponering.

Interaktionen mellan buprenorfin och CYP3A4-enzyminducerare har inte studerats. Samtidig administrering av buprenorfin och enzyminducerare (t.ex. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin och rifampicin) kan leda till ökat clearance, vilket skulle kunna leda till en minskad effekt.

Minskning av blodflödet i levern, vilket kan orsakas av vissa bedövningsmedel (t.ex. halotan) och andra läkemedel kan leda till minskad hepatisk utsöndring av buprenorfin.

*Farmakodynamiska interaktioner*

Buprenorfin skall användas med försiktighet tillsammans med:

Andra centralnervöst hämmande substanser: andra opioidderivat (analgetika och hostdämpande medel innehållande t.ex. morfin, dextropropoxifen, kodein, dextrometorfan eller noskapin). Vissa antidepressiva, sederande H<sub>1</sub>-receptorantagonister, alkohol, anxiolytika, neuroleptika, klonidin och relaterade substanser. Dessa kombinationer ökar den centralnervösa hämningen.

Sedativa läkemedel såsom benzodiazepiner eller liknande läkemedel:

Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom benzodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av additiva CNS-depressiva effekter. Begränsa dosering och duration av samtidig användning (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Vid typiska analgetiska doser fungerar buprenorfin som en ren my-receptoragonist. I kliniska studier av buprenorfin, där patienter som fick rena my-agonistopioider (upp till 90 mg morfin oralt eller morfinekvivalenter oralt per dag) överfördes till buprenorfin, förekom inga rapporter om abstinenssyndrom eller opioidabstinens under övergången från den ursprungliga opioiden till buprenorfin (se avsnitt Varningar och försiktighet).

## Graviditet

Uppgifter saknas från behandling av gravida kvinnor med buprenorfin. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Den potentiella risken för människor är okänd.

Mot slutet av graviditeten kan höga doser av buprenorfin, även efter en kort behandlingsperiod, orsaka andningsdepression hos nyfödda. Långvarig användning av buprenorfin under graviditeten kan orsaka neonatalt abstinenssyndrom.

Därför bör buprenorfin inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som ej använder adekvat preventivmedel.

## Amning

Buprenorfin utsöndras i bröstmjölk. Studier av råttor har visat att buprenorfin kan hämma mjölkutsöndringen. Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat utsöndring av buprenorfin i bröstmjölk (se avsnitt prekliniska uppgifter). Därför bör användning av buprenorfin under amning undvikas.

## Fertilitet

Inga humandata om effekten av buprenorfin på fertilitet finns tillgängliga. I en fertilitet och tidig embryonal utvecklingsstudie sågs inga effekter på reproduktionsparametrar observerades hos han- eller honrattor (se avsnitt prekliniska uppgifter).

## Trafik

Buprenorfin har en stor inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Även då det används enligt anvisningarna kan buprenorfin påverka patientens reaktioner i en sådan utsträckning att trafiksäkerheten och förmågan att handha maskiner kan försämrats. Detta gäller särskilt i början av behandlingen och i samband med andra centralt verkande medel, såsom alkohol, lugnande medel, sedativa och hypnotika. Läkaren bör ge en individuell rekommendation. En allmän restriktion är inte nödvändig i de fall då en stabil dos används.

Patienter som påverkas, och upplever biverkningar (t.ex. yrsel, dåsigheit, dimsyn) under behandlingens insättande eller titrering till en högre dos, bör inte framföra fordon eller använda maskiner. Detta gäller också i åtminstone 24 timmar efter plåstret har tagits bort.

## Biverkningar

Allvarliga negativa effekter som kan associeras med behandling med buprenorfin i klinisk användning påminner om de reaktioner som observerats för andra opioidanalgetika, bland annat nedsatt respiration (särskilt vid samtidigt användning av andra CNS-hämmande medel) och hypotoni (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Följande biverkningar har uppträtt:

| System organ class<br>MedDRA       | Mycket vanliga<br>( $\geq 1/10$ ) | Vanliga<br>( $\geq 1/100$ ,<br><1/10)                          | Mindre vanliga<br>( $\geq 1/1000$ ,<br><1/100)                                                                                                                                                                                                        | Sällsynta<br>( $\geq 1/10,000$ ,<br><1/1000) | Mycket sällsynta<br>( $< 1/10,000$ ) | Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Immun systemet                     |                                   |                                                                | Över känslighet                                                                                                                                                                                                                                       | Anafylaktiska reaktioner                     |                                      | Anafylaktoida reaktioner                                       |
| Metabolism och nutrition           |                                   | Anorexi                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | Dehydrering                                  |                                      |                                                                |
| Psykiska störningar                |                                   | Förvirring<br>Depression<br>Sömnlöshet<br>Nervositet<br>Ångest | Sömn-<br>störningar<br>Rastlöshet<br>Agitation<br>Euforiskt stämningsläge<br>Affektlabilitet<br>Hallucinationer<br>Mardrömmar<br>Minskad libido<br>Aggression<br>stämningsläge<br>,<br>affektlabilitet,<br>ångest,<br>hallucinationer<br>, mardrömmar | Psykotisk störning                           | Beroende<br>Humörsvägningar          | Depersonalisering                                              |
| Centrala och perifera nervsystemet | Huvudvärk<br>Yrsel<br>Sömnighet   | Tremor                                                         | Sedering<br>Smak-förvrängning<br>Dysartri<br>Hypoestesi<br>Minnes-nedsättning<br>Migrän<br>Synkope<br>Onormal koordination<br>Nedsatt koncentrationsförmåga<br>Parestesi                                                                              | Balans-rubbningar<br>Talstörningar           | Ofrivilliga muskel sammandragningar  | Kramper                                                        |

| System organ<br>class<br>MedDRA               | Mycket<br>vanliga<br>( $\geq 1/10$ )     | Vanliga<br>( $\geq 1/100$ ,<br><1/10)         | Mindre vanliga<br>( $\geq 1/1000$ ,<br><1/100)             | Sällsynta<br>( $\geq 1/10,000$ ,<br><1/1000)                                          | Mycket<br>sällsynta<br>( $< 1/10,000$ ) | Ingen känd<br>frekvens (kan<br>inte beräknas<br>från<br>tillgängliga<br>data) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ögon                                          |                                          |                                               | Ögontorrhet<br>Dimsyn                                      | Synrubbning<br>Ögonlocks-ödem<br>Mios                                                 |                                         |                                                                               |
| Öron och<br>balansorgan                       |                                          |                                               | Tinnitus<br>Vertigo                                        |                                                                                       | Öronsmärta                              |                                                                               |
| Hjärtat                                       |                                          |                                               | Palpitationer<br>Takykardi                                 | Angina<br>pectoris                                                                    |                                         |                                                                               |
| Blodkärl                                      |                                          |                                               | Hypotoni<br>Cirkulationskolaps<br>Hypertoni<br>Rodning     | Vasodilatation<br>Ortostatisk hypotoni                                                |                                         |                                                                               |
| Andningsvägar<br>bröstkorg och<br>mediastinum |                                          | Andnöd                                        | Hosta<br>Pipande<br>andning<br>Hicka                       | Andnings-depression<br>Andningssvikt<br>Förvärrad astma<br>Hyper-ventilering<br>Rinit |                                         |                                                                               |
| Magtarm-kana<br>len                           | Förstoppling<br>Illamående<br>Kräkningar | Buksmärta<br>Diarré<br>Dyspepsi<br>Muntorrhet | Flatulens                                                  | Dysfagi<br>Ileus                                                                      |                                         | Divertikulit                                                                  |
| Lever och<br>gallvägar                        |                                          |                                               |                                                            |                                                                                       |                                         | Gallkolik                                                                     |
| Hud och subku<br>tan vävnad                   | Klåda<br>Erytem                          | Utslag<br>Svettningar<br>Exantem              | Torr hud<br>Urtikaria<br>Kontaktdermatit                   | Ansiktsödem                                                                           | Pustler<br>Blåsor                       |                                                                               |
| Muskulo-skelet<br>ala systemet<br>och bindväv |                                          | Muskel<br>svaghet                             | Myalgi<br>Muskel<br>spasmer                                |                                                                                       |                                         |                                                                               |
| Njurar och<br>urinvägar                       |                                          |                                               | Urininkontinens<br>Urinretention<br>Fördröjd<br>urinerings |                                                                                       |                                         |                                                                               |
| Reproduktions<br>organ och<br>bröstkörtel     |                                          |                                               |                                                            | Erektildysfunktion                                                                    |                                         |                                                                               |

|                                                                             |                                                  |                                       |                                                                                                                        |                                              |                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| System organ<br>class<br>MedDRA                                             | Mycket<br>vanliga<br>( $\geq 1/10$ )             | Vanliga<br>( $\geq 1/100$ ,<br><1/10) | Mindre vanliga<br>( $\geq 1/1000$ ,<br><1/100)                                                                         | Sällsynta<br>( $\geq 1/10,000$ ,<br><1/1000) | Mycket<br>sällsynta<br>( $< 1/10,000$ ) | Ingen känd<br>frekvens (kan<br>inte beräknas<br>från<br>tillgängliga<br>data) |
|                                                                             |                                                  |                                       |                                                                                                                        | Sexuell dysfunktion                          |                                         |                                                                               |
| Allmänna<br>symtom<br>och/eller<br>symtom vid<br>administrering<br>sstället | Klåda på<br>applikationspl<br>atsen <sup>1</sup> | Trötthet<br>Asteni<br>Perifierat ödem | Utröttning<br>Pyrexia<br>Stelhet<br>Ödem<br>Abstinens-symptom<br>Utslag på<br>applikations-pl<br>atsen*<br>Bröstsmärta | Influensa-liknande sjukdom                   |                                         | Neonatal abstinenssyndrom                                                     |
| Undersökningar                                                              |                                                  |                                       | Ökning av<br>alaninamino-transferas<br>Viktminskning                                                                   |                                              |                                         |                                                                               |
| Skador och<br>förgiftningar<br>och<br>behandlingskomplikationer             |                                                  |                                       | Olycksfall<br>(falls skador)                                                                                           |                                              |                                         |                                                                               |

\* I vissa fall kan fördröjda lokala allergiska reaktioner uppträda med tydliga tecken på inflammation. I sådana fall skall behandlingen med buprenorfin avslutas.

<sup>1</sup> Inkluderar erytem, ödem, pruritus och utslag vid applikationsstället.

Buprenorfin uppvisar en låg risk för fysiskt beroende. Efter avslutad behandling med buprenorfin är det mindre sannolikt att abstinenssymtom uppträder. Detta kan bero på den mycket långsamma dissociationen av buprenorfin från opioidreceptorerna och den gradvisa minskningen av plasmakoncentrationerna av buprenorfin (normalt över en period på 30 timmar efter att det sista plåstret har tagits bort). Efter långvarig användning av buprenorfin kan abstinenssymtom som liknar dem som uppträder vid opioidabstinens dock inte uteslutas helt. Abstinenssymtomen innefattar oro, ångest, nervositet, sömnlöshet, hyperkinesi, tremor och gastrointestinala störningar.

#### *Rapportering av misstänkta biverkningar*

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Postadress

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala

# Överdoser

## Symtom

Symtom liknande dem för andra centralt verkande analgetika kan förväntas. Dessa omfattar andningsdepression, seder, dåsig, illamående, kräkningar, kardiovaskulär kollaps och uttalad mios.

## Behandling

Ta bort eventuella plaster från patientens hud. Upprätta och upprätthåll öppna luftvägar, understöd eller kontrollera respirationen vid behov och upprätthåll adekvat kroppstemperatur och vätskebalans. Syre, intravenösa vätskor, vasopressorer och andra stödjande åtgärder bör användas vid behov.

En specifik opioidantagonist, såsom naloxon, kan upphäva effekterna av buprenorfin. Dock kan naloxon vara mindre effektivt för att motverka effekten av buprenorfin än andra  $\mu$ -opioid agonister. Börja med de vanliga doserna vid behandling med kontinuerlig intravenös naloxon men höga doser kan vara nödvändigt.

# Farmakodynamik

Buprenorfin är en partiell opioidagonist som verkar på  $\mu$ -opioidreceptorn. Den har också antagonistisk aktivitet på kappa-opioidreceptorn.

Effekten har visats i sju pivotala fas-3 studier som pågick i upp till 12 veckor med patienter med icke-malign smärta av olika etiologi. Patienter med måttlig och svår artros och ryggsmärtor ingick i studierna.

Buprenorfin visade en kliniskt signifikant minskning av smärtan (cirka 3 poäng på BS-11-skalan) och signifikant bättre smärtekontroll jämfört med placebo.

En långtids öppen uppföljningsstudie (n=384) har också genomförts med patienter med icke-malign smärta. Med kontinuerlig dosering kunde smärtan kontrolleras i 6 månader hos 63 % av patienterna, i 12 månader hos 39 % av patienterna, i 18 månader hos 13 % av patienterna och i 21 månader hos 6 %. Cirka 17 % stabiliserades med en dos på 5 mg, 35 % med en dos på 10 mg och 48 % med en dos på 20 mg.

# Farmakokinetik

Det föreligger bevis för enterohepatisk recirkulation.

Studier på icke-dräktiga och dräktiga råttor har visat att buprenorfin passerar över blod-hjärnbarriären och placentabarriären. Koncentrationerna i hjärnan (som endast innehöll oförändrat buprenorfin) efter parenteral administrering var 2-3 gånger högre än efter oral administrering. Efter intramuskulär eller oral administrering ackumuleras till synes buprenorfin i magtarmkanalens lumen hos fostret - förmodligen på grund av gallvägsutsöndring, eftersom den enterohepatiska cirkulationen inte är fullt utvecklad.

Varje hudplaster ger en stabil tillförsel av buprenorfin i upp till sju dagar. Steady state uppnås under den första applikationen. Efter borttagande av buprenorfin minskar buprenorfinkoncentrationen med cirka 50 % på 12 timmar (mellan 10 och 24 timmar).

## Absorption

Efter applikation av buprenorfin diffunderar buprenorfin från depotplästret genom huden. I kliniska farmakologiska studier uppgick mediantiden för att buprenorfin 10 mikrogram/timme skulle tillföra detekterbara buprenorfinkoncentrationer (25 pikogram/ml) till cirka 17 timmar. Analys av residualbuprenorfin i plästren efter 7 dagars användning visar att 15 % av det ursprungliga innehållet har

tillförts. En studie av biotillgängligheten, jämfört med intravenös administrering, bekräftar att denna mängd har absorberats systemiskt. Buprenorfin-koncentrationerna förblir relativt konstanta under den 7 dagar långa användning av plåstren.

#### *Applikationsplats*

En studie av friska försökspersoner visade att den farmakokinetiska profilen för buprenorfin som tillfördes via buprenorfin plåster är likartad vid applicering på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen (mellersta axillarlinjen, 5:e interkostala mellanrummet). Absorptionen varierar till viss del beroende på applikationsområdet och exponeringen är som mest omkring 26 % högre då plåstret appliceras på den övre delen av ryggen jämfört med på sidan av bröstkorgen.

I en studie av friska försökspersoner som fick buprenorfin upprepade gånger på samma plats observerades en nästan fördubblad exponering med en 14 dagar lång viloperiod. Av detta skäl rekommenderas en rotation av applikationsplatserna, och att ett nytt plåster inte placeras på samma ställe på huden på 3-4 veckor.

I en studie av friska försökspersoner orsakade applicering av värmedyna direkt på buprenorfin depotplåster en övergående ökning av blodkoncentrationen av buprenorfin på 26-55 %. Koncentrationerna återgick till det normala inom 5 timmar efter det att värmekällan hade avlägsnats. Av detta skäl rekommenderas ej att direkta värmekällor, såsom varmvattenflaskor, värmedynor eller elektriska filtar, appliceras direkt på plåstret. En värmedyna som placerades på buprenorfin-platsen omedelbart efter borttagning av plåstret ändrade inte absorptionen från depån i huden.

#### *Distribution*

Buprenorfin är till omkring 96 % bundet till plasmaproteiner.

Studier av intravenöst buprenorfin har uppvisat en stor distributionsvolym, vilket tyder på omfattande distribution av buprenorfin. I en studie av intravenöst buprenorfin hos friska försökspersoner var distributionsvolymen vid steady state 430 l, vilket återspeglar den stora distributionsvolymen och lipofiliteten för den aktiva substansen.

Efter intravenös administrering utsöndras buprenorfin och dess metaboliter i gallan, och distribueras inom flera minuter till cerebrospinalvätskan. Buprenorfin-koncentrationerna i cerebrospinalvätskan tycks vara cirka 15-25 % av de samtidiga plasmakoncentrationerna.

#### *Metabolism och eliminering*

Buprenorfinmetabolismen i huden efter applikation av buprenorfin är försumbar. Efter transdermal applicering elimineras buprenorfin via hepatisk metabolism med efterföljande biliär och renal eliminering av lösliga metaboliter. Den hepatiska metabolismen, via CYP3A4 och UGT1A1/1A3 enzymerna, leder till två huvudmetaboliter, norbuprenorfin respektive buprenorfin 3-O-glukuronid. Norbuprenorfin glukuronideras före eliminering. Buprenorfin elimineras även via faeces. I en studie på postoperativa patienter visade sig den totala elimineringen av buprenorfin vara cirka 55 l/h.

Norbuprenorfin är den enda kända aktiva metaboliten av buprenorfin.

#### *Effekter av buprenorfin på farmakokinetiken för andra aktiva substanser*

Baserat på *in vitro*-studier i humana mikrosomer och hepatocyter, har buprenorfin inte någon potential för att hämma metabolism som katalyseras av CYP450-enzymerna CYP1A2, CYP2A6 och CYP3A4 vid de koncentrationer som uppnås vid användning av buprenorfin 20 mikrogram/timme depotplåster. Effekten på metabolism som katalyseras av CYP2C8, CYP2C9 och CYP2C19 har inte studerats.

## Prekliniska uppgifter

### *Systemisk toxicitet och hudtoxicitet*

I toxicitetsstudier med en dos och upprepad dosering på råtta, kanin, marsvin, hund och minigris, orsakade buprenorfin minimala eller inga oönskade systemiska händelser, medan hudirritation observerades hos alla undersökta arter. Tillgängliga toxikologiska uppgifter tyder inte på någon sensibiliserande potential för tillsatserna i depotplåstren.

### *Reproduktions och utvecklingstoxicitet*

Ingen effekt på fertilitet eller generell reproduktionsförmåga kunde observeras hos råttor behandlade med buprenorfin. I toxikologiska studier på fosterutveckling hos råttor och kaniner som använde buprenorfin kunde man inte observera någon fostertoxicitet. I en toxikologisk studie på råtta med buprenorfin före och efter födsel hade ungarna en dödlighet, minskad kroppsvikt och samtidigt hade mamman en mindre matkonsumtion och kliniska tecken.

### *Genotoxicitet*

En standarduppsättning genotoxicitetstester indikerade att buprenorfin inte är genotoxiskt.

### *Karcinogenicitet*

Långtidsstudier på råttor och möss visade ingen karcinogen potential som är relevant för människor.

## Innehåll

### **Kvalitativ och kvantitativ sammansättning**

Bupremyl 10 mikrogram/timme:

Varje depotplåster innehåller 10 mg buprenorfin.

12,5 cm<sup>2</sup> frisätter nominellt 10 mikrogram buprenorfin per timme under 7 dagar.

Bupremyl 20 mikrogram/timme:

Varje depotplåster innehåller 20 mg buprenorfin.

25 cm<sup>2</sup> frisätter nominellt 20 mikrogram buprenorfin per timme under 7 dagar.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.

### **Förteckning över hjälpämnen**

#### *Häftskikt (innehållande buprenorfin)*

Povidon K90

Levulinsyra

Oleyloleat

Akrylsyra-butylakrylat-2-(etylhexyl) akrylat-vinylacetat sampolymer (5:15:75:5)

#### *Häftskikt (utan buprenorfin)*

2-(etylhexyl) akrylat- glycidylmetakrylat-(2-hydroxietyl) akrylat-vinylacetat sampolymer (68:0,15:5,27)

#### *Separerande film mellan häftskikten med och utan buprenorfin*

poly(etentereftalat) film.

#### *Baksidesskikt*

Polyester

*Skyddsskikt*

Poly(etentereftalat) silikoniserad.

Blå tryckfärg

## **Blandbarhet**

Ej relevant.

## **Hållbarhet, förvaring och hantering**

### **Hållbarhet**

10 mikrogram/timme

21 månader

20 mikrogram/timme

3 år

### **Särskilda förvaringsanvisningar**

10 mikrogram/timme

Förvaras vid högst 25°C.

20 mikrogram/timme

Inga särskilda förvaringsanvisningar

### **Särskilda anvisningar för destruktion**

Vid byte av plåstret skall det använda plåstret avlägsnas, vikas ihop med häftskiktet inåt och slängas på ett säkert sätt.

## **Förpackningsinformation**

*Depotplåster 5 mikrog/timme* Rektangulära, beigefärgade plåster med rundade hörn, märkta med "Buprenorfin" och 5 µg/h i blå färg.

*Depotplåster 10 mikrog/timme* Rektangulära, beigefärgade plåster med rundade hörn, märkta med "Buprenorfin" och 10 µg/h i blå färg.

*Depotplåster 20 mikrog/timme* Rektangulära, beigefärgade plåster med rundade hörn, märkta med "Buprenorfin" och 20 µg/h i blå färg.