

## Nobilis® Gumboro Inac. vet.

R<sub>x</sub>

MSD Animal Health Sweden

Injektionsvätska, emulsion

Vaccin mot Gumborosjuka

**Djurslag:**

Kyckling

**Aktiv substans:**

Infektiöst fågelbursitvirus, stam D78, inaktiverat

**ATC-kod:**

QI01AA01

**FASS VET-text:** *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011-12-13.*

## Innehåll

1 dos (0,5 ml) innehåller: Inaktiverat Gumborosjukevirus, stam D78, minst 14 log<sub>2</sub> VN enheter, lättflytande paraffin, polysorbat 80, sorbitanmonooleat, glycin, vatten för injektionsvätskor.

## Egenskaper

Antigenerna är inkorporerade i en vatten/olje-emulsion för att förlänga immuniteten.

## **Indikationer**

Immunisering av kycklingar mot Gumborosjuka via vaccination av moderdjur.

## **Kontraindikationer**

Inga.

## **Biverkningar**

En lätt svullnad på injektionsstället kan förekomma ett par veckor efter vaccination.

## **Dosering**

Vaccinet bör tillåtas anta rumstemperatur (15 °C–25 °C) före injektion. 0,5 ml intramuskulärt. Vaccination bör ske vid ca 16–20 veckors ålder, men inte senare än 4 veckor före förväntad äggläggning.

## **Karenstider**

*Slakt:* Noll dagar.

## **Interaktioner**

Inga interaktioner har observerats när vaccinet har använts tillsammans med Nobilis IB Multi vet.

## **Överdoser**

Inga speciella symptom vid dubbel dos.

## **Observera**

*Till användaren:* Denna produkt innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart. Vid oavsiktlig injektion med denna produkt, uppsök snabbt läkare - även om endast en väldigt liten mängd injicerats - och ta med denna information. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

*Till läkaren:* Denna produkt innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med denna produkt orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och det kan bli nödvändigt med incision och irrigation av det injicerade området, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller sensor i ett finger.

Skall ej blandas med andra injektionsvätskor.

## **Hållbarhet**

När flaskan är öppnad skall vaccinet användas inom 2 timmar.

## **Förvaring**

Förvaras vid 2 °C-8 °C (i kylskåp).

## **Förpackningsinformation**

*Injektionsvätska, emulsion*

500 milliliter injektionsflaska, receptbelagd