

Nobivac[®] Rabies vet.

R_x

MSD Animal Health Sweden

Injektionsvätska, suspension 2 IE

Vaccin mot rabies

Djurslag:

Får

Get

Hund

Häst

Iller

Katt

Nötkreatur

Räv

Aktiv substans:

Rabiesvirus, stam Pasteur RIV, inaktiverat

ATC-kod:

QI07AA02

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2021-06-30.

Innehåll

Aktiv substans:

Varje dos (1 ml) av Nobivac Rabies vet. innehåller: Inaktiverat rabiesvirus stam Pasteur RIV $\geq 0,95$ AIU* motsvarande ≥ 2 IE**

*batchkontroll utförs med in vitro potenstest enligt Ph. Eur. monografi 451.

AIU = antigenmängd av rabies, AlphaLISA internationella enheter (IE).

**motsvarande potens i försöksinfektionstest in vivo på mus enligt Ph. Eur. monografi 451.

Adjuvans: Aluminiumfosfat

Hjälpämnen: Tiomersal, dinatriumvätefosfat, natriumdivätefosfat och vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Det avdödade rabiesviruset (stam Pasteur RIV) har odlats på BHK cellkultur, inaktiverats med betapropiolakton och adsorberats på aluminiumfosfat. Maximalt antikroppssvar uppnås 3-4 veckor efter vaccination. Efter ett mindre titerfall är antikropps-nivån skyddande intill revaccination. Cirkulerande maternal immunitet kan påverka antikropps-bildningen vid tidig vaccination. (Se rekommenderat vaccinationsschema.)

Indikationer

Aktiv immunisering av friska däggdjur mot rabies.

Kontraindikationer

Inga.

Dräktighet och laktation

Kan användas till dräktiga och lakterande tikar. Säkerhet under dräktighet och laktation har inte fastställts för övriga djurslag.

Biverkningar

Lokala reaktioner på injektionsstället. Efter subkutan administrering kan en övergående, palpabel knuta förekomma på injektionsstället. I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.

Dosering

1 dos = 1 ml injiceras intramuskulärt eller subkutant

	Hund/katt	Nöt/häst	Iller	Får/get/räv
Första vaccination vid	12 veckor *	6 månader*	12 veckor*	3 månader*
Revaccination vart	tredje år**	annat år**	årligen**	årligen***
Administreringssätt	SC eller IM	IM	SC	SC

* Första vaccinationen kan utföras vid en tidigare ålder, men revaccination måste då ges vid 12 veckors eller 6 månaders ålder beroende på djurslag.

** Rekommenderad revaccinationsintervall är baserat på resultat från fältförsök. Nationella regler kan kräva tidigare revaccination.

*** Resultat från serologiska undersökningar indikerar att vaccination av får, getter och rävar ger skydd i minst ett år.

Omskakas.

Låt vaccinet uppnå rumstemperatur före användning.

Karenstider

Noll dagar.

Interaktioner

Nobivac Rabies vet. är blandbart med och kan användas som spädningsvätska till Nobivac Tricat vet., Nobivac Pi vet., Nobivac Parvo live vet., Nobivac DHP live vet., Nobivac Ducat vet. samt Nobivac DHPPi vet. Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom produkterna som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdoser

Inga särskilda symtom efter dubbel dos.

Observera

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Skall inte blandas med andra injektionsvätskor än de som omnämns under Interaktioner.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 2 IE

10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd