

Bipacksedel: Information till användaren

Verruxin

200 mg/200 mg kutan lösning
mjölksyra/salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du bör tala med läkare om inte vårtan försvunnit efter 3 månader.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Verruxin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Verruxin
3. Hur du använder Verruxin 200 mg/200 mg
4. Eventuella biverkningar

5. Hur Verruxin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Verruxin är och vad det används för

Verruxin 200 mg/200 mg är en lösning för behandling av envisa och återkommande vårtor på händer och fötter samt av envisa och återkommande liktornar och förhårdnader.

Verruxin innehåller salicylsyra och mjölksyra. Salicylsyra verkar uppmjukande och löser upp förhårdnad vävnad i vårtor, liktornar och andra hudförhårdnader. Mjölksyran har en viss huduppluckrande effekt samt vattenbindande egenskaper, vilket gör det lättare för salicylsyran att lösa upp förhårdnad vävnad. Verruxin innehåller även kollodion som ger en skyddande hinna runt vårtan, liktornen eller förhårdnaden.

2. Vad du behöver veta innan du använder Verruxin

Använd inte Verruxin

- om du är allergisk mot mjölksyra eller salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Diabetiker och personer med dålig blodcirkulation eller känslig hud ska inte själva behandla vårtor. Verruxin ska inte användas på infekterad eller kraftigt röd och svullen hud eller om det svider då man penslar på Verruxin.

Barn

Rekommenderas inte till barn under 6 år. Verruxin har en retande effekt på tunn hud hos mindre barn.

Andra läkemedel och Verruxin

Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

Graviditet och amning

Vid användning av Verruxin kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra tas upp genom huden. Vid graviditet ska Verruxin endast användas på små hudområden.

Vid användning av Verruxin kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra går över i modersmjölken, men risk för påverkan på barnet som ammas är osannolik. Verruxin kan därför användas också under amning. Undvik att barnet kommer i kontakt med behandlat hudområde.

Körförmåga och användning av maskiner

Verruxin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3. Hur du använder Verruxin 200 mg/200 mg

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är

Vuxna och barn över 6 år:

Vårtor:

Behandla vårtan en gång om dagen enligt följande:

1. Luckra upp vårtan i varmt vatten ca 5 min.

2. Skrapa försiktigt bort lös och uppluckrad hud på vårtan med t ex fotfil som enbart används vid vårtbehandling.
3. Pensla vårtan med Verruxin. Undvik att pensla hudområdet utanför vårtan.

Det tar tid att behandla vårtor. Behandlingen ska pågå till dess vårtan försvunnit helt. Har inte vårtan försvunnit efter 3 månaders behandling, ska behandlingen avbrytas och läkare konsulteras.

Liktornar och förhårdnader:

Behandla liktornen eller förhårdnaden en gång om dagen enligt följande:

1. Luckra upp liktornen eller förhårdnaden i varmt vatten ca 5 min.
2. Skrapa försiktigt bort lös och uppluckrad hud på liktornen eller förhårdnaden med t ex fotfil som enbart används vid denna behandling.
3. Pensla liktornen eller förhårdnaden med Verruxin. Undvik att pensla utanför liktornen eller förhårdnaden.

Behandlingen ska pågå till dess liktornen eller förhårdnaden försvunnit helt. Har inte liktornen eller förhårdnaden försvunnit efter 2 veckors behandling, ska behandlingen avbrytas och fotspecialist konsulteras.

Vårtor smittar. Därför ska händerna tvättas efter beröring eller behandling av vårtor. Använd helst engångshandduk då vårtan och omgivande hud torkas. Gå inte barfota då fotvårtor konstaterats.

Verruxin får inte komma i kontakt med ögon eller slemhinnor. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten (i 15 min) och kontakta läkare.

Om du använt för stor mängd av Verruxin

Om du penslat på för stor dos av läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sveda kan uppträda när lösningen penslas på vårtan, liktornen eller förhårnaden. Blir svedan besvärande, gör uppehåll i behandlingen en eller ett par dagar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Verruxin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Skruva noga åt flaskans lock efter användning. Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 °C.

Verruxin är brandfarligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter "Utg.dat.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är mjölksyra 200 mg och salicylsyra 200 mg per 1 g lösning.
- Övriga innehållsämnen är kollodion (lösning av pyroxylin, etanol och eter) och eter.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Verruxin är en ofärgad till lätt gulaktig lösning med lukt av eter.
Förpackning: 10 ml glasflaska med plastspatel i locket.

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AS
Postboks 6733 Etterstad

0609 Oslo

Norge

Tel: +47 22 99 86 00

Tillverkare

Pharma Production AS

Karihaugveien 22

NO-1086 Oslo

Norge

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-02-28.