

Beviplex[®] vet.

R_x

Pharmaxim

Injektionsvätska, lösning

(Klar gul lösning)

B-vitaminpreparat

Djurslag:

Får

Hund

Häst

Mink

Nötkreatur

Svin

Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Cyanokobalamin

Dexpantenol

Nikotinamid

Pyridoxin

Riboflavin

Tiamin

ATC-kod:

QA11EA

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 22023-05-15

Innehåll

1 ml innehåller: Tiaminhydroklorid (vitamin B₁) 4 mg, riboflavinnatriumfosfat (vitamin B₂) 3 mg, pyridoxinhydroklorid (vitamin B₆) 2 mg, nikotinamid 25 mg, dexpantenol 5 mg, cyanokobalamin (vitamin B₁₂) 5 µg, utspädd saltsyra, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216) och vatten för injektionsvätskor.

Indikationer

Svin, nöt, häst, får, hund och mink: Tillstånd som ökar behovet av B-vitaminer så som störningar i vommen och tarmsystemets funktioner (t.ex. vid infektioner, hämmat näringsupptag), minskad aptit (t.ex. vid acetonemi, kalvningsförlamning), långvarig sjukdom (t.ex. infektionssjukdomar) samt som understödjande behandling vid dermatiter och pareser.

Kalv och får: Nekros i hjärnbarken (CCN, cerebrokortikal nekros) till följd av tiaminbrist.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv(a) substans(er), eller mot något (några) hjälpämne(n).

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Inga särskilda åtgärder. Djuret kan reagera tvärt vid intramuskulär eller subkutan injektion eftersom injektionen kan orsaka sveda.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Tvätta händerna efter administrering.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Intramuskulär, intravenös eller subkutan injektion. Angivna dygnsdoser får betraktas som en vägledning och kan upprepas allt efter fallets art.

Doseringsexempel:

Häst	20 - 40 ml
Föl	10 - 20 ml
Nötkreatur	20 - 40 ml
Kalv	10 - 20 ml
Suggor och galtar	10 - 20 ml
Växande svin	2 - 5 ml
Får	10 - 20 ml
Hund	1 - 5 ml
Mink	0,5 - 1 ml

Vid cerebrokortikal nekros (CCN): Kalv och får 100 ml, varav hälften ges intravenöst och hälften subkutant eller intramuskulärt. Behandlingen upprepas dagligen tills symptomen försvinner.

Karenstider

Noll dygn.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 4 veckor.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning Klar gul lösning
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd