

Nobilis[®] Gumboro Inac. vet.

R_x

MSD Animal Health Sweden

Injektionsvätska, emulsion

Vaccin mot Gumborosjuka

Djurslag:

Kyckling

Aktiv substans:

Infektiöst fågelbursitvirus, stam D78, inaktiverat

ATC-kod:

QI01AA01

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011-12-13.

Innehåll

1 dos (0,5 ml) innehåller: Inaktiverat Gumborosjukevirus, stam D78, minst 14 log₂ VN enheter, lättflytande paraffin, polysorbat 80, sorbitanmonooleat, glycin, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Antigenerna är inkorporerade i en vatten/olje-emulsion för att förlänga immuniteten.

Indikationer

Immunisering av kycklingar mot Gumborosjuka via vaccination av moderdjur.

Kontraindikationer

Inga.

Biverkningar

En lätt svullnad på injektionsstället kan förekomma ett par veckor efter vaccination.

Dosering

Vaccinet bör tillåtas anta rumstemperatur (15 °C–25 °C) före injektion. 0,5 ml intramuskulärt. Vaccination bör ske vid ca 16–20 veckors ålder, men inte senare än 4 veckor före förväntad äggläggning.

Karenstider

Slakt: Noll dagar.

Interaktioner

Inga interaktioner har observerats när vaccinet har använts tillsammans med Nobilis IB Multi vet.

Överdoser

Inga speciella symptom vid dubbel dos.

Observera

Till användaren: Denna produkt innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart. Vid oavsiktlig injektion med denna produkt, uppsök snabbt läkare - även om endast en väldigt liten mängd injicerats - och ta med denna information. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

Till läkaren: Denna produkt innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med denna produkt orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och det kan bli nödvändigt med incision och irrigation av det injicerade området, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller sensorer i ett finger. Skall ej blandas med andra injektionsvätskor.

Hållbarhet

När flaskan är öppnad skall vaccinet användas inom 2 timmar.

Förvaring

Förvaras vid 2 °C–8 °C (i kylskåp).

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion

500 milliliter injektionsflaska, receptbelagd