

Embotape Vet

R_x

Bimeda Animal Health

Oral pasta 400 mg/g

(En homogen, ljus guldfärgad emulsion)

Embotape Vet är ett bredspektrumanthelmintikum med en depolariserande neuromuskulärt blockerande effekt.

Djurslag:

Häst

Aktiv substans:

Pyrantel

ATC-kod:

QP52AF02

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2022-02-01.

Innehåll

1 g oral pasta innehåller:

Aktiv beståndsdel

Pyrantelpamoat 400 mg

Inaktiva beståndsdelar

Butylhydroxytoluen 0,2 mg

Polysorbat 80 76,5 mg

Aerosil 30,6 mg

Majsolja ad 1 g

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Embotape Vet är ett bredspektrumanthelmintikum med en depolariserande neuromuskulärt blockerande effekt. Detta resulterar i spastisk paralys hos parasiten som utstöts från magtarmkanalen.

En kolinesterasinhärande effekt bidrar även till de neuromuskulära effekterna.

Hos bandmask hämmar pyrantel oxidationen av biologiskt aktiva aminer. Embotape är aktivt (>90%) mot matura och immatura strongylider: *Strongylis vulgaris*, *S. edentatus*, *S. equinus*, *Trichonema spp.* (Cyathostomumarter), *Tridontophorus spp.*

Springmaskar: *Oxyuris equi*, *Probstmayria vivipara*. Spolmaskar: *Parascaris equorum*. Bandmask: *Anoplocephala perfoliata* (matura stadier).

Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantel i form av pyrantelpamoat absorberas endast i ringa grad, 50-70 % av dosen utsöndras oförändrad i faeces. Den absorberade andelen utsöndras i urinen som inaktiva metaboliter.

Indikationer

Infektioner av *Strongylidae*, *Trichonematidae* (Cyathostomumarter), *Parascaris*, *Oxyuris* och *Anoplocephala* hos häst.

Kontraindikationer

Kontraindicerat vid känd överkänslighet för pyrantel och till starkt försvagade djur.

Försiktighet

-

Dräktighet och laktation

På grund av den ringa absorptionsgraden kan Embotape Vet utan risk ges till dräktiga och digivande ston

Biverkningar

-

Dosering

Dos och administreringsätt

Sprutan är graderad i 6 delstreck, vardera motsvarande 1900 mg pyrantelpamoat. Vid administrering införes sprutpipen i hästens mungipa och önskad mängd pasta trycks ut på tungans bakre del.

Rundmaskar:

Normaldosen är 19 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt, dvs ett delstreck på sprutan motsvarar dosen för 100 kg kroppsvikt.

Bandmask:

Normaldos 38 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Behandling utföres vid konstaterad infektion eller som kontroll då bandmask förekommer i besättningen.

Blandbarhet

-

Karenstider

Slakt: 0 dygn.

Interaktioner

Interaktionsstudier är inte utförda, men pyrantel bör inte kombineras med piperazin eller levamisol.

Överdoser

Låg akut toxicitet; peroral dosering av 2000 mg/kg till mus och råtta eller 1000 mg/kg till hund har inte visat några toxiska effekter.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga särskilda.

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tillfällig hudöverkänslighet kan förekomma, varför hudkontakt skall undvikas; tvätta med tvål och vatten.

Hållbarhet

2 år.

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i högst 25 grader Celsius.

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Överblivet läkemedel överlämnas till apotek för destruktion.

Förpackningsinformation

Oral pasta 400 mg/g En homogen, ljus guldfärgad emulsion
2 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd

10 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd

28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd, *tillhandahålls ej*

10 x 10 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd, *tillhandahålls ej*

50 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd, *tillhandahålls ej*