

BIPACKSEDEL

Rimadyl vet. 20 mg tuggtabletter för hund

Rimadyl vet. 50 mg tuggtabletter för hund

Rimadyl vet. 100 mg tuggtabletter för hund

**1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV
GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ
OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV
TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR
FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA**

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

DK-2100 Köpenhamn

Danmark

Tillverkare:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

**2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS
NAMN**

Rimadyl vet. 20 mg, 50 mg och 100 mg tuggtabletter Carprofen

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans: Carprofen

Hjälpämnen: Spraytorkat svinleverpulver, majsstärkelse, hydrolyseret vegetabiliskt protein, socker, vetegroddar, laktosmonohydrat, vattenfritt kalciumvätefosfat, flytande glukos, gelatin och magnesiumstearat.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Behandling av inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett hos hund samt vid smärta efter operation hos hund.

Smärtstillande och antiinflammatoriskt läkemedel.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till djur med blödningsrubbningar, måttligt/kraftigt försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion eller där det finns tecken på överkänslighet mot produkten.

6. BIVERKNINGAR

Vid användning av läkemedel av den här typen kan bland annat kräkningar, diarré, mag- och tarmlödningar, aptitlöshet, slöhet samt risk för njur- och leverskador förekomma men är sällsynt. Dessa biverkningar är ofta tillfälliga men kan i enstaka fall vara allvarliga eller livshotande.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Följ alltid av veterinär rekommenderad behandling.

Tuggtablettarna har en smakstillsats som gör att de flesta hundar äter tuggtablettarna.

Vanlig dos är:

4 mg per kg kroppsvikt per dygn fördelat på två doseringstillfällen i lika stora doser.

20 mg tablett: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen

50 mg tablett: 1 tablett per 25 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen

100 mg tablett: 1 tablett per 50 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

Vid behandlingstider i mer än 14 dagar bör hunden regelbundet undersökas av veterinär.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Om detta läkemedel ges samtidigt med andra läkemedel bör behandlande veterinär känna till annan samtidig medicinering.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara tuggtablettarna på ett säkert ställe, så att hunden inte kan komma åt burken. Allvarliga biverkningar kan uppkomma om stora mängder tabletter konsumeras. Kontakta veterinär vid misstanke om att hunden fått i sig högre dos än rekommenderat.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Skall ej ges till katt.

Skall ej ges till dräktiga eller lakterande tikar.

Försiktighet bör iakttas vid användning till valpar under 6 veckor eller mycket gamla djur.

Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid medicinering av djur med hjärt-, lever- eller njursjukdomar, djur som är uttorkade samt vid förekomst av infektioner.

Rimadyl tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Samtidig medicinering med andra NSAIDs eller läkemedel som kan påverka njurfunktionen negativt bör undvikas.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö och säkerhetsskäl ska överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2022-06-01

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 30, 50, 60, 100 och 180 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.