

## Truvada



### Gilead

Filmdragerad tablett 200 mg/245 mg

(Blå kapselformade, filmdragerade tabletter med dimensionerna 19 mm x 8,5 mm, präglade på ena sidan med "GILEAD" och på andra sidan med "701".)

Omvända transkriptashämmare av nukleosid- och nukleotidtyp

### Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Emtricitabin

Tenofovirdisoproxil

### ATC-kod:

J05AR03

Läkemedel från Gilead omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.

**FASS-text:** *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på produktresumé: 02/2024.*

## Indikationer

*Behandling av hiv-1-infektion*

Truvada är avsett för antiretroviral kombinationsterapi vid behandling av hiv-1-infekterade vuxna (se avsnitt Farmakodynamik).

Truvada är även avsett för behandling av hiv-1-infekterade ungdomar när NRTI-resistens eller toxicitet utesluter användande av första linjens läkemedel (se avsnitt Dosering, Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

#### *Profylax före exponering (PrEP):*

Truvada är, i kombination med säkert sex, avsett som profylax före exponering för att minska risken för sexuellt överförd hiv-1-infektion hos vuxna och ungdomar med hög risk (se avsnitt Dosering, Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

## **Kontraindikationer**

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Förteckning över hjälpämnen.

Användning som profylax före exponering hos personer med okänd eller positiv hiv-1-status.

## **Dosering**

Truvada bör sättas in av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.

*Behandling av hiv hos vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre som väger minst 35 kg:* En tablett en gång dagligen.

*Förebyggande av hiv hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, som väger minst 35 kg:* En tablett en gång dagligen.

Separata beredningar av emtricitabin och tenofovirdisoproxil finns att tillgå för behandling av hiv-1-infektion om det blir nödvändigt att sätta ut eller förändra dosen av någon av Truvadas komponenter. Se produktresumén för dessa läkemedel.

Vid missad dos av Truvada inom 12 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas ska Truvada tas så snart som möjligt och det normala doseringsschemat ska sedan återupptas. Vid missad dos av Truvada med mer än 12 timmar och det snart är dags att ta nästa dos ska den missade dosen inte tas utan det vanliga doseringsschemat ska återupptas.

Om kräkning sker inom 1 timme efter intag av Truvada ska en ny tablett tas. Om kräkning sker efter mer än 1 timme efter intag av Truvada ska inte en andra dos tas.

### Särskilda populationer

*Äldre:* Ingen dosjustering krävs (se avsnitt Farmakokinetik).

*Nedsatt njurfunktion:* Emtricitabin och tenofovir elimineras genom renal utsöndring och exponeringen för emtricitabin och tenofovir ökar hos personer med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

### *Vuxna med nedsatt njurfunktion:*

Truvada ska endast användas till patienter med kreatininclearance (CrCl) < 80 ml/min om de potentiella fördelarna anses väga tyngre än de potentiella riskerna. Se tabell 1.

**Tabell 1: Rekommenderad dosering hos vuxna med nedsatt njurfunktion**

|                                                   | <b>Behandling av hiv-1-infektion</b>                                                                                           | <b>Profylax före exponering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lätt nedsatt njurfunktion (CrCl 50–80 ml/min)     | Begränsade data från kliniska studier stödjer dosering en gång dagligen (se avsnitt Varningar och försiktighet).               | Begränsade data från kliniska studier stödjer dosering en gång dagligen hos personer som inte är infekterade med hiv-1 med CrCl 60–80 ml/min. Användning rekommenderas inte för personer som inte är infekterade med hiv-1 med CrCl < 60 ml/min eftersom det inte har studerats i denna population (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik). |
| Måttligt nedsatt njurfunktion (CrCl 30–49 ml/min) | Administrering var 48:e timme rekommenderas baserat på modellering av farmakokinetiska data för enkel dos för emtricitabin och | Rekommenderas inte för användning i denna population.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                | tenofovirdisoproxil<br>hos personer som inte<br>är infekterade med hi<br>v med varierande<br>grader av nedsatt<br>njurfunktion (se<br>avsnitt Varningar och<br>försiktighet). |                                                             |
| Svårt nedsatt<br>njurfunktion (CrCl <<br>30 ml/min) och<br>hemodialyspatienter | Rekommenderas inte<br>eftersom lämpliga<br>dosreduceringar inte<br>kan uppnås med<br>kombinationstablette<br>n.                                                               | Rekommenderas inte<br>för användning i<br>denna population. |

*Barn med nedsatt njurfunktion:*

Rekommenderas inte för användning till individer under 18 års ålder med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).

*Nedsatt leverfunktion:* Ingen dosjustering krävs hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

*Pediatrisk population:* Säkerhet och effekt för Truvada för barn under 12 års ålder har inte fastställts (se avsnitt Farmakokinetik).

**Administreringssätt**

Oral administrering. Det är att föredra att Truvada intas tillsammans med föda.

Den filmdragerade tabletten kan lösas i ca 100 ml vatten, apelsinjuice eller druvjuice, som tas omedelbart.

## **Varningar och försiktighet**

### **Patienter med hiv-1-stammar med mutationer**

Truvada bör undvikas hos antiretroviralt behandlade patienter med hiv-1 som har stammar med K65R-mutationen (se avsnitt Farmakodynamik).

### **Övergripande strategi för förebyggande av hiv-1-infektion**

Truvada är inte alltid effektivt i förebyggandet av överföringen av hiv-1. Tiden fram till start av skyddseffekt sedan behandling med Truvada har inletts är okänd.

Truvada ska endast användas för profylax före exponering som en del av en övergripande strategi för förebyggande av hiv-1-infektion inklusive användningen av andra förebyggande åtgärder (t.ex. konsekvent och korrekt användning av kondom, kännedom om hiv-1-status och regelbunden testning för andra sexuellt överförda infektioner).

### *Risk för resistens med ej detekterad hiv-1-infektion*

Truvada ska endast användas för att minska risken för att drabbas av hiv-1 hos personer som bekräftats vara hiv-negativa (se avsnitt Kontraindikationer). Personer ska bekräftas på nytt vara hiv-negativa med täta mellanrum (t.ex. minst var 3:e månad) med hjälp av ett test med kombinerade antigener/antikroppar, medan Truvada tas för profylax före exponering.

Truvada ensamt utgör inte en komplett regim för behandling av hiv-1 och hiv-1-resistensmutationer har uppträtt hos personer med ej detekterad hiv-1-infektion som endast tar Truvada.

Om kliniska symtom som överensstämmer med akut viral infektion föreligger och senare (< 1 månad) exponering för hiv-1 misstänks ska användningen av Truvada skjutas upp i minst en månad och hiv-1-status bekräftas på nytt innan behandling med Truvada inleds för profylax före exponering.

### *Vikten av följsamhet*

Truvadas effekt när det gäller reducering av risken för att drabbas av hiv-1 är starkt korrelerad med följsamheten så som det har påvisats i studier genom mätbara läkemedelsnivåer i blodet (se avsnitt Farmakodynamik). Personer som inte har infekterats med hiv-1 ska med täta mellanrum rekommenderas att strikt följa det rekommenderade dagliga doseringsschemat för Truvada.

### **Patienter med hepatit B- eller C-infektion**

Hiv-1-infekterade patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral terapi löper ökad risk för svåra och potentiellt dödliga leverbiverkningar. Läkare ska konsultera aktuella riktlinjer för behandling för av hiv-infektion hos patienter med samtidig infektion med hepatit B-virus (HBV) eller hepatit C-virus (HCV).

Säkerhet och effekt för Truvada har inte fastställts för profylax före exponering hos patienter med HBV- eller HCV-infektion.

Om patienten får samtidig antiviral terapi för hepatit B eller C, se produktresumén för dessa läkemedel. Se även nedan under ”

*Användning med ledipasvir och sofosbuvir eller sofosbuvir och velpatasvir”.*

Tenofovirdisoproxil är indicerat för behandling av HBV och emtricitabin har visat sig vara aktivt mot HBV i farmakodynamiska studier men Truvadas säkerhet och effekt har inte specifikt fastställts hos patienter med kronisk HBV-infektion.

Utsättande av behandling med Truvada hos patienter med HBV kan vara associerad med svåra akuta exacerbationer av hepatit. Patienter med HBV som avbryter behandling med Truvada ska övervakas noggrant med både kliniska och laboriemässiga kontroller under kommande månader efter avslutad behandling. Vid behov kan det vara motiverat att återuppta hepatit B-behandling. Hos patienter med framskriden leversjukdom eller cirros rekommenderas inte utsättande av behandling eftersom hepatitexacerbation efter behandling kan leda till leverdekompensation.

## **Leversjukdom**

Säkerhet och effekt för Truvada hos patienter med signifikanta underliggande leversjukdomar har inte fastställts. Farmakokinetiken för tenofovir har studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion och ingen dosjustering krävs. Farmakokinetiken för emtricitabin har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Det är osannolikt att dosjusteringar av Truvada kan komma att krävas hos patienter med nedsatt leverfunktion med tanke på emtricitabins minimala levermetabolism och renala elimineringsväg (se avsnitt Dosering och Farmakokinetik).

Hos hiv-1-infekterade patienter med tidigare nedsatt leverfunktion, inklusive kronisk aktiv hepatit, finns en ökad frekvens av störningar i leverfunktionen under antiretroviral kombinationsterapi (CART) och dessa patienter bör övervakas på sedvanligt sätt. Vid tecken på förvärrad leversjukdom hos dessa patienter måste uppehåll eller utsättande av behandlingen övervägas.

## **Effekter på njurar och benvävnad hos vuxna**

### *Effekter på njurarna*

Emtricitabin och tenofovir utsöndras huvudsakligen via njurarna genom en kombination av glomerulär filtration och aktiv tubulär sekretion. Njursvikt, nedsatt njurfunktion, förhöjt kreatinin, hypofosfatemi och proximal tubulopati (inklusive Fanconis syndrom) har rapporterats vid användning av tenofovirdisoproxil i klinisk praxis (se avsnitt Biverkningar).

### *Kontroll av njurarna*

Innan Truvada sätts in för behandling av hiv-1-infektion eller för användning av profylax före exponering rekommenderas att kreatininclearance beräknas för alla personer.

Hos personer utan riskfaktorer för njursjukdom rekommenderas det att njurfunktionen (kreatininclearance och serumfosfat) kontrolleras efter två till fyra veckors användning, efter tre månaders användning och därefter var tredje till var sjätte månad.

Hos personer som löper risk att utveckla njursjukdom krävs tätare kontroll av njurfunktionen.

Se även nedan under "*Samtidig administrering av andra läkemedel*".

### *Övervakning av njurarna hos hiv-1-infekterade patienter*

Om serumfosfatvärdet är  $< 1,5$  mg/dl (0,48 mmol/l) eller om kreatininclearance minskat till  $< 50$  ml/min hos patienter som får Truvada bör njurfunktionen utvärderas på nytt inom en vecka, liksom mätning av koncentrationer av blodglukos, blodkalium och uringlukos (se avsnitt Biverkningar, proximal tubulopati). Man bör överväga att avbryta behandling med Truvada hos patienter med kreatininclearance sänkt till  $< 50$  ml/min eller serumfosfat sänkt till  $< 1,0$  mg/dl (0,32 mmol/l). Man bör också överväga att avbryta behandlingen med Truvada vid fortskridande försämring av njurfunktionen när ingen annan orsak har identifierats. Truvadas renala säkerhetsprofil har endast studerats i mycket begränsad utsträckning hos hiv-1-infekterade patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance  $< 80$  ml/min).

Dosintervalljusteringar rekommenderas för hiv-1-infekterade patienter med kreatininclearance 30-49 ml/min (se avsnitt Dosering). Begränsade data från kliniska studier tyder på att det förlängda dosintervallet inte är optimalt och kan leda till ökad toxicitet och möjligen inadekvat effekt. Vidare i en liten klinisk studie hade en delgrupp med patienter med kreatininclearance mellan 50 och 60 ml/min, som fick tenofovirdisoproxil i kombination med emtricitabin var 24:e timme, en 2-4 gånger högre exponering för tenofovir och försämrad njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik). Därför måste en noggrann bedömning av nytta och risk göras när Truvada används hos patienter med kreatininclearance  $< 60$  ml/min och njurfunktionen ska övervakas noggrant. Dessutom bör den kliniska behandlingseffekten övervakas noggrant hos patienter

som får Truvada med förlängt dosintervall. Användning av Truvada rekommenderas inte till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance  $< 30$  ml/min) och inte till patienter som behöver hemodialys eftersom lämpliga dosminskningar inte kan göras med kombinationstabletten (se avsnitt Dosering och Farmakokinetik).

### *Övervakning av njurarna vid profylax före exponering*

Truvada har inte studerats hos personer som inte har infekterats med hiv-1 med kreatininclearance  $< 60$  ml/min och rekommenderas därför inte för användning i denna population. Om serumfosfatvärdet är  $< 1,5$  mg/dl (0,48 mmol/l) eller om kreatininclearance minskat till  $< 60$  ml/min hos personer som får Truvada som profylax före exponering bör njurfunktionen utvärderas på nytt inom en vecka, liksom mätning av koncentrationer av blodglukos, blodkalium och uringlukos (se avsnitt Biverkningar, proximal tubulopati). Man bör överväga att avbryta användning av Truvada hos personer med kreatininclearance sänkt till  $< 60$  ml/min eller serumfosfat sänkt till  $< 1,0$  mg/dl (0,32 mmol/l). Man bör också överväga att avbryta behandlingen med Truvada vid fortskridande försämring av njurfunktionen när ingen annan orsak har identifierats.

### *Effekter på benvävnad*

Skelettanomalier som osteomalaci, som kan manifestera sig som ihållande eller förvärrad skelettsmärta, och som vid sällsynta tillfällen kan bidra till frakturer, kan associeras med tenofovirdisoproxil-inducerad proximal njurtubulopati (se avsnitt Biverkningar).

Om abnormiteter i benvävnaden misstänks eller påvisas ska lämplig rådgivning sökas.

### *Behandling av hiv-1-infektion*

En minskning av skelettets bentäthet (BMD) har observerats med tenofovirdisoproxil hos patienter med hiv- eller hepatit B-infektion, i randomiserade, kontrollerade, kliniska prövningar som pågått i upp till 144 veckor. Denna minskade bentäthet förbättrades i allmänhet efter avslutad behandling.

I andra studier (prospektiva studier och tvärstudier) förekom de mest uttalade minskningarna av BMD hos patienter som behandlats med tenofovirdisoproxil som en del av en regim som innehöll en förstärkt proteashämmare. Sammantaget med tanke på de skelettanormiteter som associerades med tenofovirdisoproxil och begränsningarna med långtidsdata på effekten av tenofovirdisoproxil på benhälsa och frakturnrisk, ska alternativa behandlingsregimer övervägas för patienter med osteoporos eller med frakturer i anamnesen.

### *Profylax före exponering*

I kliniska studier av personer som inte hade infekterats med hiv-1 observerades små minskningar av BMD. I en studie med 498 män var de genomsnittliga förändringarna från baslinjen fram till vecka 24 mellan -0,4 % till -1,0 % i höft, ryggrad, lårbenshals och trokanter hos män som fick Truvada-profylax dagligen (n = 247) jämfört med placebo (n = 251).

## **Effekter på njurar och benvävnad i den pediatriiska populationen**

Det råder ovisshet om de toxiska effekterna av tenofovirdisoproxil på njurar och benvävnad på lång sikt vid behandling av hiv-1-infektion i den pediatrika populationen och långtidseffekterna av Truvada på njurar och benvävnad vid användning som profylax före exponering hos ungdomar som inte är infekterade (se avsnitt Farmakodynamik). Inte heller kan reversibiliteten av njurtoxiciteten efter upphörd behandling med tenofovirdisoproxil för behandling av hiv-1 eller efter upphörd användning av Truvada som profylax före exponering fastställas fullt ut.

Ett multidisciplinärt omhändertagande rekommenderas för att väga nyttan mot risken med användning av Truvada för behandling av hiv-1-infektion eller som profylax före exponering, besluta om lämpliga kontroller under behandlingen, inklusive beslut om utsättande av behandlingen, samt överväga behovet av tillskott från fall till fall.

Vid användning av Truvada som profylax före exponering bör individerna utvärderas på nytt vid varje besök för att säkerställa om de kvarstår på hög risk för hiv-1-infektion. Risken för hiv-1-infektion bör balanseras mot de potentiella effekterna på njurar och benvävnad vid långtidsanvändning av Truvada.

### *Effekter på njurarna*

Biverkningar på njurarna som överensstämmer med proximal renal tubulopati har i den kliniska studien GS-US-104-0352 rapporterats hos hiv-1-infekterade barn i åldern 2 till < 12 år (se avsnitt Biverkningar och Farmakodynamik).

### *Kontroll av njurarna*

Njurfunktionen (kreatininclearance och serumfosfat) ska bedömas före påbörjad användning av Truvada för behandling av hiv-1 eller som profylax före exponering, och njurfunktionen ska kontrolleras under användning på samma sätt som för vuxna (se ovan).

### *Övervakning av njurarna*

Om serumfosfat bekräftas vara  $< 3,0$  mg/dl (0,96 mmol/l) hos pediatrika patienter som får Truvada bör njurfunktionen utvärderas på nytt inom en vecka. Detta bör innefatta koncentrationsmätningar av blodglukos, blodkalium och uringlukos (se avsnitt Biverkningar, proximal tubulopati). Om störningar i njurfunktionen misstänks eller detekteras bör en njurläkare konsulteras för ställningstagande till om användningen av Truvada ska avbrytas eller inte. Man bör också överväga att avbryta användning av Truvada vid fortskridande försämring av njurfunktionen när ingen annan orsak har identifierats.

### *Samtidig administrering och risk för njurtoxicitet*

Samma rekommendationer som för vuxna gäller (se Samtidig administrering av andra läkemedel nedan).

### *Nedsatt njurfunktion*

Användning av Truvada rekommenderas inte till individer under 18 års ålder med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering). Behandling med Truvada bör inte inledas hos pediatrika patienter med nedsatt njurfunktion och bör sättas ut hos pediatrika patienter som utvecklar nedsatt njurfunktion vid användning av Truvada.

### *Effekter på benvävnad*

Användning av tenofovirdisoproxil kan orsaka en minskning av BMD. Effekterna av tenofovirdisoproxilrelaterade förändringar i BMD på benvävnadens tillstånd och risken för frakturer i framtiden är oviss (se avsnitt Farmakodynamik).

Om abnormiteter i benvävnaden detekteras eller misstänks vid användning av Truvada hos någon pediatrik patient bör en endokrinolog och/eller njurläkare konsulteras.

### **Vikt och metabola parametrar**

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbingar ska behandlas på ett kliniskt lämpligt sätt.

### **Mitokondriell dysfunktion efter exponering *in utero***

Nukleos(t)idanaloger kan i varierande grad påverka mitokondriell funktion, vilket är mest uttalat med stavudin, didanosin och zidovudin. Man har rapporterat mitokondriell dysfunktion hos hiv-negativa spädbarn som exponerats för nukleosidanaloger *in utero* och/eller postnatalt; dessa har främst avsett behandling med regimen innehållande zidovudin. De väsentligaste biverkningarna som rapporterats är hematologiska rubbningar (anemi, neutropeni) och metabola rubbningar (hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Dessa biverkningar har ofta varit övergående. Några sent uppträdande neurologiska rubbningar har rapporterats som sällsynta (ökad

tonus, kramper, onormalt beteende). Om sådana neurologiska rubbningar är övergående eller permanenta är för närvarande okänt. Dessa fynd ska övervägas för alla barn som *in utero* exponerats för nukleos(t)idanaloger och som uppvisar allvarliga kliniska fynd av okänd etiologi, i synnerhet neurologiska fynd. Dessa fynd påverkar inte aktuella nationella rekommendationer avseende antiretroviral terapi till gravida kvinnor för att förhindra vertikal överföring av hiv.

### **Immunreaktiveringssyndrom**

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av CART, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärra symtom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande av CART. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och *Pneumocystis jirovecii* pneumoni. Varje symtom på inflammation ska utredas och behandling påbörjas vid behov. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats vid immunreaktivering; dock har tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

### **Opportunistiska infektioner**

Hiv-1-infekterade patienter som får Truvada eller någon annan antiretroviral terapi kan fortsätta att utveckla opportunistiska infektioner och andra komplikationer av en hiv-infektion. Därför ska dessa patienter kvarstå under noggrann klinisk observation av läkare med erfarenhet av behandling av patienter med hiv-relaterade sjukdomar.

## **Osteonekros**

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-användning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv sjukdom och/eller långvarig exponering för CART. Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

## **Samtidig administrering av andra läkemedel**

Användning av Truvada bör undvikas vid samtidig eller nyligen genomförd behandling med något nefrotoxiskt läkemedel (se avsnitt Interaktioner). Om samtidig behandling med nefrotoxiska medel inte kan undvikas bör njurfunktionen övervakas varje vecka.

Fall av akut njursvikt efter insättande av hög dos eller flera icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) har rapporterats hos patienter som behandlas med tenofovirdisoproxil och som har riskfaktorer för nedsatt njurfunktion. Om Truvada administreras samtidigt med ett NSAID bör njurfunktionen övervakas på ett adekvat sätt.

En högre risk för nedsatt njurfunktion har rapporterats hos hiv -1-infekterade patienter som får tenofovirdisoproxil i kombination med en ritonavir- eller kobicistatförstärkt proteashämmare. Noggrann övervakning av njurfunktionen krävs hos dessa patienter (se avsnitt Interaktioner). Hos hiv-1-infekterade patienter med renala riskfaktorer bör samtidig administrering av tenofovirdisoproxil med en förstärkt proteashämmare övervägas omsorgsfullt.

Truvada ska inte ges samtidigt med andra läkemedel som innehåller emtricitabin, tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid eller andra cytidinanaloger såsom lamivudin (se avsnitt Interaktioner). Truvada ska inte ges samtidigt med adefovirdipivoxil.

*Användning med ledipasvir och sofosbuvir, sofosbuvir och velpatasvir eller sofosbuvir, velpatasvir och voxilaprevir*

Samtidig administrering av tenofovirdisoproxil och ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir har visat sig öka plasmakoncentrationen av tenofovir, särskilt när läkemedlet används tillsammans med en hiv-regim som innehåller tenofovirdisoproxil och en farmakokinetisk förstärkare (ritonavir eller kobicistat).

Säkerheten med tenofovirdisoproxil när läkemedlet administreras samtidigt med ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir och en farmakokinetisk förstärkare har ej fastställts. Eventuella risker och den eventuella nytta som förknippas med samtidig administrering ska beaktas, särskilt hos patienter med ökad risk för nedsatt njurfunktion. Patienter som får ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir samtidigt med tenofovirdisoproxil och en förstärkt, hiv-specifik proteashämmare ska övervakas med avseende på tenofovirdisoproxilrelaterade biverkningar.

*Samtidig administrering av tenofovirdisoproxil och didanosin*

Samtidig administrering av tenofovirdisoproxil och didanosin rekommenderas inte (se avsnitt Interaktioner).

## **Trippelbehandling med nukleosider**

Man har rapporterat en hög frekvens av virologisk terapivikt och även resistensutveckling, i tidiga stadier, när tenofovirdisoproxil kombinerats med lamivudin och abakavir eller med lamivudin och didanosin, givet en gång dagligen. Det finns en nära strukturell likhet mellan lamivudin och emtricitabin samt likheter i farmakokinetiken och farmakodynamiken för dessa två medel. Därför kan samma problem observeras om Truvada administreras tillsammans med en tredje nukleosidanalogue.

## **Äldre**

Truvada har inte studerats hos patienter över 65 år. Det är mer sannolikt att äldre patienter har nedsatt njurfunktion, och försiktighet bör därför iakttas vid behandling av äldre patienter med Truvada.

## **Hjälpämnen**

Truvada innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## **Interaktioner**

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Eftersom Truvada innehåller emtricitabin och tenofovirdisoproxil, kan interaktioner som setts med dessa läkemedel också inträffa med Truvada. Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Emtricitabins och tenofovirs farmakokinetik vid steady-state påverkades inte när emtricitabin och tenofovirdisoproxil administrerades tillsammans jämfört med när respektive läkemedel doserades ensamt.

*In vitro* och kliniska farmakokinetiska interaktionsstudier har visat att potentialen för CYP450-förmedlade interaktioner mellan emtricitabin respektive tenofovirdisoproxil och andra läkemedel är låg.

### **Samtidig användning rekommenderas inte:**

Truvada ska inte ges samtidigt med andra läkemedel som innehåller emtricitabin, tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid eller andra cytidinanaloger, såsom lamivudin (se avsnitt Varningar och försiktighet). Truvada ska inte ges samtidigt med adefovirdipivoxil.

*Didanosin:* Samtidig administrering av Truvada och didanosin rekommenderas inte (se avsnitt Varningar och försiktighet och tabell 2).

*Läkemedel som elimineras via njurarna:* Eftersom emtricitabin och tenofovir elimineras främst via njurarna kan samtidig administrering av Truvada och läkemedel som sätter ned

njurfunktionen eller konkurrerar om aktiv tubulär sekretion (t.ex. cidofovir) höja serumkoncentrationerna av emtricitabin, tenofovir och/eller de samtidigt administrerade läkemedlen.

Användning av Truvada bör undvikas vid samtidig eller nyligen genomförd behandling med något nefrotoxiskt läkemedel. Några exempel inkluderar men är inte begränsade till aminoglykosider, amfotericin B, foskarnet, ganciklovir, pentamidin, vankomycin, cidofovir och interleukin-2. (se avsnitt Varningar och försiktighet).

#### *Övriga interaktioner:*

Interaktioner mellan Truvada eller dess enskilda komponenter och andra läkemedel visas i tabell 2 nedan (ökning visas som "↑", minskning som "↓", oförändrat som "↔", två gånger dagligen som "b.i.d." och en gång dagligen som "q.d."). Om data finns tillgängligt för 90 %-igt konfidensintervall visas det inom parentes.

Tabell 2: Interaktioner mellan Truvada eller dess enskilda komponenter och andra läkemedel

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism) | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFEKTIONSLÄKEMEDEL</b>                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| <b>Antiretrovirala läkemedel</b>            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                           | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, Cmax, Cmin med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                              | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteashämmare</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Atazanavir/Ritonavir/<br>Tenofovirdisoproxil<br>(300 mg q.d./100 mg q.d./245 mg q.d.) | <p>Atazanavir:<br/>AUC: ↓ 25 % (↓ 42 till ↓ 3)<br/>Cmax: ↓ 28 % (↓ 50 till ↑ 5)<br/>Cmin: ↓ 26 % (↓ 46 till ↑ 10)</p> <p>Tenofovir:<br/>AUC: ↑ 37 %<br/>Cmax: ↑ 34 %<br/>Cmin: ↑ 29 %</p> | Ingen dosjustering rekommenderas. Den ökade exponeringen för tenofovir kan förstärka tenofovirassocierade biverkningar, inklusive störningar i njurfunktionen. Njurfunktionen ska övervakas noggrant (se avsnitt Varningar och försiktighet). |
| Atazanavir/Ritonavir/E<br>mtricitabin                                                 | Interaktionen har inte studerats.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Darunavir/Ritonavir/<br>Tenofovirdisoproxil<br>(300 mg q.d./100 mg q.d./245 mg q.d.)  | <p>Darunavir:<br/>AUC: ↔<br/>Cmin: ↔</p> <p>Tenofovir:<br/>AUC: ↑ 22 %<br/>Cmin: ↑ 37 %</p>                                                                                               | Ingen dosjustering rekommenderas. Den ökade exponeringen för tenofovir kan förstärka tenofovirassocierade biverkningar,                                                                                                                       |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                       | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, Cmax, Cmin med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism) | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darunavir/Ritonavir/Emtricitabin                                                  | Interaktionen har inte studerats.                                                                                                                            | inklusive störningar i njurfunktionen. Njurfunktionen ska övervakas noggrant (se avsnitt Varningar och försiktighet).                                                                                                                         |
| Lopinavir/Ritonavir/Tenofovirdisoproxil (400 mg b.i.d./100 mg b.i.d./245 mg q.d.) | Lopinavir/Ritonavir:<br>AUC: ↔<br>Cmax: ↔<br>Cmin: ↔<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↑ 32 % (↑ 25 till ↑ 38)<br>Cmax: ↔<br>Cmin: ↑ 51 % (↑ 37 till ↑ 66)           | Ingen dosjustering rekommenderas. Den ökade exponeringen för tenofovir kan förstärka tenofovirassocierade biverkningar, inklusive störningar i njurfunktionen. Njurfunktionen ska övervakas noggrant (se avsnitt Varningar och försiktighet). |
| Lopinavir/Ritonavir/Emtricitabin                                                  | Interaktionen har inte studerats.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NRTler</b>                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Didanosin/Tenofovirdisoproxil                                                     | Samtidig administrering av                                                                                                                                   | Samtidig administrering av Truvada och                                                                                                                                                                                                        |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, Cmax, Cmin med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism) | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | tenofovirdisoproxil och didanosin resulterar i att den systemiska exponeringen för didanosin ökar med 40–60 %.                                              | didanosin rekommenderas inte (se avsnitt Varningar och försiktighet).<br><br>Ökad systemisk exponering för                                                                                                                                            |
| Didanosin/Emtricitabin                      | Interaktionen har inte studerats.                                                                                                                           | didanosin kan öka risken för                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             |                                                                                                                                                             | didanosinrelaterade biverkningar. Sällsynta fall av pankreatit och laktacidosis, ibland dödliga, har rapporterats. Samtidig administrering av tenofovirdisoproxil och didanosin i en daglig dos på 400 mg har associerats med en signifikant sänkning |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism) | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                      | g av antalet CD4-celler, eventuellt beroende på ökade intracellulära halter av fosforylerat (dvs. aktivt) didanosin. Vid sänkt dos på 250 mg didanosin given samtidigt med tenofovirdisoproxil har hög frekvens av virologisk terapisvikt rapporterats med flera testade kombinationer för behandling av hiv-1-infektion. |
| Lamivudin/Tenofovirdisoproxil               | Lamivudin:<br>AUC: ↓ 3 % (↓ 8 % till ↑ 15)<br>C <sub>max</sub> : ↓ 24 % (↓ 44 till ↓ 12)                                                                                             | Lamivudin och Truvada ska inte administreras                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                       | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | C <sub>min</sub> : EB<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↓ 4 % (↓ 15 till ↑ 8)<br>C <sub>max</sub> : ↑ 102 % (↓ 96 till ↑ 108)<br>C <sub>min</sub> : EB                                                                              | samtidigt (se avsnitt Varningar och försiktighet).                                                            |
| Efavirenz/Tenofovirdisoproxil               | Efavirenz:<br>AUC: ↓ 4 % (↓ 7 till ↓ 1)<br>C <sub>max</sub> : ↓ 4 % (↓ 9 till ↑ 2)<br>C <sub>min</sub> : EB<br>Tenofovir:<br>AUC: ↓ 1 % (↓ 8 till ↑ 6)<br>C <sub>max</sub> : ↑ 7 % (↓ 6 till ↑ 22)<br>C <sub>min</sub> : EB | Ingen dosjustering av efavirenz krävs.                                                                        |

|                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism) | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **INFEKTIONSLÄKEMEDEL**

### **Virushämmande medel mot hepatit B-virus (HBV)**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adefovirdipivoxil/<br>Tenofovirdisoproxil | <p>Adefovirdipivoxil:<br/>AUC: ↓ 11 % (↓ 14 till ↓ 7)<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 7 % (↓ 13 till ↓ 0)<br/>C<sub>min</sub>: EB</p> <p>Tenofovir:<br/>AUC: ↓ 2 % (↓ 5 till ↑ 0)<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 1 % (↓ 7 till ↑ 6)<br/>C<sub>min</sub>: EB</p> | Adefovirdipivoxil och Truvada ska inte administreras samtidigt (se avsnitt Varningar och försiktighet). |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Virushämmande medel mot hepatit C-virus (HCV)**

|                                                                  |                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ledipasvir/Sofosbuvir (90 mg/400 mg q.d.) + Atazanavir/Ritonavir | <p>Ledipasvir:<br/>AUC: ↑ 96 % (↑ 74 till ↑ 121)</p> | Ökade plasmakoncentrationer av tenofovir på grund av samtidig ad |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                  | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                                                                 | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (300 mg q.d./100 mg q.d.) +<br>Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil<br>(200 mg/245 mg q.d.)<br>1 | <p>C<sub>max</sub>: ↑ 68 % (↑ 54 till ↑ 84)</p> <p>C<sub>min</sub>: ↑ 118 % (↑ 91 till ↑ 150)</p> <p>Sofosbuvir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 42 % (↑ 34 till ↑ 49)</p> <p>Atazanavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 63 % (↑ 45 till ↑ 84)</p> | <p>ministrering av tenofovirdisoproxil, ledipasvir/sofosbuvir och atazanavir/ritonavir kan öka biverkningar relaterade till tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen. Säkerheten för tenofovirdisoproxil vid användning med ledipasvir/sofosbuvir och en farmakokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.</p> <p>Kombinationen bör användas med</p> |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                  | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>Ritonavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 45 % (↑ 27 till ↑ 64)</p> <p>Emtricitabin:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenofovir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 47 % (↑ 37 till ↑ 58)<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 47 % (↑ 38 till ↑ 57)</p> | försiktighet med täta kontroller av njurfunktionen, om andra alternativ inte är tillgängliga (se avsnitt Varningar och försiktighet). |
| Ledipasvir/Sofosbuvir                       | Ledipasvir:<br>AUC: ↔                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ökade plasmakoncentration                                                                                                             |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                                                             | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                 | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (90 mg/400 mg q.d.) +<br>Darunavir/Ritonavir (800 mg q.d./100 mg q.d.) +<br>Emtricitabin/Tenofovir disoproxil (200 mg/245 mg q.d.)<br>1 | C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br>Sofosbuvir:<br>AUC: ↓ 27 % (↓ 35 till ↓ 18)<br>C <sub>max</sub> : ↓ 37 % (↓ 48 till ↓ 25)<br>GS-331007 <sup>2</sup> :<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br>Darunavir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br>Ritonavir: | er av tenofovir på grund av samtidig administrering av tenofovirdisoproxil, ledipasvir/sofosbuvir och darunavir/ritonavir kan öka biverkningar relaterade till tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen. Säkerheten för tenofovirdisoproxil vid användning med ledipasvir/sofosbuvir och en farmakokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts. |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                         | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofoviridisoproxil 245 mg)                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 48 % (↑ 34 till ↑ 63)</p> <p>Emtricitabin:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenofovir:<br/>AUC: ↑ 50 % (↑ 42 till ↑ 59)<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 64 % (↑ 54 till ↑ 74)<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 59 % (↑ 49 till ↑ 70)</p> | Kombinationen bör användas med försiktighet med tätakontroller av njurfunktionen, om andra alternativ inte är tillgängliga (se avsnitt Varningar och försiktighet). |
| Ledipasvir/Sofosbuvir (90 mg/400 mg q.d.) + | Ledipasvir:<br>AUC: ↓ 34 % (↓ 41 till ↓ 25)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ingen dosjustering rekommenderas. Den ökade exponeringen                                                                                                            |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                             | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                                    | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efavirenz/Emtricitabin /Tenofovirdisoproxil (600 mg/200 mg/245 mg q.d.) | <p>C<sub>max</sub>: ↓ 34 % (↓ 41 till ↑ 25)<br/>C<sub>min</sub>: ↓ 34 % (↓ 43 till ↑ 24)</p> <p>Sofosbuvir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Efavirenz:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtricitabin:</p> | <p>för tenofovir skulle kunna förstärka biverkningar associerade med tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen. Njurfunktionen ska kontrolleras noggrant (se avsnitt Varningar och försiktighet).</p> |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                                        | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                     | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↑ 98 % (↑ 77 till ↑ 123)<br>C <sub>max</sub> : ↑ 79 % (↑ 56 till ↑ 104)<br>C <sub>min</sub> : ↑ 163 % (↑ 137 till ↑ 197) |                                                                                                                                                                                                  |
| Ledipasvir/Sofosbuvir (90 mg/400 mg q.d.) + Emtricitabin/Rilpivirin/Tenofovirdisoproxil (200 mg/25 mg/245 mg q.d.) | Ledipasvir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Sofosbuvir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔                                                                                | Ingen dosjustering rekommenderas. Den ökade exponeringen för tenofovir kan förstärka biverkningar associerade med tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen. Njurfunktionen ska |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                    | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | GS-331007 <sup>2</sup> :<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Emtricitabin:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Rilpivirin:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↑ 40 % (↑ 31 till ↑ 50)<br>C <sub>max</sub> : ↔ | kontrolleras noggrant (se avsnitt Varningar och försiktighet).                                                |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                                                    | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                                | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | C <sub>min</sub> : ↑ 91 % (↑ 74 till ↑ 110)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ledipasvir/Sofosbuvir (90 mg/400 mg q.d.) + Dolutegravir (50 mg q.d.) + Emtricitabin/Tenofovir disoproxil (200 mg/245 mg q.d.) | <p>Sofosbuvir:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup></p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Ledipasvir:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Dolutegravir</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> | <p>Ingen dosjustering krävs. Den ökade exponeringen för tenofovir kan förstärka biverkningar associerade med tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen.</p> <p>Njurfunktionen ska kontrolleras noggrant (se avsnitt Varningar och försiktighet).</p> |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                    | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                         | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | <p>Emtricitabin:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenofovir:</p> <p>AUC: ↑ 65% (↑ 59 till ↑ 71)</p> <p>C<sub>max</sub>: ↑ 61% (↑ 51 till ↑ 72)</p> <p>C<sub>min</sub>: ↑ 115% (↑ 105 till ↑ 126)</p> |                                                                                                                                 |
| Sofosbuvir/Velpatasvir (400 mg/100 mg q.d.) + Atazanavir/Ritonavir (300 mg q.d./100 mg q.d.) + | <p>Sofosbuvir:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p>                                                                                                             | Ökade plasmakoncentrationer av tenofovir på grund av samtidig administrering av tenofovirdisoproxil, sofosbuvir/velpatasvir och |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde           | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                                                      | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil (200 mg/245 mg q.d.) | <p>C<sub>min</sub>: ↑ 42 % (↑ 37 till ↑ 49)</p> <p>Velpatasvir:<br/>AUC: ↑ 142 % (↑ 123 till ↑ 164)<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 55 % (↑ 41 till ↑ 71)<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 301 % (↑ 257 till ↑ 350)</p> <p>Atazanavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 39 % (↑ 20 till ↑ 61)</p> <p>Ritonavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> | <p>atazanavir/ritonavir kan öka förekomsten av biverkningar relaterade till tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen. Säkerheten för tenofovirdisoproxil vid användning med sofosbuvir/velpatasvir och en farmakokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.</p> <p>Kombinationen bör användas med försiktighet med täta kontroller av njurfunktionen (se</p> |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                   | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <p>C<sub>min</sub>: ↑ 29 % (↑ 15 till ↑ 44)</p> <p>Emtricitabin:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenofovir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 55 % (↑ 43 till ↑ 68)<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 39 % (↑ 31 till ↑ 48)</p> | avsnitt Varningar och försiktighet).                                                                          |
| Sofosbuvir/Velpatasvir (400 mg/100 mg q.d.) + Darunavir/Ritonavir (800 mg q.d./100 mg q.d.) + | <p>Sofosbuvir:<br/>AUC: ↓ 28 % (↓ 34 till ↓ 20)<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 38 % (↓ 46 till ↓ 29)</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:</p>                                                                                                                       | Ökade plasmakoncentrationer av tenofovir på grund av samtidig administrering av tenofovirdisoproxil,          |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde            | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emtricitabin/Tenofovir disoproxil (200 mg/245 mg q.d.) | <p>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Velpatasvir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 24 % (↓ 35 till ↓ 11)<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Darunavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Ritonavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> | <p>sofosbuvir/velpatasvir och darunavir/ritonavir kan öka förekomsten av biverkningar relaterade till tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen. Säkerheten för tenofovirdisoproxil vid användning med sofosbuvir/velpatasvir och en farmakokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.</p> <p>Kombinationen bör användas med försiktighet med täta</p> |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                                                                  | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                  | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | Emtricitabin:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↑ 39 % (↑ 33 till ↑ 44)<br>C <sub>max</sub> : ↑ 55 % (↑ 45 till ↑ 66)<br>C <sub>min</sub> : ↑ 52 % (↑ 45 till ↑ 59) | kontroller av njurfunktionen (se avsnitt Varningar och försiktighet).                                                                                                   |
| Sofosbuvir/Velpatasvir<br>(400 mg/100 mg q.d.)<br>+<br>Lopinavir/Ritonavir<br>(800 mg/200 mg q.d.)<br>+<br>Emtricitabin/Tenofovir disoproxil | Sofosbuvir:<br>AUC: ↓ 29 % (↓ 36 till ↓ 22)<br>C <sub>max</sub> : ↓ 41 % (↓ 51 till ↓ 29)<br>GS-331007 <sup>2</sup> :<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔                                                               | Ökade plasmakoncentrationer av tenofovir på grund av samtidig administrering av tenofovirdisoproxil, sofosbuvir/velpatasvir och lopinavir/ritonavir kan öka förekomsten |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                          | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (200 mg/245 mg q.d.)                        | <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Velpatasvir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 30 % (↓ 41 till ↓ 17)<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 63 % (↑ 43 till ↑ 85)</p> <p>Lopinavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Ritonavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtricitabin:</p> | <p>av biverkningar relaterade till tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen. Säkerheten för tenofovirdisoproxil vid användning med sofosbuvir/velpatasvir och en farmakokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.</p> <p>Kombinationen bör användas med försiktighet med täta kontroller av njurfunktionen (se avsnitt Varningar och försiktighet).</p> |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                                                                         | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism) | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↑ 42 % (↑ 27 till ↑ 57)<br>C <sub>min</sub> : ↔                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sofosbuvir/Velpatasvir<br>(400 mg/100 mg q.d.)<br>+<br>Raltegravir<br>(400 mg b.i.d) +<br>Emtricitabin/Tenofovir disoproxil<br>(200 mg/245 mg q.d.) | Sofosbuvir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>GS-331007 <sup>2</sup> :<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Velpatasvir:<br>AUC: ↔                    | Ingen dosjustering rekommenderas. Den ökade exponeringen för tenofovir skulle kunna förstärka biverkningar associerade med tenofovirdisoproxil, inklusive störningar i njurfunktionen. Njurfunktionen ska kontrolleras noggrant |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                                                         | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Raltegravir:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↓ 21 % (↓ 58 till ↑ 48)</p> <p>Emtricitabin:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenofovir:</p> <p>AUC: ↑ 40 % (↑ 34 till ↑ 45)</p> <p>C<sub>max</sub>: ↑ 46 % (↑ 39 till ↑ 54)</p> | (se avsnitt Varningar och försiktighet).                                                                      |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                                                       | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                           | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | C <sub>min</sub> : ↑ 70 % (↑ 61 till ↑ 79)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sofosbuvir/Velpatasvir<br>(400 mg/100 mg q.d.)<br>+<br>Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir-disoproxil<br>(600 mg/200 mg/245 mg q.d.) | <p>Sofosbuvir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 38 % (↑ 14 till ↑ 67)<br/>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Velpatasvir:<br/>AUC: ↓ 53 % (↓ 61 till ↓ 43)<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 47 % (↓ 57 till ↓ 36)<br/>C<sub>min</sub>: ↓ 57 % (↓ 64 till ↓ 48)</p> <p>Efavirenz:</p> | Samtidig administrering av sofosbuvir/velpatasvir och efavirenz förväntas minska plasmakoncentrationen av velpatasvir. Samtidig administrering av sofosbuvir/velpatasvir och behandlingar som innehåller efavirenz rekommenderas inte. |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde   | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                   | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Emtricitabin:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↑ 81 % (↑ 68 till ↑ 94)<br>C <sub>max</sub> : ↑ 77 % (↑ 53 till ↑ 104)<br>C <sub>min</sub> : ↑ 121 % (↑ 100 till ↑ 143) |                                                                                                               |
| Sofosbuvir/Velpatasvir (400 mg/100 mg q.d.) + | Sofosbuvir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔                                                                                                                                                                                                                                           | Ingen dosjustering rekommenderas. Den ökade exponeringen för tenofovir skulle                                 |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                             | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                                                              | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emtricitabin/Rilpivirin/Tenofovir-disoproxil (200 mg/25 mg/245 mg q.d.) | <p>GS-331007<sup>2</sup>:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Velpatasvir:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtricitabin:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Rilpivirin:</p> <p>AUC: ↔</p> <p>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> | <p>kunna förstärka biverkningar associerade med tenofovirdisoproxil inklusive störningar i njurfunktionen. Njurfunktionen ska kontrolleras noggrant (se avsnitt Varningar och försiktighet).</p> |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                                                                                                                         | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                          | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | Tenofovir:<br>AUC: ↑ 40 % (↑ 34 till ↑ 46)<br>C <sub>max</sub> : ↑ 44 % (↑ 33 till ↑ 55)<br>C <sub>min</sub> : ↑ 84 % (↑ 76 till ↑ 92)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sofosbuvir/Velpatasvir/<br>Voxilaprevir (400 mg/100 mg/100 mg+100 mg q.d.) <sup>3</sup> + Darunavir (800 mg q.d.) + Ritonavir (100 mg q.d.) + Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil (200 mg/245 mg q.d.) | Sofosbuvir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↓ 30 %<br>C <sub>min</sub> : N/A<br><br>GS-331007 <sup>2</sup> :<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : N/A<br><br>Velpatasvir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔ | Ökade plasmakoncentrationer av tenofovir på grund av samtidig administrering av tenofovirdisoproxil, sofosbuvir/velpatasvir / voxilaprevir och darunavir/ritonavir kan öka förekomsten av biverkningar relaterade till tenofovirdisoproxil, |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                                                | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Voxilaprevir:<br/>AUC: ↑ 143 %<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 72 %<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 300 %</p> <p>Darunavir:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↓ 34%</p> <p>Ritonavir:<br/>AUC: ↑ 45 %<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 60 %<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtricitabin:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> | <p>inklusive störningar i njurfunktionen.</p> <p>Säkerheten för tenofovirdisoproxil vid användning med sofosbuvir/velpatasvir / voxilaprevir och en farmakokinetisk förstärkare (t.ex. ritonavir eller kobicistat) har inte fastställts.</p> <p>Kombinationen bör användas med försiktighet med täta kontroller av njurfunktionen (se avsnitt Varningar och försiktighet).</p> |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde                                                       | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                  | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↑ 39 %<br>C <sub>max</sub> : ↑ 48 %<br>C <sub>min</sub> : ↑ 47 %                                                                                                                       |                                                                                                               |
| Sofosbuvir (400 mg q.d.) + Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil (600 mg/200 mg/245 mg q.d.) | Sofosbuvir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↓ 19 % (↓ 40 till ↑ 10)<br><br>GS-331007 <sup>2</sup><br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↓ 23 % (↓ 30 till ↑ 16)<br><br>Efavirenz:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔ | Ingen dosjustering krävs.                                                                                     |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läkemedelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism) | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Emtricitabin:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenofovir:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↑ 25 % (↑ 8 till ↑ 45)<br>C <sub>min</sub> : ↔             |                                                                                                               |
| Ribavirin/Tenofovirdisoproxil               | Ribavirin:<br>AUC: ↑ 26 % (↑ 20 till ↑ 32)<br>C <sub>max</sub> : ↓ 5 % (↓ 11 till ↑ 1)<br>C <sub>min</sub> : EB                                                                      | Ingen dosjustering av ribavirin krävs.                                                                        |
| <b>Virushämmande medel mot herpesvirus</b>  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| Famciklovir/Emtricitabin                    | Famciklovir:                                                                                                                                                                         | Ingen dosjustering av famciklovir krävs.                                                                      |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                     | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | AUC: ↓ 9 % (↓ 16 till ↓ 1)<br>C <sub>max</sub> : ↓ 7 % (↓ 22 till ↑ 11)<br>C <sub>min</sub> : EB<br><br>Emtricitabin:<br>AUC: ↓ 7 % (↓ 13 till ↓ 1)<br>C <sub>max</sub> : ↓ 11 % (↓ 20 till ↑ 1)<br>C <sub>min</sub> : EB |                                                                                                               |
| <b>Antimykobakteriella medel</b>            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| Rifampicin/Tenofovirdisoproxil              | Tenofovir:<br>AUC: ↓ 12 % (↓ 16 till ↓ 8)<br>C <sub>max</sub> : ↓ 16 % (↓ 22 till ↓ 10)<br>C <sub>min</sub> : ↓ 15 % (↓ 12 till ↓ 9)                                                                                      | Ingen dosjustering krävs.                                                                                     |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde         | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                              | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORALA ANTIKONCEPTIONSMEDEL</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Norgestimat/Etinylestradiol/<br>Tenofovirdisoproxil | <p>Norgestimat:<br/>AUC: ↓ 4 % (↓ 32 till ↑ 34)<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 5 % (↓ 27 till ↑ 24)<br/>C<sub>min</sub>: EB</p> <p>Etinylestradiol:<br/>AUC: ↓ 4 % (↓ 9 till ↑ 0)<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 6 % (↓ 13 till ↑ 0)<br/>C<sub>min</sub>: ↓ 2 % (↓ 9 till ↑ 6)</p> | Ingen dosjustering av norgestimat/etinylestradiol krävs.                                                      |
| <b>IMMUNSUPPRESSIVA MEDEL</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Takrolimus/Tenofovir disoproxil/<br>Emtricitabin    | <p>Takrolimus:<br/>AUC: ↑ 4 % (↓ 3 till ↑ 11)</p>                                                                                                                                                                                                                  | Ingen dosjustering av takrolimus krävs.                                                                       |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism)                                                                                                                                           | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>C<sub>max</sub>: ↑ 3 % (↓ 3 till ↑ 9)</p> <p>C<sub>min</sub>: EB</p> <p>Emtricitabin:<br/>AUC: ↓ 5 % (↓ 9 till ↓ 1)</p> <p>C<sub>max</sub>: ↓ 11 % (↓ 17 till ↓ 5)</p> <p>C<sub>min</sub>: EB</p> <p>Tenofovir:<br/>AUC: ↑ 6 % (↓ 1 till ↑ 13)</p> <p>C<sub>max</sub>: ↑ 13 % (↑ 1 till ↑ 27)</p> <p>C<sub>min</sub>: EB</p> |                                                                                                               |
| <b>NARKOTISKA ANALGETIKA</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Metadon/Tenofovirdisoproxil                 | Metadon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingen dosjustering av metadon krävs.                                                                          |

| Läkemedel uppdelade efter behandlingsområde | Påverkan på läke-medelskoncentrationer<br>Genomsnittlig procentuell förändring i AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub> med 90 %-igt konfidensintervall, om tillgängligt (mekanism) | Rekommendation avseende samtidig administrering med Truvada (emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproxil 245 mg) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | AUC: ↑ 5 % (↓ 2 till ↑ 13)<br>C <sub>max</sub> : ↑ 5 % (↓ 3 till ↑ 14)<br>C <sub>min</sub> : EB                                                                                       |                                                                                                               |

EB = ej beräknat.

N/A = not applicable (ej tillämpligt).

<sup>1</sup> Data genererade från samtidig dosering med ledipasvir/sofosbuvir. Administrering med 12 timmars mellanrum gav liknande resultat.

<sup>2</sup> Den dominerande cirkulerande metaboliten av sofosbuvir.

<sup>3</sup> Studien utfördes med ytterligare voxilaprevir 100 mg för att uppnå de exponeringar för voxilaprevir som förväntas för HCV-infekterade patienter.

## Graviditet

En stor mängd data från gravida kvinnor (mer än 1 000 graviditeter) tyder inte på några missbildningar eller foster/neonatal toxicitet associerad med emtricitabin och

tenofovirdisoproxil. Djurstudier med emtricitabin och tenofovirdisoproxil tyder inte på reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Användning av Truvada kan därför övervägas under graviditet om det är nödvändigt.

## **Amning**

Det har visats att emtricitabin och tenofovir utsöndras i bröstmjolk. Det finns otillräcklig information angående effekterna av emtricitabin och tenofovir på nyfödda/spädbarn. Truvada ska därför inte användas under amning.

För att undvika överföring av hiv till spädbarnet rekommenderas att kvinnor som lever med hiv inte ammar sina spädbarn.

## **Fertilitet**

Inga humandata om effekten av Truvada finns tillgängliga. Djurstudier tyder inte på skadliga effekter av emtricitabin eller tenofovirdisoproxil på fertiliteten.

## **Trafik**

Inga studier av effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Personer som får Truvada bör dock informeras om att yrsel har rapporterats under behandling både med emtricitabin och tenofovirdisoproxil.

## **Biverkningar**

### ***Sammanfattning av säkerhetsprofil***

*Hiv-1-Infektion:* De oftast rapporterade biverkningar med möjligt eller troligt samband med emtricitabin och/eller tenofovirdisoproxil var illamående (12 %) och diarré (7 %) i en öppen randomiserad

klinisk studie med vuxna (GS-01-934), se avsnitt Farmakodynamik. Säkerhetsprofilen för emtricitabin och tenofovirdisoproxil i denna studie överensstämde med tidigare erfarenheter av de enskilda innehållsämnenas när dessa var och ett för sig gavs med andra antiretrovirala medel.

*Profylax före exponering:* Inga nya biverkningar av Truvada identifierades i två randomiserade placebokontrollerade studier (iPrEx, Partners PrEP) där 2 830 vuxna som inte hade infekterats med hiv-1 fick Truvada en gång dagligen för profylax före exponering. Patienterna övervakades i median under 71 respektive 87 veckor. Den vanligaste biverkningen som rapporterades i Truvada-gruppen i iPrEx-studien var huvudvärk (1 %).

### ***Sammanfattning av biverkningar i tabellform***

Biverkningar med åtminstone möjligt samband med behandling med innehållsämnen i Truvada från kliniska studier och erfarenheten efter introduktion på marknaden hos hiv-1-infekterade patienter redovisas i tabell 3 nedan för varje organsystem och frekvens. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras som mycket vanliga ( $\geq 1/10$ ), vanliga ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ), mindre vanliga ( $\geq 1/1\,000$ ,  $< 1/100$ ) eller sällsynta ( $\geq 1/10\,000$ ,  $< 1/1\,000$ ).

Tabell 3: Sammanfattning i tabellform av biverkningar associerade med de enskilda innehållsämnen i Truvada baserad på kliniska studier och erfarenhet efter introduktion på marknaden

| Frekvens                        | Emtricitabin | Tenofovirdisoproxil |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <i>Blodet och lymfsystemet:</i> |              |                     |

| Frekvens                                   | Emtricitabin                                                                                         | Tenofovirdisoproxil                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vanliga:                                   | neutropeni                                                                                           |                                     |
| Mindre vanliga:                            | anemi <sup>2</sup>                                                                                   |                                     |
| <i>Immunsystemet:</i>                      |                                                                                                      |                                     |
| Vanliga:                                   | allergisk reaktion                                                                                   |                                     |
| <i>Metabolism och nutrition:</i>           |                                                                                                      |                                     |
| Mycket vanliga:                            |                                                                                                      | hypofosfatemi <sup>1</sup>          |
| Vanliga:                                   | hyperglykemi, hypertriglyceridemi                                                                    |                                     |
| Mindre vanliga:                            |                                                                                                      | hypokalemi <sup>1</sup>             |
| Sällsynta:                                 |                                                                                                      | laktacidosis                        |
| <i>Psykiska störningar:</i>                |                                                                                                      |                                     |
| Vanliga:                                   | insomni, onormala drömmar                                                                            |                                     |
| <i>Centrala och perifera nervsystemet:</i> |                                                                                                      |                                     |
| Mycket vanliga:                            | huvudvärk                                                                                            | yrsel                               |
| Vanliga:                                   | yrsel                                                                                                | huvudvärk                           |
| <i>Magtarmkanalen:</i>                     |                                                                                                      |                                     |
| Mycket vanliga:                            | diarré, illamående                                                                                   | diarré, kräkningar, illamående      |
| Vanliga:                                   | förhöjt amylas inklusive förhöjt pankreasamylas, förhöjt serumlipas, kräkningar, buksmärta, dyspepsi | buksmärta, uppsvälld buk, flatulens |
| Mindre vanliga:                            |                                                                                                      | pankreatit                          |
| <i>Lever och gallvägar:</i>                |                                                                                                      |                                     |

| Frekvens                                      | Emtricitabin                                                                                                                                                     | Tenofovirdisoproxil                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vanliga:                                      | förhöjt serumaspartatamino-transferas (ASAT) och/eller förhöjt serumalaninamino-transferas (ALAT), hyperbilirubinemi                                             | förhöjda transaminaser                                |
| Sällsynta:                                    |                                                                                                                                                                  | lever steatos <sup>2</sup> , hepatit                  |
| <i>Hud och subkutan vävnad:</i>               |                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Mycket vanliga:                               |                                                                                                                                                                  | hudutslag                                             |
| Vanliga:                                      | vesikulobullösa hudutslag, pustulösa hudutslag, makulopapulösa hudutslag, hudutslag, pruritus, urtikaria, missfärgning av huden (ökad pigmentering) <sup>2</sup> |                                                       |
| Mindre vanliga:                               | angioödem <sup>3</sup>                                                                                                                                           |                                                       |
| Sällsynta:                                    |                                                                                                                                                                  | angioödem                                             |
| <i>Muskuloskeletala systemet och bindväv:</i> |                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Mycket vanliga:                               | förhöjt kreatinkinas                                                                                                                                             |                                                       |
| Vanliga:                                      |                                                                                                                                                                  | minskad bentäthet                                     |
| Mindre vanliga:                               |                                                                                                                                                                  | rabdomyolys <sup>1</sup> , muskelsvaghet <sup>1</sup> |

| Frekvens                                                            | Emtricitabin   | Tenofovirdisoproxil                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sällsynta:                                                          |                | osteomalaci (manifesterad som skelettsmärta och som i sällsynta fall bidrar till frakturer) <sup>1,3</sup> , myopati <sup>1</sup>          |
| <i>Njurar och urinvägar:</i>                                        |                |                                                                                                                                            |
| Mindre vanliga:                                                     |                | förhöjt kreatinin, proteinuri, proximal renal tubulopati inklusive Fanconis syndrom                                                        |
| Sällsynta:                                                          |                | njursvikt (akut och kronisk), akut tubulär nekros, nefrit (inklusive akut interstitiell nefrit) <sup>3</sup> , nefrogen diabetes insipidus |
| <i>Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:</i> |                |                                                                                                                                            |
| Mycket vanliga:                                                     |                | asteni                                                                                                                                     |
| Vanliga:                                                            | smärta, asteni |                                                                                                                                            |

<sup>1</sup>Denna biverkning kan förekomma som en följd av proximal renal tubulopati: Den anses inte ha något orsakssamband med tenofovirdisoproxil i frånvaro av detta tillstånd.

<sup>2</sup>Anemi var vanligt och missfärgning av huden (ökad pigmentering) var mycket vanligt när emtricitabin gavs till pediatrika patienter.

<sup>3</sup>Denna biverkning identifierades genom säkerhetsuppföljning efter introduktionen på marknaden men observerades inte i randomiserade, kontrollerade kliniska studier med emtricitabin på vuxna eller pediatrika patienter med hiv eller i randomiserade kontrollerade kliniska studier med tenofovirdisoproxil eller programmet för utökad tillgång till tenofovirdisoproxil. Frekvenskategorin bedömdes utgående från en statistisk beräkning baserad på det totala antalet patienter som exponerats för emtricitabin i randomiserade kontrollerade kliniska studier (n = 1 563) eller tenofovirdisoproxil i randomiserade kontrollerade kliniska studier och programmet för utökad tillgång (n = 7 319).

### ***Beskrivning av valda biverkningar***

*Nedsatt njurfunktion:* Eftersom Truvada kan orsaka njurskada rekommenderas övervakning av njurfunktionen (se avsnitt Varningar och försiktighet). Proximal renal tubulopati läker ut eller förbättras efter utsättande av tenofovirdisoproxil. Hos vissa hiv-1-infekterade patienter gick emellertid inte sänkningar av kreatininclearance tillbaka helt trots utsättande av tenofovirdisoproxil. Patienter som löper risk för nedsatt njurfunktion (t.ex. patienter med renala riskfaktorer vid baslinjen, framskriden hiv sjukdom, eller patienter som samtidigt får nefrotoxiska läkemedel) löper ökad risk för ofullständig återhämtning av njurfunktionen trots utsättande av tenofovirdisoproxil (se avsnitt Varningar och försiktighet).

*Laktacidosis:* Fall av laktacidosis har rapporterats med enbart tenofovirdisoproxil eller i kombination med andra antiretrovirala läkemedel. Patienter med predisponerande faktorer, t.ex. patienter med dekompenenserad leversjukdom, eller patienter som samtidigt tar ett läkemedel som är känt att framkalla laktacidosis, löper större

risk att utveckla allvarlig laktacidosis, även med dödlig utgång, under behandling med tenofovirdisoproxil.

*Metabola parametrar:* Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet).

*Immunreaktiveringssyndrom:* Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av CART, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart (se avsnitt Varningar och försiktighet).

*Osteonekros:* Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden hiv-sjukdom eller långvarig exponering för CART. Frekvensen av detta är okänd (se avsnitt Varningar och försiktighet).

### ***Pediatrik population***

Bedömningen av emtricitabinrelaterade biverkningar baseras på erfarenhet från tre pediatrika studier (n = 169) där behandlingsnaiva (n = 123) och behandlingserfarna (n = 46) hiv-infekterade pediatrika patienter i åldern 4 månader till 18 år behandlades med emtricitabin i kombination med andra antiretrovirala läkemedel. Utöver de biverkningar som rapporterades för vuxna, uppträdde anemi (9,5 %) och hudmissfärgning oftare i kliniska studier med pediatrika patienter än i studier med vuxna (se avsnitt Biverkningar).

Bedömningen av tenofovirdisoproxilrelaterade biverkningar baseras på två randomiserade studier (studie GS-US-104-0321 och GS-US-104-0352) med 184 hiv-infekterade pediatrika patienter (i åldern 2 till < 18 år) som fick behandling med tenofovirdisoproxil (n = 93) eller placebo/aktivt jämförelsepreparat (n = 91) i kombination med andra retrovirala läkemedel under 48 veckor (se avsnitt Farmakodynamik). De biverkningar som observerades hos pediatrika patienter som fick behandling med tenofovirdisoproxil stämde överens med de som observerades i kliniska studier med tenofovirdisoproxil hos vuxna (se avsnitt Biverkningar och Farmakodynamik).

Minskningar av BMD har rapporterats hos pediatrika patienter. Hos hiv-1-infekterade ungdomar (i åldern 12 till < 18 år) var de Z-poäng för BMD som observerades hos försökspersoner som fick tenofovirdisoproxil lägre än de som observerades hos försökspersoner som fick placebo. Hos hiv-1-infekterade barn (i åldern 2 till 15 år) var de Z-poäng för BMD som observerades hos försökspersoner som gick över till tenofovirdisoproxil lägre än de som observerades hos försökspersoner som stod kvar på sin behandlingsregim innehållande stavudin eller zidovudin (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

I studien GS-US-104-0352 exponerades 89 hiv-1-infekterade pediatrika patienter med en medianålder på 7 år (intervall 2 till 15 år) för tenofovirdisoproxil under en mediantid på 331 veckor. Åtta av de 89 patienterna (9,0 %) avbröt behandlingen med studieläkemedlet på grund av njurbiverkningar. Fem patienter (5,6 %) uppvisade provresultat som kliniskt överensstämde med proximal renal tubulopati, varav fyra avbröt behandlingen med

tenofovirdisoproxil. Sju patienter hade en glomerulär filtrationshastighet (GFR) på mellan 70 och 90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>. Bland dem fick tre patienter en kliniskt betydande nedgång i uppskattad GFR under behandlingen, vilken förbättrades när behandlingen med tenofovirdisoproxil avbröts.

### ***Andra särskilda populationer***

*Personer med nedsatt njurfunktion:* Eftersom tenofovirdisoproxil kan orsaka njurtoxicitet rekommenderas noggrann övervakning av njurfunktionen hos alla vuxna med nedsatt njurfunktion som får Truvada (se avsnitt Dosering, Varningar och försiktighet och Farmakokinetik). Användning av Truvada rekommenderas inte till individer under 18 års ålder med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).

### *Patienter med samtidig hiv- och HBV- eller HCV-infektion:*

Biverkningsprofilen för emtricitabin och tenofovirdisoproxil hos ett begränsat antal hiv-infekterade patienter i studien GS-01-934 som samtidigt var infekterade med HBV (n = 13) eller HCV (n = 26) liknade den som har observerats hos hiv-infekterade patienter utan samtidig HBV/HCV-infektion. Som väntat i denna patientpopulation inträffade dock förhöjt ASAT och ALAT oftare än i den allmänna hiv-infekterade populationen.

*Exacerbationer av hepatit efter utsättande av behandling:* Hos patienter med HBV-infektion har kliniska och laboratoriemässiga tecken på hepatit uppträtt efter utsättande av behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet).

### *Rapportering av misstänkta biverkningar*

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se).

Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## Överdoser

Om överdosering inträffar måste man övervaka personen vad gäller tecken på toxicitet (se avsnitt Biverkningar) och tillämpa understödande standardbehandling efter behov.

Upp till 30 % av emtricitabindosen och cirka 10 % av tenofovirdosen kan elimineras med hemodialys. Det är inte känt om emtricitabin eller tenofovir kan elimineras med peritonealdialys.

## Farmakodynamik

### *Verkningsmekanism*

Emtricitabin är en nukleosidanalogue av cytidin. Tenofovirdisoproxil omvandlas *in vivo* till tenofovir, som är en nukleosidmonofosfat-(nukleotid)-analogue av adenosinmonofosfat. Både emtricitabin och tenofovir har aktivitet som är specifik för humant immunbristvirus (hiv-1 och hiv-2) och hepatit B-virus.

Emtricitabin och tenofovir är fosforylerade av cellulära enzymer för att bilda emtricitabintrifosfat respektive tenofovirdifosfat. Studier *in*

*vitro* har visat att både emtricitabin och tenofovir kan fosforyleras helt när de kombineras i celler. Emtricitabintrifosfat och tenofovirdifosfat hämmar hiv-1 omvänt transkriptas kompetitivt, vilket resulterar i DNA-kedjeavbrott.

Både emtricitabintrifosfat och tenofovirdifosfat är svaga hämmare av DNA-polymeraserna hos däggdjur och det förelåg inga tecken på mitokondrietoxicitet *in vitro* eller *in vivo*.

### *Antiviral aktivitet in vitro*

Synergistisk antiviral aktivitet observerades med kombinationen av emtricitabin och tenofovir *in vitro*. Additiva till synergistiska effekter observerades i kombinationsstudier med proteashämmare och med hämmare av hiv omvänt transkriptas (nukleosid- och icke-nukleosidanaloger).

### *Resistens*

*In vitro*: Resistens har observerats *in vitro* och hos vissa hiv-1-infekterade patienter till följd av att M184V/I-mutationen utvecklas med emtricitabin eller K65R-mutationen utvecklas med tenofovir. Emtricitabinresistent virus med M184V/I-mutationen var korsresistent mot lamivudin, men behöll känslighet för didanosin, stavudin, tenofovir och zidovudin. K65R-mutationen kan även selekteras av abakavir och didanosin och resulterar i reducerad känslighet för dessa medel samt lamivudin, emtricitabin och tenofovir. Tenofovirdisoproxil bör undvikas hos patienter med hiv-1 som har stammar med K65R-mutationen. Dessutom har en K70E-substitution i hiv-1 omvänt transkriptas selekterats av tenofovir vilket leder till en smärre reduktion av känsligheten för abakavir, emtricitabin, lamivudin och tenofovir. Hiv-1 som uttrycker tre eller flera tymidinanalog-associerade mutationer (TAMs) som

inkluderade antingen M41L eller L210W omvänd transkriptas mutation uppvisade nedsatt mottaglighet för behandlingen med tenofovirdisoproxil.

*In vivo – behandling av hiv-1:* I en öppen, randomiserad klinisk studie (GS-01-934) med patienter som inte behandlats med antiretrovirala medel tidigare, utfördes genotypning på plasma-hiv-1-isolat från alla patienter med bekräftad hiv-RNA > 400 kopior/ml vecka 48, 96 eller 144 eller vid den tidpunkt då behandlingen med försökläkemedlet utsatts i förtid. Från och med vecka 144:

- M184V/I-mutationen utvecklades i 2/19 (10,5 %) isolat analyserade från patienter i gruppen som fick emtricitabin/tenofovirdisoproxil/efavirenz och i 10/29 (34,5 %) isolat analyserade från gruppen som fick lamivudin/zidovudin/efavirenz (p-värde < 0,05, Fishers exakta test som jämförde emtricitabin-+tenofovirdisoproxil-gruppen med lamivudin/zidovudin-gruppen för alla patienter).
- Inga analyserade virus innehöll K65R- eller K70E-mutationen.
- Genotypisk resistens mot efavirenz, främst K103N-mutationen, utvecklades hos virus från 13/19 (68 %) patienter i gruppen som fick emtricitabin/tenofovirdisoproxil/efavirenz och hos virus från 21/29 (72 %) patienter i jämförelsegruppen.

*In vivo – profylax före exponering:* Plasmaprover från 2 kliniska studier av försökspersoner som inte hade infekterats med hiv-1, iPrEx och Partners PrEP, analyserades med avseende på 4 hiv-1-varianter som uttryckte aminosyrasubstitutioner (dvs. K65R, K70E, M184V och M184I) som potentiellt ger upphov till resistens mot tenofovir eller emtricitabin. I den kliniska studien iPrEx detekterades inte några hiv-1-varianter som uttryckte K65R, K70E, M184V eller M184I vid tiden för serokonvertering bland

försökspersoner som blev infekterade med hiv-1 efter rekrytering till studien. Hos 3 av 10 försökspersoner som hade akut hiv-1-infektion vid rekrytering till studien detekterades M184I- och M184V-mutationer i hiv hos 2 av 2 försökspersoner i Truvada-gruppen och 1 av 8 försökspersoner i placebogruppen.

I den kliniska studien Partners PrEP detekterades inte några hiv-1-varianter som uttryckte K65R, K70E, M184V eller M184I vid tidpunkten för serokonvertering bland försökspersoner som blev infekterade med hiv-1 under studiens gång. Hos 2 av 14 försökspersoner som hade akut hiv-infektion vid rekrytering till studien detekterades K65R-mutationen i hiv hos 1 av 5 försökspersoner i gruppen med tenofovirdisoproxil 245 mg och M184V-mutationen (associerad med resistens mot emtricitabin) detekterades i hiv hos 1 av 3 försökspersoner i Truvada-gruppen.

## **Kliniska uppgifter**

*Behandling av hiv-1-infektion:* I en öppen, randomiserad klinisk studie (GS-01-934) fick hiv 1-infekterade vuxna patienter som inte behandlats med antiretrovirala medel tidigare emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz givet en gång om dagen (n = 255) eller en fast kombination av lamivudin och zidovudin givet två gånger om dagen och efavirenz en gång om dagen (n = 254). Patienter i emtricitabin- och tenofovirdisoproxil-gruppen gavs Truvada och efavirenz från vecka 96 till vecka 144. Vid baslinjen hade de randomiserade grupperna likartat medianvärde för plasma-hiv-1-RNA (5,02 respektive 5,00 log<sub>10</sub> kopior/ml) och CD4-tal (233 respektive 241 celler/mm<sup>3</sup>). Det primära slutgiltiga effektmåttet för denna studie var uppnående och bibehållande av bekräftade hiv-1-RNA koncentrationer < 400 kopior/ml över 48 veckor. Sekundära effektanalyser över 144 veckor inkluderade den andel av

patienterna som hade hiv-1-RNA koncentrationer < 400 eller < 50 kopior/ml, och skillnad i CD4-talet från baslinjen.

Primära slutgiltiga data för 48 veckor visade att kombinationen emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz hade överlägsen antiviral effekt jämfört med den fasta kombinationen lamivudin och zidovudin med efavirenz, som framgår av tabell 4. Sekundära slutgiltiga data för 144 veckor visas också i tabell 4.

**Tabell 4: Effektdata för 48 och 144 veckor från studie GS-01-934 i vilken emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz gavs till hiv 1-infekterade patienter som inte behandlats med antiretrovirala medel tidigare**

|                                            | <b>GS-01-934<br/>Behandling i 48 veckor</b>                     |                                       | <b>GS-01-934<br/>Behandling i 144 veckor</b>                     |                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                            | Emtricitabin<br>+<br>tenofovirdiso<br>-<br>proxil+<br>efavirenz | Lamivudin+<br>zidovudin+<br>efavirenz | Emtricitabin<br>+<br>tenofovirdiso<br>-<br>proxil<br>+efavirenz* | Lamivudin+<br>zidovudin+<br>efavirenz |
| Hiv-1-RNA <<br>400<br>kopior/ml<br>(TLOVR) | 84 %<br>(206/244)                                               | 73 %<br>(177/243)                     | 71 %<br>(161/227)                                                | 58 %<br>(133/229)                     |
| p-värde                                    | 0,002**                                                         |                                       | 0,004**                                                          |                                       |
| % skillnad<br>(95 %CI)                     | 11 % (4 % till 19 %)                                            |                                       | 13 % (4 % till 22 %)                                             |                                       |

|                                                                           | <b>GS-01-934</b><br><b>Behandling i 48 veckor</b> |                   | <b>GS-01-934</b><br><b>Behandling i 144 veckor</b> |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Hiv-1-RNA < 50 kopior/ml (TLOVR)                                          | 80 %<br>(194/244)                                 | 70 %<br>(171/243) | 64 %<br>(146/227)                                  | 56 %<br>(130/231) |
| p-värde                                                                   | 0,021**                                           |                   | 0,082**                                            |                   |
| % skillnad (95 %CI)                                                       | 9 % (2 % till 17 %)                               |                   | 8 % (-1 % till 17 %)                               |                   |
| Genomsnittlig skillnad i CD4-tal från baslinjen (celler/mm <sup>3</sup> ) | +190                                              | +158              | +312                                               | +271              |
| p-värde                                                                   | 0,002 <sup>a</sup>                                |                   | 0,089 <sup>a</sup>                                 |                   |
| Skillnad (95 %CI)                                                         | 32 (9 till 55)                                    |                   | 41 (4 till 79)                                     |                   |

\* Patienter som fick emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz gavs Truvada plus efavirenz från vecka 96 till 144.

\*\* P-värdet är baserat på Cochran-Mantel-Haenszel-test stratifierat för CD4-talet vid baslinjen

TLOVR = Time to Loss of Virological Response (tid till förlust av virologiskt svar)

a: Van Elteren-test

I en randomiserad klinisk studie (M02-418) behandlades också 190 vuxna som tidigare inte fått antiretroviral terapi en gång om dagen med emtricitabin och tenofovirdisoproxil i kombination med lopinavir/ritonavir en eller två gånger om dagen. I vecka 48 uppvisade 70 % respektive 64 % av patienterna hiv-1-RNA < 50

kopior/ml efter behandlingarna med lopinavir/ritonavir en respektive två gånger om dagen. Den genomsnittliga skillnaden i CD4-tal från baslinjen var +185 celler/mm<sup>3</sup> och +196 celler/mm<sup>3</sup> efter behandlingarna med lopinavir/ritonavir en respektive två gånger om dagen.

Begränsad klinisk erfarenhet av patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion tyder på att emtricitabin eller tenofoviridisoproxil i antiretroviral kombinationsterapi för att behandla hiv-infektionen resulterar i en reduktion av HBV-DNA (3 log<sub>10</sub>-reduktion respektive 4-5 log<sub>10</sub>-reduktion) (se avsnitt Varningar och försiktighet).

*Profylax före exponering:* Den kliniska studien iPrEx (CO-US-104-0288) utvärderade Truvada eller placebo hos 2 499 män (eller transgenderkvinnor) som inte hade infekterats av hiv som har sex med män och som ansågs löpa stor risk för hiv-infektion. Försökspersonerna övervakades under 4 237 personår. Egenskaperna vid baslinjen sammanfattas i tabell 5.

**Tabell 5: Studiepopulation från studien CO-US-104-0288 (iPrEx)**

|                               | <b>Placebo<br/>(n = 1 248)</b> | <b>Truvada<br/>(n = 1 251)</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ålder (år), medel (SD)</b> | 27 (8,5)                       | 27 (8,6)                       |
| <b>Ras, N (%)</b>             |                                |                                |
| Svart/afrikansk<br>amerikan   | 97 (8)                         | 117 (9)                        |
| Vit                           | 208 (17)                       | 223 (18)                       |
| Blandad/övrigt                | 878 (70)                       | 849 (68)                       |
| Asiatisk                      | 65 (5)                         | 62 (5)                         |

|                                                                        |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Spanskättad/latinoetnicitet, N (%)</b>                              | 906 (73)       | 900 (72)       |
| <b>Sexuella riskfaktorer vid screening</b>                             |                |                |
| Antal partner föregående 12 veckor, medel (SD)                         | 18 (43)        | 18 (35)        |
| URAI föregående 12 veckor, N (%)                                       | 753 (60)       | 732 (59)       |
| URAI med partner hiv+ (eller okänd status) föregående 6 månader, N (%) | 1 009 (81)     | 992 (79)       |
| Deltog i transaktionssex senaste 6 månaderna, N (%)                    | 510 (41)       | 517 (41)       |
| Känd partner hiv+ senaste 6 månaderna, N (%)                           | 32 (3)         | 23 (2)         |
| Syfilisseroreaktivitet, N (%)                                          | 162/1 239 (13) | 164/1 240 (13) |
| Serumherpes simplex virus typ 2-infektion, N (%)                       | 430/1 243 (35) | 458/1 241 (37) |
| Urinleukocytesteras-positiv, N (%)                                     | 22 (2)         | 23 (2)         |

URAI = unprotected receptive anal intercourse (oskyddat mottagande analsamlag)

Förekomsten av hiv-serokonvertering, över lag och i delgruppen, där oskyddat mottagande vid analt samlag rapporterades visas i tabell 6. Effekten var starkt korrelerad med följsamhet som bedöms genom detektering av läkemedelsnivåer i plasma eller intracellulärt i en fallkontrollstudie (tabell 7).

**Tabell 6: Effekt i studien CO-US-104-0288 (iPrEx)**

|                                                 | Placebo           | Truvada  | P-värde <sup>a, b</sup> |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| mITT-analys                                     |                   |          |                         |
| Serokonverteringar/N                            | 83/1 217          | 48/1 224 | 0,002                   |
| Relativ riskreducering (95 % CI) <sup>b</sup>   | 42 % (18 %, 60 %) |          |                         |
| URAI inom 12 veckor före screening, mITT-analys |                   |          |                         |
| Serokonverteringar/N                            | 72/753            | 34/732   | 0,0349                  |
| Relativ riskreducering (95 % CI) <sup>b</sup>   | 52 % (28 %, 68 %) |          |                         |

<sup>a</sup> P-värden enligt logranktest. P-värden för URAI avser nollhypotesen att effekt skiljde sig mellan delgruppsstrata (URAI, ej URAI).

<sup>b</sup> Relativ riskreducering beräknad för mITT baserat på incident serokonvertering, dvs. som inträffar efter baslinjen t.o.m. första besöket efter studiens avslut (cirka 1 månad efter sista dispenseringen av studieläkemedlet).

**Tabell 7: Effekt och följsamhet i studien CO-US-104-0288 (iPrEx, matchad fall-kontrollanalys)**

| Kohort                                        | Läkemedel detekterat | Läkemedel ej detekterat | Relativ riskreducering (2-sidigt 95 % CI)<br>a |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Hiv-positiva försökspersoner                  | 4 (8 %)              | 44 (92 %)               | 94 % (78 %, 99 %)                              |
| Hiv-negativa matchade kontrollförsökspersoner | 63 (44 %)            | 81 (56 %)               | —                                              |

<sup>a</sup> Relativ riskreducering beräknad på incidens (efter baslinjen) av serokonvertering från den dubbelblinda behandlingsperioden t.o.m. 8-veckorsuppföljningsperioden. Endast prover från försökspersoner som randomiserats till Truvada utvärderades med avseende på detekterbara nivåer av tenofovirdisoproxil-DP i plasma eller intracellulärt.

Den kliniska studien Partners PrEP (CO-US-104-0380) utvärderade Truvada, tenofovirdisoproxil 245 mg eller placebo hos 4 758 försökspersoner som var serodiskordanta, heterosexuella par från Kenya eller Uganda som inte hade infekterats av hiv. Försökspersonerna följdes under 7 830 personår. Egenskaperna vid baslinjen sammanfattas i tabell 8.

**Tabell 8: Studiepopulation från studien CO-US-104-0380 (Partners PrEP)**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                                                                | <b>Placebo<br/>(n = 1 584)</b> | <b>Tenofovir-disopr<br/>oxil 245 mg<br/>(n = 1 584)</b> | <b>Truvada<br/>(n = 1 579)</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ålder (år),<br/>median (Q1, Q3)</b>                         | 34 (28, 40)                    | 33 (28, 39)                                             | 33 (28, 40)                    |
| <b>Kön, N (%)</b>                                              |                                |                                                         |                                |
| Man                                                            | 963 (61)                       | 986 (62)                                                | 1 013 (64)                     |
| Kvinna                                                         | 621 (39)                       | 598 (38)                                                | 566 (36)                       |
| <b>Nyckelegenskaper hos paren, N (%) eller median (Q1, Q3)</b> |                                |                                                         |                                |
| Gift med<br>studiepartner                                      | 1 552 (98)                     | 1 543 (97)                                              | 1 540 (98)                     |
| År samlevnad<br>med<br>studiepartner                           | 7,1 (3,0, 14,0)                | 7,0 (3,0, 13,5)                                         | 7,1 (3,0, 14,0)                |
| År medveten<br>om<br>studiepartners<br>hivstatus               | 0,4 (0,1, 2,0)                 | 0,5 (0,1, 2,0)                                          | 0,4 (0,1, 2,0)                 |

Förekomsten av hiv-serokonvertering visas i tabell 9. Andelen hiv-1-serokonvertering hos män var 0,24/100 personår av exponering för Truvada och andelen hiv-1-serokonvertering hos kvinnor var 0,95/100 personår av exponering för Truvada. Effekten var starkt korrelerad med följsamhet vilket bedömdes genom detektering av läkemedelsnivåer i plasma eller intracellulärt. Effekten var högre bland deltagare i delgrupper som fick aktiv rådgivning om följsamhet och som visas i tabell 10.

**Tabell 9: Effekt i studie CO-US-104-0380 (Partners PrEP)**

|  | <b>Placebo</b> |  | <b>Truvada</b> |
|--|----------------|--|----------------|
|--|----------------|--|----------------|

|                                         |                   |                                    |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                         |                   | <b>Tenofovir-disoproxil 245 mg</b> |                   |
| <b>Serokonverteringar/N<sup>a</sup></b> | 52/1 578          | 17/1 579                           | 13/1 576          |
| Förekomst per 100 personår (95 % CI)    | 1,99 (1,49, 2,62) | 0,65 (0,38, 1,05)                  | 0,50 (0,27, 0,85) |
| Relativ riskreducering (95 % CI)        | —                 | 67 % (44 %, 81 %)                  | 75 % (55 %, 87 %) |

<sup>a</sup> Relativ riskreducering beräknad för mITT-kohort baserat på incidens av (efter baslinjen) serokonvertering. Jämförelser för aktiva studiegrupper är gjorda jämfört med placebo.

**Tabell 10: Effekt och följsamhet i studie CO-US-104-0380 (Partners PrEP)**

| Kvantifiering av studieläkemedel | Antal med tenofovir detekterat/Totala prover (%) |        | Riskuppskattning för hiv-1-skydd: Detektion jämfört med ej detektion av tenofovir |         |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                  |                                                  |        |                                                                                   |         |  |
|                                  | Fall                                             | Kohort | Relativ riskreducering (95 % CI)                                                  | p-värde |  |

| Kvantifiering av studieläkemedel            | Antal med tenofovir detekterat/Totala prover (%) |                                     | Riskuppskattning för hiv-1-skydd: Detektion jämfört med ej detektion av tenofovir |         |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                             |                                                  |                                     |                                                                                   |         |  |
| FTC/tenofovir disoproxil-grupp <sup>a</sup> | 3/12 (25 %)                                      | 375/465 (81 %)                      | 90 % (56 %, 98 %)                                                                 | 0,002   |  |
| Tenofovir disoproxil-grupp <sup>a</sup>     | 6/17 (35 %)                                      | 363/437 (83 %)                      | 86 % (67 %, 95 %)                                                                 | < 0,001 |  |
| Följsamhet delstudie                        | Följsamhet delstudiedeltagare <sup>b</sup>       |                                     | Relativ riskreducering (95 % CI)                                                  | p-värde |  |
|                                             | Placebo                                          | Tenofovir disoproxil 245 mg+Truvada |                                                                                   |         |  |
| Serokonverteringar/<br>N <sup>b</sup>       | 14/404 (3,5 %)                                   | 0/745 (0 %)                         | 100 % (87 %, 100 %)                                                               | < 0,001 |  |

<sup>a</sup> "Fall" = hiv-serokonverterare; "Kohort" = 100 slumpmässigt valda försökspersoner från respektive grupp med tenofovirdisoproxil 245 mg och Truvada. Endast prover från Fall och Kohort från försökspersoner randomiserade antingen till tenofovirdisoproxil 245 mg eller Truvada utvärderades med avseende på detekterbara nivåer på tenofovir i plasma.

<sup>b</sup> Delstudiedeltagare fick aktiv följsamhetsövervakning, dvs. ej anmälda hembesök och tableträkning samt rådgivning för att förbättra följsamhet med studieläkemedlet.

### *Pediatrisk population*

Säkerhet och effekt för Truvada hos barn under 12 års ålder har ännu inte fastställts.

### *Behandling av hiv-1-infektion i den pediatrika populationen*

Inga kliniska studier har utförts med Truvada i den pediatrika populationen med hiv-1-infektion.

Den kliniska effekten och säkerheten med Truvada har fastställts genom studier som utförts med emtricitabin och tenofovirdisoproxil där dessa läkemedel gavs separat.

### *Studier med emtricitabin*

Hos spädbarn och barn äldre än 4 månader uppnådde eller bibehöll majoriteten av patienterna som tog emtricitabin en fullständig suppression av plasma-hiv-1-RNA under 48 veckor (89 % uppnådde  $\leq 400$  kopior/ml och 77 % uppnådde  $\leq 50$  kopior/ml).

### *Studier med tenofovirdisoproxil*

I studien GS-US-104-0321 behandlades 87 hiv-1-infekterade behandlingserfarna patienter i åldern 12 till < 18 år med tenofovirdisoproxil (n = 45) eller placebo (n = 42) i kombination med en optimerad bakgrundsregim i 48 veckor. På grund av begränsningarna med studien påvisades inte nytta av behandlingen med tenofovirdisoproxil vara större än nytta med placebo, baserat på halterna av plasma-hiv-1-RNA vecka 24. Däremot förväntas en nytta av behandlingen för ungdomar, baserat på extrapolering av data från vuxna och jämförande farmakokinetiska data (se avsnitt Farmakokinetik).

Hos patienter som fick behandling med tenofovirdisoproxil eller placebo var den genomsnittliga Z-poängen för BMD i ländryggen -1,004 resp. -0,809 och den genomsnittliga Z-poängen för BMD i hela kroppen -0,866 resp. -0,584 vid baslinjen. De genomsnittliga förändringarna i Z-poäng för BMD i ländryggen var vid vecka 48 (slutet av den dubbeblinda fasen) -0,215 och -0,165 och Z-poängen för BMD i hela kroppen var -0,254 och -0,179, för gruppen med tenofovirdisoproxil respektive gruppen med placebo. Den genomsnittliga andelen ökad BMD var lägre i gruppen med tenofovirdisoproxil jämfört med gruppen med placebo. Vid vecka 48 uppvisade sex ungdomar i gruppen med tenofovirdisoproxil och en ungdom i gruppen med placebo en signifikant förlust av BMD i ländryggen (definierat som > 4 % förlust). Bland 28 patienter som fick 96 veckors behandling med tenofovirdisoproxil sjönk Z-poängen för BMD med -0,341 för ländryggen och -0,458 för hela kroppen.

I studien GS-US-104-0352 randomiserades 97 behandlingserfarna patienter i åldern 2 till < 12 år med stabil, virologisk suppression på behandlingsregimer innehållande stavudin eller zidovudin till att

ersätta antingen stavudin eller zidovudin med tenofovirdisoproxil (n = 48) eller fortsätta med sin ursprungliga behandlingsregim (n = 49) i 48 veckor. Vid vecka 48 hade 83 % av patienterna i gruppen med tenofovirdisoproxilbehandling och 92 % av patienterna i gruppen med stavudin- eller zidovudinbehandling en hiv-1-RNA-koncentration på < 400 kopior/ml. Skillnaden i andelen patienter som bibehöll < 400 kopior/ml vid vecka 48 påverkades huvudsakligen av det högre antalet patienter som avbröt sitt deltagande i studien i gruppen med tenofovirdisoproxilbehandling. När saknade uppgifter exkluderades hade 91 % av patienterna i gruppen med tenofovirdisoproxilbehandling och 94 % av patienterna i gruppen med stavudin- eller zidovudinbehandling en hiv-1-RNA-koncentration på < 400 kopior/ml vid vecka 48.

Minskningar i BMD har rapporterats hos pediatrika patienter. Hos patienterna som fick behandling med tenofovirdisoproxil eller stavudin eller zidovudin var den genomsnittliga Z-poängen för BMD i ländryggen -1,034 resp. -0,498 och den genomsnittliga Z-poängen för BMD i hela kroppen var -0,471 resp. -0,386, vid baslinjen. De genomsnittliga förändringarna vid vecka 48 (slutet på den randomiserade fasen) för gruppen med tenofovirdisoproxil respektive gruppen med stavudin eller zidovudin, var -0,032 och -0,087 i Z-poäng för BMD i ländryggen samt -0,184 och -0,027 i Z-poäng för hela kroppen. Den genomsnittliga andelen ökad benmassa i ländryggen vid vecka 48 i gruppen med tenofovirdisoproxilbehandling liknade den i gruppen med stavudin- eller zidovudinbehandling. Ökningen av benmassa i hela kroppen var lägre i gruppen med tenofovirdisoproxilbehandling jämfört med gruppen med stavudin- eller zidovudinbehandling. En försöksperson som behandlades med tenofovirdisoproxil men ingen försöksperson som behandlades med stavudin eller zidovudin fick

en signifikant (> 4 %) förlust av BMD i ländryggen vid vecka 48. Z-poängen för BMD sjönk med -0,012 i ländryggen och med -0,338 i hela kroppen hos de 64 försökspersoner som behandlades med tenofovirdisoproxil i 96 veckor. Z-poängen för BMD var inte justerade för längd och vikt.

I studien GS-US-104-0352 avbröt 8 av 89 pediatrika patienter (9,0 %) som exponerades för tenofovirdisoproxil behandlingen med studieläkemedlet på grund av njurbiverkningar. Fem patienter (5,6 %) uppvisade provresultat som kliniskt överensstämde med proximal renal tubulopati, varav fyra avbröt behandlingen med tenofovirdisoproxil (medianexponering för tenofovirdisoproxil 331 veckor).

### *Profylax före exponering i den pediatrika populationen*

Effekt och säkerhet för Truvada vid användning som profylax före exponering hos ungdomar som har följsamhet för daglig dosering förväntas vara liknande de som gäller för vuxna vid samma grad av följsamhet. De potentiella effekterna på njurar och benvävnad vid långtidsanvändning av Truvada som profylax före exponering hos ungdomar är ovissa (se avsnitt Varningar och försiktighet).

## **Farmakokinetik**

### *Absorption*

Bioekvivalens mellan en Truvada filmdragerad tablett och en emtricitabin 200 mg hård kapsel och en tenofovirdisoproxil 245 mg filmdragerad tablett fastställdes efter administrering av en engångsdos till fastande friska försökspersoner. Efter oral administrering av Truvada till friska försökspersoner absorberas emtricitabin och tenofovirdisoproxil snabbt och tenofovirdisoproxil

omvandlas till tenofovir. Maximala emtricitabin- och tenofovirkoncentrationer har observerats i serum inom 0,5–3,0 timmar efter intag på fastande mage. Administrering av Truvada tillsammans med en fettrik eller en lätt måltid fördröjde tidpunkten för maximala tenofovirkoncentrationer med cirka 45 minuter och ökade tenofovirs AUC och  $C_{\max}$  med cirka 35% respektive 15%, jämfört med vid administrering på fastande mage. För att optimera absorptionen av tenofovir bör Truvada helst tas tillsammans med föda.

### *Distribution*

Efter intravenös administrering beräknades distributionsvolymen för emtricitabin och tenofovir till cirka 1,4 l/kg respektive 800 ml/kg. Efter oral administrering av emtricitabin eller tenofovirdisoproxil distribueras emtricitabin och tenofovir i stor utsträckning till hela kroppen. Bindningen av emtricitabin till humana plasmaproteiner *in vitro* var <4 % och oberoende av koncentrationen i ett område mellan 0,02 och 200 µg/ml. Tenofovirs proteinbindning *in vitro* var mindre än 0,7 och 7,2% till plasma- respektive serumprotein vid en tenofovirkoncentration mellan 0,01 och 25 µg/ml.

### *Metabolism*

Emtricitabins metabolism är begränsad. Metabolismen av emtricitabin inkluderar oxidation av tioldelen för att bilda 3'-sulfoxiddiastereomerer (cirka 9% av dosen) och konjugation med glukuronsyra för att bilda 2'-O-glukuronid (cirka 4% av dos en). *In vitro*-studier har visat att varken tenofovirdisoproxil eller tenofovir är substrat för CYP450-enzymerna. Varken emtricitabin eller tenofovir hämmade läkemedelsmetabolismen *in vitro*, förmedlad av någon av de viktigaste humana CYP450-isoformer

som är involverade i läkemedelsmetabolismen. Emtricitabin hämmade inte heller uridin-5'-difosfoglukuronyltransferas, det enzym som är ansvarigt för glukuronidering.

### *Eliminering*

Emtricitabin utsöndras huvudsakligen via njurarna och den givna dosen återfinns fullständigt i urin (cirka 86%) och faeces (cirka 14%). Tretton procent av emtricitabindosen återfanns i urinen som tre metaboliter. Systemiskt clearance av emtricitabin var i medeltal 307 ml/min. Efter oral administrering är halveringstiden för eliminationen av emtricitabin cirka 10 timmar.

Tenofovir utsöndras huvudsakligen via njurarna både via filtration och ett aktivt tubulärt transportsystem med cirka 70–80% av dosen utsöndrad oförändrad i urinen efter intravenös administrering. Skenbart clearance var i medeltal cirka 307 ml/min. Njurclearance har uppskattats till cirka 210 ml/min, vilket är högre än den glomerulära filtrationshastigheten. Detta indikerar att aktiv tubulär sekretion är en viktig del i eliminationen av tenofovir. Efter oral administrering är halveringstiden för eliminationen av tenofovir cirka 12–18 timmar.

### *Äldre*

Farmakokinetiska studier med emtricitabin eller tenofovir (administrerat som tenofovirdisoproxil) har inte utförts på äldre (över 65 år).

### *Kön*

Farmakokinetiken av emtricitabin och tenofovir är ungefär densamma hos manliga och kvinnliga patienter.

### *Etnicitet*

Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i farmakokinetik för emtricitabin har observerats med avseende på etnicitet. Farmakokinetiken för tenofovir (administrerat som tenofovirdisoproxil) har inte särskilt studerats hos olika etniska grupper.

### *Pediatrik population*

Farmakokinetiska studier med Truvada har inte utförts på barn och ungdomar (under 18 år).

Steady-state-farmakokinetiken för tenofovir utvärderades hos 8 hiv-1-infekterade ungdomspatienter (i åldrarna 12 till < 18 år) med kroppsvikt  $\geq 35$  kg och hos 23 hiv-1-infekterade barn i åldrarna 2 till < 12 år. Den tenofovirexponering som uppnåddes hos dessa pediatrika patienter som fick dagliga orala doser med tenofovirdisoproxil 245 mg eller 6,5 mg/kg kroppsvikt tenofovirdisoproxil upp till en maximal dos på 245 mg liknade exponeringar som uppnåddes hos vuxna som fick doser en gång dagligen med tenofovirdisoproxil 245 mg. Inga farmakokinetiska studier har utförts med tenofovirdisoproxil hos barn under 2 år. Farmakokinetiken av emtricitabin hos spädbarn, barn och ungdomar (från 4 månader upp till 18 år) liknade i allmänhet den som observerats hos vuxna.

Farmakokinetiken hos emtricitabin och tenofovir (administrerade som tenofovirdisoproxil) förväntas vara liknande för hiv-1-infekterade och icke-infekterade ungdomar, baserat på liknande exponeringar av emtricitabin och tenofovir hos hiv-1-infekterade ungdomar och vuxna, och liknande exponeringar av emtricitabin och tenofovir hos hiv-1-infekterade och icke-infekterade vuxna.

### *Nedsatt njurfunktion*

Begränsade farmakokinetiska data finns tillgängliga för emtricitabin och tenofovir efter samtidig administrering av de separata beredningarna eller som Truvada hos patienter med nedsatt njurfunktion. Farmakokinetiska parametrar bestämdes huvudsakligen efter administrering av engångsdoser emtricitabin 200 mg eller tenofovirdisoproxil 245 mg till icke-hiv-infekterade försökspersoner med olika grader av nedsatt njurfunktion. Graden av nedsatt njurfunktion definierades enligt kreatininclearance (CrCl) vid studiestart (normal njurfunktion när CrCl > 80 ml/min; lätt nedsatt njurfunktion med CrCl = 50-79 ml/min; måttligt nedsatt njurfunktion med CrCl = 30-49 ml/min och svårt nedsatt njurfunktion med CrCl = 10-29 ml/min).

Jämfört med försökspersoner med normal njurfunktion ökade den genomsnittliga exponeringen för emtricitabin (% CV) från 12 (25 %) µg•timme/ml till 20 (6 %) µg•timme/ml, 25 (23 %) µg•timme/ml respektive 34 (6 %) µg•timme/ml hos försökspersoner med lätt, måttligt och svårt nedsatt njurfunktion. Jämfört med patienter med normal njurfunktion ökade den genomsnittliga exponeringen för tenofovir (% CV) från 2 185 (12 %) ng•timme/ml till 3 064 (30 %) ng•timme/ml, 6 009 (42 %) ng•timme/ml respektive 15 985 (45 %) ng•timme/ml hos försökspersoner med lätt, måttligt och svårt nedsatt njurfunktion.

Hos hiv-1-infekterade patienter med måttligt nedsatt njurfunktion förväntas det ökade dosintervallet för Truvada resultera i högre maximala plasmakoncentrationer och lägre  $C_{min}$ -nivåer än hos patienter med normal njurfunktion. Den kliniska betydelsen av detta är okänd. Hos försökspersoner med terminal njurinsufficiens (*End Stage Renal Disease, ESRD*) i behov av hemodialys ökade

läkemedelsexponeringarna mellan dialysbehandlingarna avsevärt under 72 timmar till 53 (19 %)  $\mu\text{g}\cdot\text{timme}/\text{ml}$  för emtricitabin och under 48 timmar till 42 857 (29 %)  $\text{ng}\cdot\text{timme}/\text{ml}$  för tenofovir.

En liten klinisk studie utfördes för att utvärdera säkerheten, den antivirala aktiviteten och farmakokinetiken för tenofovirdisoproxil i kombination med emtricitabin hos hivinfekterade patienter med nedsatt njurfunktion. En delgrupp med patienter med kreatininclearance mellan 50 och 60 ml/min vid studiestart, som fick en dos om dagen, hade 2–4 gånger så hög exponering för tenofovir och försämrad njurfunktion.

Farmakokinetiken för emtricitabin och tenofovir (administrerade som tenofovirdisoproxil) hos pediatrika patienter med nedsatt njurfunktion har inte studerats. Det finns inga uppgifter tillgängliga för att ge dosrekommendationer (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).

### *Nedsatt leverfunktion*

Truvadas farmakokinetik har inte studerats hos försökspersoner med nedsatt leverfunktion.

Emtricitabins farmakokinetik har inte studerats hos icke HBV-infekterade individer med olika grader av leverinsufficiens. I allmänhet liknade emtricitabins farmakokinetik hos HBV-infekterade individer den hos friska och hos hiv-infekterade individer.

En engångsdos av 245 mg tenofovirdisoproxil har givits till icke-hiv-infekterade försökspersoner med olika grader av nedsatt leverfunktion, definierad enligt Child-Pugh-Turcotte-skalan (CPT).

Tenofovirs farmakokinetik ändrades inte väsentligt hos patienter med nedsatt leverfunktion, vilket tyder på att ingen dosjustering krävs hos dessa patienter. Medelvärde (% CV) för tenofovirs  $C_{\max}$  och  $AUC_{0-\infty}$  var 223 (34,8%) ng/ml respektive 2 050 (50,8%) ng·timme/ml hos patienter med normal leverfunktion, jämfört med 289 (46,0%) ng/ml respektive 2 310 (43,5%) ng·timme/ml hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion och 305 (24,8%) ng/ml respektive 2 740 (44,0%) ng·timme/ml hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

## Prekliniska uppgifter

*Emtricitabin:* Gångse studier avseende emtricitabins säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

*Tenofovirdisoproxil:* Gångse studier avseende tenofovirdisoproxil säkerhetsfarmakologi visade inte några särskilda risker för människa. Effekter sågs i studier avseende allmäntoxicitet hos råttor, hundar och apor vid exponeringar större än eller lika stora som klinisk exponering, inkluderar toxisk påverkan på njurar och skelett och en sänkning av fosfathalten i serum. Dessa effekter bedöms vara möjliga vid klinisk användning. Toxisk påverkan på skelettet diagnostiserades som osteomalaci (apor) och minskad BMD (råttor och hundar). Toxisk påverkan på skelettet hos unga vuxna råttor och hundar uppträdde vid exponeringar  $\geq 5$  gånger exponeringen hos pediatrika eller vuxna patienter; toxisk påverkan på skelettet uppträdde hos juvenila infekterade apor vid mycket höga exponeringar efter subkutan administrering ( $\geq 40$  gånger exponeringen hos patienter). Fynden i studier på råttor och apa visade att det fanns en substansrelaterad minskning i

tarmabsorption av fosfat med potentiell sekundär reduktion av BMD.

Gentoxicitetsstudier visade positiva resultat i muslymfomanalysen *in vitro*, tvetydiga resultat i en av de stammar som användes i Ames test och svagt positiva resultat i en UDS-test (*unscheduled DNA synthesis test*) på primära hepatocyter från råtta. Det var emellertid negativt i ett mikrokärntest på musbenmärg *in vivo*.

Orala karcinogenicitetsstudier på råtta och mus visade endast en låg förekomst av duodenala tumörer vid en extremt hög dos i mus. Dessa tumörer torde inte vara relevanta för människa.

Reproduktionstoxicitetsstudier på råttor och kaniner visade inga effekter på parnings-, fertilitets-, dräktighets- eller fosterparametrar. Tenofovirdisoproxil reducerade emellertid viabilitet och vikt hos avkomma i en peri- och postnatal toxicitetsstudie vid maternellt toxiska doser.

*Kombinationen av emtricitabin och tenofovirdisoproxil:* Studier med en kombination av dessa två komponenter visade ingen exacerbation av toxikologiska effekter, i gentoxicitets- eller allmäntoxicitetsstudier på minst en månad, jämfört med studier med de enskilda komponenterna.

## Innehåll

### Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En filmdragerad tablett innehåller 200 mg emtricitabin och 245 mg tenofovirdisoproxil (motsvarande 300 mg tenofovirdisoproxilfumarat eller 136 mg tenofovir).

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 91 mg laktos (som monohydrat).

### **Förteckning över hjälpämnen**

#### *Tablettkärna:*

Kroskarmellosnatrium (E468)

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat (E572)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Pregelatiniserad stärkelse (glutenfri)

#### *Filmdragering:*

Glyceroltriacetat (E1518)

Hypromellos (E464)

Indigokarmin (E132)

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E171)

### **Hållbarhet, förvaring och hantering**

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tillslut burken väl.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

### **Förpackningsinformation**

*Filmdragerad tablett 200 mg/245 mg* Blå kapselformade, filmdragerade tabletter med dimensionerna 19 mm x 8,5 mm, präglade på ena sidan med "GILEAD" och på andra sidan med "701".

30 tablett(er) burk (fri prissättning), EF

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:  
Filmdragerad tablett 200 mg/245 mg