

## Terramycin<sup>®</sup> vet.

R<sub>x</sub>

**Zoetis Animal Health**

Intrauterin tablett 500 mg

(Tillhandahålls ej)

### **Djurslag:**

Får

Nötkreatur

Svin

### **Aktiv substans:**

Oxitetrazyklin (vattenfri)

### **ATC-kod:**

QG01AA07

**FASS VET-text:** *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på produktresumé: 2022-06-01*

## **Innehåll**

Varje tablett innehåller: Oxytetracyklin hydroklorid 510 mg motsvarande oxytetracyklin 500 mg. Hjälppämnen: Natriummetabisulfit, vinsyra, ceftrimid, natriumbikarbonat, polyvidon, magnesiumstearat, talk, mannitol och renat vatten.

## **Egenskaper**

Den verksamma substansen oxitetracyklin är bakteriostatisk och hämmar proteinsyntesen hos känsliga mikroorganismer.

Korsresistens föreligger mellan tetracykliner och samtliga tetracyklinderivat. Tetracyklin har stor benägenhet att selektera fram gramnegativa tarmbakterier med R-faktoröverförd multipelresistens.

Antimikrobiellt spektrum:

Aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa bakterier, Mycoplasma, Rickettsia och Chlamydia.

Terramycin vet. uteritorier är skumbildande och sönderfaller vanligen inom 10-15 minuter, varigenom risken för utstötning minskas. Oxitetracyklin resorberas och kan påvisas i plasma och mjölk i ca 24 timmar. Vid intrauterin behandling med 2 tabletter (1,0 g oxitetracyklin) når man en koncentration i mjölk från friska djur av 0,3-1,2 mikrogram oxitetracyklin/ml. Oxitetracyklin utsöndras i aktiv form i faeces, urin och mjölk.

## **Indikationer**

För behandling av infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för oxitetracyklin vid akuta infektioner i livmodern, t.ex. metrit eller vid kvarbliven efterbörd.

## **Kontraindikationer**

Skall ej ges till djur med känd överkänslighet mot tetracykliner.

## **Försiktighet**

Försiktighet skall iakttas vid behandling av djur med nedsatt njurfunktion.

## **Dräktighet och laktation**

Skall ej ges till dräktiga djur.

## **Dosering**

Endast för intrauterint bruk.

1-2 tabletter deponeras efter att var och nekrotisk vävnad i möjligaste mån avlägsnats.

## **Karenstider**

*Slakt: Nöt: 7 dygn. Svin och Får: 10 dygn. Mjolk: 2 dygn*

## **Observera**

Tvätta händerna efter beröring av produkten.

## **Förvaring**

Förvaras vid högst 25°C.

## **Förpackningsinformation**

*Intrauterin tablett 500 mg*

*10 styck påse, receptbelagd, tillhandahålls ej*