

Bipacksedel: Information till användaren

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

## Tepkinly

4 mg/0,8 ml injektionsvätska, lösning  
epkoritamab

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  - Din läkare kommer att ge dig ett patientkort. Läs det noggrant och följ instruktionerna på det. Ha alltid detta patientkort med dig.
  - Visa alltid patientkortet för läkaren eller sjuksköterskan när du träffar dem eller om du åker till sjukhus.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Tepkinly är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tepkinly
3. Hur Tepkinly ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tepkinly ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

## **1. Vad Tepkinly är och vad det används för**

### **Vad Tepkinly är**

Tepkinly är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen epcoritamab. Tepkinly används som enda läkemedel (monoterapi) för att behandla vuxna patienter med en form av blodcancer som heter diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) eller follikulärt lymfom (FL) när sjukdomen har kommit tillbaka eller efter att minst två tidigare behandlingar inte har fungerat.

### **Hur Tepkinly fungerar**

Epcoritamab är specifikt utformat för att hjälpa ditt eget immunsystem att angripa cancercellerna (lymfoceller). Epcoritamab verkar genom att fästa till din kropps immunceller och cancerceller, och föra dem samman, så att ditt immunförsvar kan förstöra cancercellerna.

## **2. Vad du behöver veta innan du använder Tepkinly**

## Använd inte Tepkinly

Om du är allergisk mot epkoritamab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Tepkinly om du är osäker.

## Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tepkinly om du

- har eller har haft problem med nervsystemet, exempelvis krampanfall
- har en infektion
- snart ska få vaccin eller vet att du kan behöva få vaccin inom en snar framtid.

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Tepkinly om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker).

Kontakta omedelbart läkare om du får symtom på någon av biverkningarna som anges nedan, under eller efter behandlingen med Tepkinly. Du kan behöva ytterligare medicinsk behandling.

- **Cytokinfrisättningsyndrom** – ett livshotande tillstånd som ger feber, kräkningar, andningssvårigheter/andfåddhet, frossa, snabb puls, huvudvärk och yrsel eller svindel, som förknippas med läkemedel som stimulerar T-celler.  
- Före varje injektion under huden kan du få läkemedel som hjälper till att minska möjliga effekter av cytokinfrisättningsyndrom.

- **ICANS (immuneffektorcells-associerat neurotoxicitetssyndrom)**
  - symtomen kan vara problem med språkanvändningen (inklusive att tala, förstå, skriva och läsa), dåsighet, förvirring/desorientering, muskelsvaghet, krampanfall, svullnad i en del av hjärnan, och minnesförlust.
- **Infektioner** – du kan få tecken på infektion, t.ex. feber på 38 °C eller högre, frossa, hosta, eller smärta när du kissar; symtomen kan variera beroende på var i kroppen infektionen finns.
- **Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)** – symtomen på detta allvarliga och potentiellt livsfarliga tillstånd i hjärnan kan vara suddig syn, att synen försvinner eller att du ser dubbelt, svårigheter att tala, svaga eller klumpiga armar och ben, förändringar i ditt sätt att gå eller problem med balansen, förändrad personlighet, förändringar i tankemönster, minne och orientering som leder till förvirring. Dessa symtom kan börja flera månader efter att behandlingen har avslutats och de utvecklas ofta långsamt och gradvist under veckor eller månader. Det är viktigt att dina närstående och vårdgivare också känner till dessa symtom eftersom de kan märka symtom som du själv inte är medveten om.
- **Tumörlyssyndrom** – vissa personer kan få ovanliga nivåer av vissa salter i blodet, vilket beror på att cancercellerna bryts ned snabbt under behandlingen. Detta kallas tumörlyssyndrom (TLS).
  - Läkaren eller sjuksköterskan kommer att ta blodprover för att kontrollera om du har detta tillstånd. Före varje injektion under huden ska du vara väl hydrerad (ha tillräckligt mycket vätska i kroppen) och det är möjligt att du får andra läkemedel som kan bidra till att minska höga nivåer av urinsyra och minska möjliga effekter av tumörlyssyndrom.

- **Tumörexacerbationer (tumour flare)** - när din cancer behandlas kan den reagera och ge ett intryck av att ha förvärrats - detta kallas för tumörexacerbationsreaktion ("tumour flare reaction").

## **Barn och ungdomar**

Tepkinly rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, eftersom det inte finns någon information om användning i denna åldersgrupp.

## **Andra läkemedel och Tepkinly**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller använder, nyligen har tagit eller använt eller kan tänkas ta eller använda andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och växtbaserade läkemedel.

## **Graviditet**

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Tepkinly under graviditet eftersom det kan påverka det ofödda barnet. Din läkare kan be dig att göra ett graviditetstest innan du påbörjar behandlingen.

## **Preventivmedel**

Om du är kvinna och kan få barn måste du använda ett effektivt preventivmedel och undvika att bli gravid så länge du tar Tepkinly och i minst 4 månader efter den sista dosen Tepkinly. Om du blir gravid under den tiden måste du tala om det för din läkare omedelbart.

Tala med läkare eller sjuksköterska om lämpliga preventivmedel.

## **Amning**

Du får inte amma under behandlingen med Tepkinly och i minst 4 månader efter den sista dosen. Det är inte känt om Tepkinly utsöndras i bröstmjolk och om det kan påverka ditt barn.

## **Fertilitet**

Effekten av Tepkinly på manlig och kvinnlig fertilitet är okänd.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

På grund av möjliga biverkningar på nervsystemet (ICANS) ska du vara försiktig om du kör bil, cyklar eller använder tunga eller potentiellt farliga maskiner. Om du har sådana symtom ska du undvika dessa aktiviteter och kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Mer information om biverkningar finns i avsnitt 4.

## **Tepkinly innehåller natrium**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## **Tepkinly innehåller sorbitol**

Detta läkemedel innehåller 21,9 mg sorbitol per injektionsflaska motsvarande 27,33 mg/ml.

## **Tepkinly innehåller polysorbat**

Detta läkemedel innehåller 0,42 mg polysorbat 80 per injektionsflaska motsvarande 0,4 mg/ml. Polysorbat 80 kan orsaka allergiska reaktioner. Tala om för din läkare om du har några kända allergier.

### 3. Hur Tepkinly ges

En läkare med erfarenhet av att behandla cancer kommer att sköta din behandling. Följ det behandlingsschema som din läkare har förklarat för dig.

Tepkinly ges av en läkare eller sjuksköterska som en injektion under huden.

Tepkinly ges i cykler på 28 dagar enligt ett doseringsschema som du får av din läkare.

Du får Tepkinly enligt följande schema:

Cykel	Doseringsschema
Cykel 1 till 3	Varje vecka
Cykel 4 till 9	Varannan vecka
Cykel 10 och därefter	Var fjärde vecka

Du kan få andra läkemedel innan du får Tepkinly. Det är för att förebygga reaktioner såsom cytokinfrisättningsyndrom och feber i cykel 1 (och eventuella kommande cykler).

Dessa läkemedel kan vara

- kortikosteroider, såsom dexametason, prednisolon eller motsvarande
- en antihistamin, såsom difenhydramin
- paracetamol.

Under den första månaden (cykel 1) när du får Tepkinly:

- Det är viktigt att du har tillräckligt med vätska i kroppen. Därför kan läkaren säga åt dig att dricka mycket vatten dagen före och dagen efter du har fått Tepkinly. Samma dag som du får Tepkinly kan läkaren ge dig vätska genom en nål som sätts in i en ven (intravenöst).
- Om du tar medicin mot högt blodtryck kan läkaren be dig att sluta ta den under en kort tid medan du behandlas med Tepkinly.

### Om du har diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Den första fulla dosen (48 mg) Tepkinly ges på dag 15 i cykel 1. Din läkare kommer att övervaka hur behandlingen fungerar och be dig stanna kvar på vårdmottagningen i 24 timmar efter att du fått den första fulla dosen (48 mg), eftersom det är under denna tid det är störst risk för reaktioner som CRS, ICANS och feber.

### Om du har follikulärt lymfom (FL)

Den första fulla dosen (48 mg) Tepkinly ges på dag 22 i cykel 1.

Du får Tepkinly så länge din läkare anser att du har nytta av behandlingen.

Läkaren kan skjuta upp eller helt avbryta behandlingen med Tepkinly om du får vissa biverkningar.

## **Om du har glömt att använda Tepkinly**

Om du glömmer eller missar ditt vårdbesök ska du genast boka ett nytt. Det är mycket viktigt att du inte missar någon dos för att behandlingen ska ha full verkan.



## Om du slutar att använda Tepkinly

Avbryt inte behandlingen med Tepkinly utan att ha diskuterat det med din läkare, eftersom din sjukdom kan förvärras om du avbryter behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

## 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

### Allvarliga biverkningar

Tala omedelbart om för läkare om du märker något av symtomen på de allvarliga biverkningarna nedan. Du kanske bara får ett eller några av symtomen.

**Cytokinfrisättningsyndrom (CRS) (mycket vanliga:** kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Symtomen kan omfatta

- feber
- kräkningar
- yrsel eller svindel
- frossa
- snabb puls
- svårt att andas/andfåddhet
- huvudvärk

## **Immuneffektorcells-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS)**

**(vanliga:** kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- effekter på nervsystemet, vars symtom kan uppkomma flera dagar eller veckor efter att du får injektionen och kan vara svåra att märka i början. Vissa av dessa symtom kan vara tecken på en allvarlig immunreaktion som heter immuneffektorcells-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS).

Symtomen kan vara

- svårighet att tala eller skriva
- dåsighet
- förvirring/desorientering
- muskelsvaghet
- krampanfall
- minnesförlust

**Tumörlyssyndrom (TLS) (vanliga:** kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Symtomen kan omfatta

- feber
- frossa
- kräkningar
- förvirring
- andnöd
- krampanfall
- oregelbundna hjärtslag
- mörk eller grumlig urin
- ovanlig trötthet
- muskel- eller ledsmärta

## Övriga biverkningar

Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du upplever någon av följande biverkningar nedan eller om de förvärras.

**Mycket vanliga:** kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

- virala infektioner
- pneumoni (lunginflammation)
- övre luftvägsinfektioner (infektion i luftvägarna)
- minskad aptit
- smärta i skelett, leder, ligament och muskler
- buksmärta
- huvudvärk
- illamående
- lös avföring
- hudutslag
- trötthet
- reaktioner vid injektionsstället
- feber
- svullnad

Visas med blodprover

- låga halter av en typ av vita blodkroppar som bekämpar infektioner (neutropeni)
- låga halter av röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthet, blekhet och andfåddhet (anemi)
- låga halter av trombocyter (blodplättar), vilket kan leda till att du blöder och får blåmärken (trombocytopeni)

- minskning av en typ av vita blodkroppar som kallas lymfocyter, som kan påverka kroppens förmåga att bekämpa infektioner (lymfopeni)

**Vanliga:** kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

- feber på grund av infektion när du har låga halter av vita blodkroppar (febril neutropeni)
- ömma, svullna lymfkörtlar, bröstsmärta, hosta eller andningssvårigheter, smärta vid tumörstället (tumörexacerbationer)
- svampinfektioner (orsakat av en typ av mikroorganism som kallas svamp)
- hudinfektioner
- livshotande reaktion som kroppen har på en infektion (sepsis)
- en snabb nedbrytning av tumörceller som resulterar i kemiska förändringar i blodet och skador på organ, inklusive njurar, hjärta och lever (tumörlyssyndrom)
- oregelbunden hjärtrytm
- extra vätska runt lungorna som kan göra det svårt att andas (pleural effusion)
- kräkningar
- klåda (pruritus)

Visas i blodprover

- låga halter av fosfater i blodet, kalium, magnesium eller natrium
- ökning av blodkreatinin, en nedbrytningsprodukt från muskelvävnad

- ökning av leverproteiner i blodet, som kan tyda på problem med levern

### *Rapportering av biverkningar*

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **5. Hur Tepkinly ska förvaras**

Tepkinly förvaras av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal på sjukhuset eller kliniken. Så här förvaras Tepkinly på rätt sätt:

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaras och transporteras kallt (2 °C till 8 °C).
- Får ej frysas.
- Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
- Tepkinly 4 mg/0,8 ml är en lösning som kan spädas före användning.
  - **Spädes före subkutan användning av doserna 0,16 mg och 0,8 mg**

- **Ingen spädning krävs för dosen 3 mg.**
- Om den beredda lösningen inte används direkt kan den förvaras i upp till 24 timmar i 2 °C till 8 °C från tidpunkten för beredningen.
- Inom dessa 24 timmar kan den beredda lösningen förvaras i upp till 12 timmar i rumstemperatur (20 °C – 25 °C) från att dosen börjar förberedas tills den administreras.
- Låt lösningen nå rumstemperatur innan den används.

Din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal kasserar eventuellt oanvänt läkemedel i enlighet med lokala föreskrifter. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är epkoritamab. Varje 0,8 ml injektionsflaska innehåller 4 mg epkoritamab med en koncentration på 5 mg/ml.
- Övriga hjälpämnen är natriumacetattrihydrat, ättiksyra, sorbitol (E420), polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2 “Tepkinly innehåller natrium” och “Tepkinly innehåller sorbitol”).

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Tepkinly är en injektionsvätska, lösning. Det är en färglös till svagt gul lösning som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas.

Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska.

## **Innehavare av godkännande för försäljning**

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Tyskland

## **Tillverkare**

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina, km 52 SNC

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

AbbVie AB

Tel: 08 684 44 600

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om "villkorat godkännande för försäljning". Detta innebär att det väntas komma fler uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Denna bipacksedel ändrades senast 7 januari 2025

## **Övriga informationskällor**

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats <http://www.ema.europa.eu> och på Läkemedelsverkets webbplats

<http://www.lakemedelsverket.se>. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Den senast godkända bipacksedeln och patientkortet för detta läkemedel finns tillgänglig genom att scanna QR-koden i denna bipacksedel och på ytterförpackningen med en smartphone/smart enhet. Samma information är också tillgänglig på följande URL: [www.tepkinly.eu](http://www.tepkinly.eu)



Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill lyssna på eller ha en kopia av denna bipacksedel i förstorad text eller få texten uppläst.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

## **Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:**

Läs detta avsnitt noga innan epkoritamab bereds. **Vissa doser** (den förberedande dosen (0,16 mg) och den intermediära dosen (0,8 mg)) av epkoritamab måste **spädas** före administrering. Följ alla beredningsanvisningar nedan eftersom felaktig beredning kan leda till felaktig dos. Epkoritamab kan spädas med hjälp av två olika metoder; antingen med injektionsflaskor eller med sprutor.

Epkoritamab bereds och administreras som en subkutan injektion.



Varje injektionsflaska med epkoritamab är endast avsedd för engångsbruk.

Varje injektionsflaska innehåller en överfyllning som gör det möjligt att dra upp den angivna mängden.

Epkoritamab måste spädas och administreras av hälso- och sjukvårdspersonal med aseptisk teknik.  
Den spädda lösningen behöver inte filtreras.

Epkoritamab ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning före administrering. Injektionsvätskan ska vara en färglös till något gul lösning. Lösningen får inte användas om den är missfärgad eller grumlig eller om den innehåller främmande partiklar.

## **Beredning av spädd epkoritamab med hjälp av metoden med tomma sterila injektionsflaskor**

### Beredningsanvisningar för 0,16 mg förberedande dos - 2 spädningar krävs - metod med tomma sterila injektionsflaskor

Använd spruta, injektionsflaska och nål av lämplig storlek för varje överföringssteg.

1) Förbered injektionsflaskan med Tepkinly

- a. Ta ut en injektionsflaska med Tepkinly 4 mg/0,8 ml med **ljusblått** lock ur kylskåpet.
- b. Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur i högst 1 timme.
- c. Snurra injektionsflaskan med Tepkinly försiktigt.

Du ska **INTE** använda vortex eller skaka den kraftigt.

2) Utför första spädningen

- a. Märk en tom injektionsflaska av lämplig storlek som "**spädning A**".
- b. Överför **0,8 ml Tepkinly** till injektionsflaskan märkt som **spädning A**.
- c. Överför **4,2 ml steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning** till injektionsflaskan med **spädning A**. Efter första spädningen innehåller lösningen 0,8 mg/ml epkoritamab.
- d. Snurra försiktigt injektionsflaskan med **spädning A** i 30–45 sekunder.

### 3) Utför andra spädningen

- a. Märk en tom injektionsflaska av lämplig storlek som "**spädning B**".
- b. Överför **2 ml lösning** från injektionsflaskan med **spädning A** till injektionsflaskan märkt som **spädning B**. Injektionsflaskan med **spädning A** behövs inte längre och ska kasseras.
- c. Överför **8 ml steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning** till injektionsflaskan med **spädning B** för att få en slutkoncentration på 0,16 mg/ml.
- d. Snurra försiktigt injektionsflaskan med **spädning B** i 30–45 sekunder.

### 4) Dra upp dos

Dra upp **1 ml spädd epkoritamab** från injektionsflaskan med **spädning B** i en spruta. Injektionsflaskan med **spädning B** behövs inte längre och ska kasseras.

## 5) Märk sprutan

Märk sprutan med produktnamn, dosstyrka (0,16 mg), datum och klockslag.

6) Kassera injektionsflaskan och eventuellt oanvänt Tepkinly enligt gällande anvisningar.

### Beredningsanvisningar för 0,8 mg intermediär dos – 1 spädning krävs – metod med tom steril injektionsflaska

Använd spruta, injektionsflaska och nål av lämplig storlek för varje överföringssteg.

#### 1) Förbered injektionsflaskan med Tepkinly

- a. Ta ut en injektionsflaska med Tepkinly 4 mg/0,8 ml med **ljusblått** lock ur kylskåpet
- b. Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur i högst 1 timme.
- c. Snurra injektionsflaskan med Tepkinly försiktigt.

Du ska **INTE** använda vortex eller skaka injektionsflaskan kraftigt.

#### 2) Utför spädning

- a. Märk en tom injektionsflaska av lämplig storlek som **"spädning A"**.
- b. Överför **0,8 ml Tepkinly** till injektionsflaskan märkt som **spädning A**.
- c. Överför **4,2 ml steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 % injektionsvätska, lösning)** till injektionsflaskan med **spädning A** för att få en slutkoncentration på 0,8 mg/ml.
- d. Snurra försiktigt injektionsflaskan med **spädning A** i 30–45 sekunder.

3) Dra upp dos

Dra upp **1 ml spädd epkoritamab** från injektionsflaskan med **spädning A** i en spruta. Injektionsflaskan med **spädning A** behövs inte längre och ska kasseras.

4) Märk sprutan

Märk sprutan med produktnamn, dosstyrka (0,8 mg), datum och klockslag.

5) Kassera injektionsflaskan och eventuellt oanvänt Tepkinly enligt gällande anvisningar.

## **Beredning av spädd epkoritamab med hjälp av metoden med sterila sprutor**

### Beredningsanvisningar för 0,16 mg förberedande dos - 2 späddningar krävs - metod med sterila sprutor

Använd spruta och nål av lämplig storlek för varje överföringssteg.

1) Förbered injektionsflaskan med Tepkinly

- a. Ta ut en injektionsflaska med Tepkinly 4 mg/0,8 ml med **ljusblått** lock ur kylskåpet.
- b. Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur i högst 1 timme.
- c. Snurra försiktigt injektionsflaskan med Tepkinly.

Du ska **INTE** använda vortex eller skaka injektionsflaskan kraftigt.

2) Utför första spädningen

- a. Märk en spruta av lämplig storlek som **"spädning A"**.

- b. Dra upp **4,2 ml steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)** injektionsvätska, lösning i sprutan märkt som **spädning A**. Fyll på sprutan med cirka 0,2 ml luft.
- c. Ta en ny spruta märkt som "**spruta 1**" och dra upp **0,8 ml epkoritamab**.
- d. Anslut de två sprutorna och tryck in 0,8 ml epkoritamab i sprutan med **spädning A**. Efter första spädningen innehåller lösningen 0,8 mg/ml epkoritamab.
- e. Blanda försiktigt genom att vända de anslutna sprutorna 180 grader 5 gånger.
- f. Koppla isär sprutorna och kassera **spruta 1**.

### 3) Utför andra spädningen

- a. Märk en spruta av lämplig storlek som "**spädning B**".
- b. Dra upp **8 ml steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)** injektionsvätska, lösning i sprutan märkt som **spädning B**. Fyll på sprutan med cirka 0,2 ml luft.
- c. Märk en annan spruta av lämplig storlek som "**spruta 2**".
- d. Anslut **spruta 2** till sprutan med **spädning A** och överför **2 ml lösning** till **spruta 2**. Sprutan med **spädning A** behövs inte längre och ska kasseras.
- e. Anslut **spruta 2** till sprutan med **spädning B** och tryck in **2 ml av lösningen** i sprutan med **spädning B** för att få en slutkoncentration på 0,16 mg/ml.
- f. Blanda försiktigt genom att vända de anslutna sprutorna 180 grader 5 gånger.
- g. Koppla isär sprutorna och kassera **spruta 2**.

### 4) Dra upp dos

Anslut och överför **1 ml spädd epkoritamab** från sprutan med **spädning B** till en ny spruta. Sprutan med **spädning B** behövs inte längre och ska kasseras.

5) Märk sprutan

Märk sprutan med produktnamn, dosstyrka (0,16 mg), datum och klockslag.

6) Kassera injektionsflaskan och eventuellt oanvänt Tepkinly enligt gällande anvisningar.

### Beredningsanvisningar för 0,8 mg intermediär dos – 1 spädning krävs – metod med steril spruta

Använd spruta och nål av lämplig storlek för varje överföringssteg.

1) Förbered injektionsflaskan med Tepkinly

- a. Ta ut en injektionsflaska med Tepkinly 4 mg/0,8 ml med **ljusblått** lock ur kylskåpet.
- b. Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur i högst 1 timme.
- c. Snurra försiktigt injektionsflaskan med Tepkinly.

Du ska **INTE** använda vortex eller skaka injektionsflaskan kraftigt.

2) Utför spädning

- a. Märk en spruta av lämplig storlek som "**spädning A**".
- b. Dra upp **4,2 ml steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)** **injektionsvätska, lösning** i sprutan märkt som **spädning A**. Fyll på sprutan med cirka 0,2 ml luft.
- c. Ta en ny spruta märkt som "**spruta 1**" och dra upp **0,8 ml epkoritamab**.

- d. Anslut de två sprutorna och tryck in **0,8 ml epkoritamab** i sprutan med **spädning A** för att få en slutkoncentration på 0,8 mg/ml.
- e. Blanda försiktigt genom att vända de anslutna sprutorna 180 grader 5 gånger.
- f. Koppla isär sprutorna och kassera **spruta 1**.

### 3) Dra upp dos

Anslut en ny spruta till sprutan med **spädning A** och överför **1 ml spädd epkoritamab** till den nya sprutan. Sprutan med **spädning A** behövs inte längre och ska kasseras.

### 4) Märk sprutan

Märk sprutan med produktnamn, dosstyrka (0,8 mg), datum och klockslag.

5) Kassera injektionsflaskan och eventuellt oanvänt Tepkinly enligt gällande anvisningar.

## Beredning av dosen 3 mg epkoritamab

Beredningsanvisningar för 3 mg andra intermediär dos (ingen spädning krävs)

Epkoritamabdosen på 3 mg krävs endast för FL-patienter.

### 1) Förbered injektionsflaskan med Tepkinly

- a. Ta ut en injektionsflaska med Tepkinly 4mg/0,8 ml med **ljusblått** lock ur kylskåpet.
- b. Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur i högst 1 timme.
- c. Snurra injektionsflaskan med Tepkinly försiktigt.

Du ska **INTE** använda vortex eller skaka injektionsflaskan kraftigt.

2) Dra upp dos

Dra upp **0,6 ml** epkoritamab i en spruta.

3) Märk sprutan

Märk sprutan med dosstyrka (3 mg), datum och klockslag.

4) Kassera injektionsflaskan och eventuellt oanvänt Tepkinly enligt gällande anvisningar.

### Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningsnummer dokumenteras.