

## Bortezomib STADA

**ⓘ R EF**

### STADA Nordic

Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml

(Färglös till ljusgul lösning med ett pH-värde på 4,0–5,5.)

Cytostatiska/cytotoxiska medel, övriga cytostatiska/cytotoxiska medel

### Aktiv substans:

Bortezomib

### ATC-kod:

L01XG01

Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

**FASS-text:** *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på produktresumé: 2025-02-05.*

## Indikationer

Bortezomib Stada är indicerat som monoterapi eller i kombination med pegylerat liposomalt doxorubicin eller dexametason för behandling av progressivt multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling och som redan har

genomgått eller är olämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation.

Bortezomib Stada i kombination med melfalan och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för högdos kemoterapi vid hematopoetisk stamcellstransplantation.

Bortezomib Stada i kombination med dexametason, eller med dexametason och talidomid, är indicerat för induktionsbehandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom vilka är lämpliga för högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation.

Bortezomib Stada i kombination med rituximab, cyklofosamid, doxorubicin och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom som inte är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation.

## **Kontraindikationer**

Överkänslighet mot den aktiva substansen, bor eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Akut diffus infiltrativ pulmonell och perikardiell sjukdom.

När bortezomib ges i kombination med andra läkemedel, se deras produktresuméer för ytterligare kontraindikationer.

## **Dosering**

Behandling med Bortezomib Stada måste påbörjas under övervakning av läkare med erfarenhet av behandling av cancerpatienter, men Bortezomib Stada får ges av

sjukvårdspersonal med erfarenhet av användning av cytostatika. Bortezomib Stada måste beredas av sjukvårdspersonal (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).

Dosering vid behandling av progressivt multipelt myelom (patienter som tidigare har fått minst en behandling)

### *Monoterapi*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning, ges via subkutan injektion och efter utspädning även via intravenös injektion med en rekommenderad dos av  $1,3 \text{ mg/m}^2$  kroppsytta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och 11 i en 21-dagars behandlingscykel. Denna treveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Det rekommenderas att patienter får två behandlingscykler av bortezomib efter det att ett fullständigt svar bekräftats. Det rekommenderas också att patienter som svarar men inte uppnår fullständig remission erhåller totalt 8 behandlingscykler av bortezomib. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av bortezomib.

### *Dosjusteringar under pågående behandling och återinsättande av behandling vid monoterapi*

Behandling med bortezomib måste avbrytas om det uppstår en icke-hematologisk toxicitet av grad 3 eller en hematologisk toxicitet av grad 4, med undantag för neuropati såsom diskuteras nedan (se även avsnitt Varningar och försiktighet). Sedan symtomen på toxicitet har avhjälpats kan behandling med bortezomib åter sättas in med en dos som reducerats med 25 % ( $1,3 \text{ mg/m}^2$  minskat till  $1,0 \text{ mg/m}^2$ ;  $1,0 \text{ mg/m}^2$  minskat till  $0,7 \text{ mg/m}^2$ ). Om toxiciteten inte avhjälpas eller om den återkommer vid

den lägsta dosen måste man överväga att avbryta behandlingen med bortezomib om inte behandlingsvinsten klart överväger över riskerna.

### *Neuropatisk smärta och/eller perifer neuropati*

Patienter som drabbas av neuropatisk smärta och/eller perifer neuropati i samband med behandling med bortezomib bör behandlas på det sätt som anges i Tabell 1 nedan (se avsnitt Varningar och försiktighet). Patienter som före behandlingen lidit av allvarlig neuropati kan behandlas med bortezomib endast efter noggrant övervägande av risk/nytta.

*Tabell 1: Rekommenderade\* dosförändringar vid neuropati i samband med behandling med bortezomib*

<b>Allvarlighetsgrad av neuropati</b>	<b>Dosförändring</b>
Grad 1 (asymtomatisk; förlust av djupa senreflexer eller parestesi) utan smärta eller funktionsförlust.	Ingen.
Grad 1 med smärta eller grad 2 (måttliga symtom; begränsande instrumentell Allmän Daglig Livsföring (ADL)**).	Minska bortezomib till 1,0 mg/m <sup>2</sup> eller Ändra behandling med bortezomib till 1,3 mg/m <sup>2</sup> en gång per vecka.
Grad 2 med smärta eller grad 3 (allvarliga symtom; begränsande egenomsorgs-ADL***).	Avbryt behandlingen med bortezomib tills symtomen på toxicitet har försvunnit. När toxiciteten avklingat återupptas

	behandlingen med bortezomib och dosen reduceras till 0,7 mg/m <sup>2</sup> en gång per vecka.
Grad 4 (livshotande konsekvenser; kräver akuta insatser) och/eller allvarlig autonom neuropati.	Avbryt behandlingen med bortezomib.

\* Baserat på dosförändringar i fas II- och fas III-studierna på multipelt myelom och erfarenheter efter marknadsintroduktion. Gradering baserad på NCI's "Common Toxicity Criteria", CTCAE v 4.0.

\*\* *Instrumentell ADL*: avser matlagning, inköp av dagligvaror eller kläder, telefonanvändning, hantering av pengar, etc.

\*\*\* *Egenomsorgs-ADL*: avser badning, påklädning och avklädning, matintag, toalettanvändning, intag av läkemedel, och ej sängbunden.

### *Kombinationsbehandling med pegylerat liposomalt doxorubicin*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning administreras som subkutan injektion eller efter utspädning även som intravenös injektion med en rekommenderad dos av 1,3 mg/m<sup>2</sup> kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och 11 i en 21-dagars behandlingscykel. Denna treveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av bortezomib.

Pegylerat liposomalt doxorubicin administreras med 30 mg/m<sup>2</sup> på dag 4 i behandlingscykeln med bortezomib som en intravenös infusion under 1 timme administrerad efter injektionen med bortezomib.

Upp till 8 cykler av denna kombinationsbehandling kan administreras så länge patienten inte har försämrats och tolererar behandling. Patienter som har uppnått full respons kan fortsätta behandlingen i minst 2 cykler efter de första tecknen på fullständig respons, även om det innebär behandling i mer än 8 cykler.

Patienter vars paraproteinnivåer fortsätter att sjunka efter 8 cykler kan också fortsätta så länge som de tolererar behandlingen och de fortsätter att svara.

För ytterligare information om pegylerat liposomalt doxorubicin, se motsvarande produktresumé.

### *Kombination med dexametason*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning administreras som subkutan injektion eller efter utspädning även som intravenös injektion med en rekommenderad dos av 1,3 mg/m<sup>2</sup> kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och 11 i en 21-dagars behandlingscykel. Denna treveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av bortezomib.

Dexametason administreras oralt med 20 mg på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 och 12 i behandlingscykeln med bortezomib.

Patienter som uppnår respons eller stabil sjukdom efter 4 cykler av denna kombinationsbehandling, kan fortsätta med samma kombination i maximalt 4 påföljande cykler.

För ytterligare information om dexametason, se motsvarande produktresumé.

### *Dosjusteringar vid kombinationsbehandling för patienter med progressivt multipelt myelom*

För dosjustering av bortezomib vid kombinationsbehandling, följ riktlinjerna för dosjustering som finns beskrivna ovan under monoterapi.

Dosering hos patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation.

*Kombinationsterapi med melfalan och prednison*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning administreras som subkutan injektion eller efter utspädning även som intravenös injektion i kombination med oralt melfalan och oralt prednison som visas i Tabell 2. En 6-veckorscykel anses som en behandlingscykel. I cykel 1-4, administreras bortezomib två gånger per vecka på dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 och 32. I cykel 5-9, administreras bortezomib en gång per vecka på dag 1, 8, 22 och 29. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av bortezomib.

Både melfalan och prednison ska ges oralt dag 1, 2, 3 och 4 under den första veckan i varje behandlingscykel med bortezomib. Nio behandlingscykler av denna kombinationsbehandling administreras.

*Tabell 2: Rekommenderad dosering för bortezomib i kombination med melfalan och prednison*

<b>Bortezomib två gånger per vecka (Cykel 1-4)</b>													
<b>Vecka</b>	<b>1</b>				<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>
<b>a</b>													
Bo (1,3 mg/m <sup>2</sup> )	Dag 1	--	--	Dag 4	Dag 8	Dag 11	vilo-period	Dag 22	Dag 25	Dag 29	Dag 32	vilo-period	

M (9 mg/ m <sup>2</sup> ) P (60 mg/ m <sup>2</sup> )	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	--	--	vilo- peri od	--	--	--	--	vilo- peri od
<b>Bortezomib en gång per vecka (Cykel 5-9)</b>												
<b>Vecka</b>	<b>1</b>				<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>	
Bo (1,3 mg/ m <sup>2</sup> )	Dag 1	--	--	--	Dag 8		vilo- peri od	Dag 22		Dag 29		vilo- peri od
M (9 mg/ m <sup>2</sup> ) P (60 mg/ m <sup>2</sup> )	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	--		vilo- peri od	--				vilo- peri od

Bo=Bortezomib, M=melfalan, P=prednison

*Dosjusteringar under pågående behandling och återupptagen behandling vid kombinationsterapi med melfalan och prednison*

Innan påbörjan av ny terapicykel:

- Trombocyttal bör vara  $\geq 70 \times 10^9/l$  och det absoluta antalet neutrofiler (ANC) ska vara  $\geq 1,0 \times 10^9/l$ .



- Icke hematologiska toxiciteter bör vara bestämda till grad 1 eller baseline.

*Tabell 3: Dosförändringar under senare cykler av bortezomib behandling i kombination med melfalan och prednison*

<b>Toxicitet</b>	<b>Dosförändring eller -fördröjning</b>
<p><i>Hematologisk toxicitet under en cykel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om förlängd grad 4 neutropeni eller trombocytopeni, eller trombocytopeni med blödning observerats i föregående cykel</li> </ul>	<p>Överväg minskning av melfalandos med 25 % i nästa cykel.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om trombocyttallet är <math>\leq 30 \times 10^9/l</math> eller ANC <math>\leq 0,75 \times 10^9/l</math> på en doseringsdag för bortezomib (annan dag än dag 1)</li> </ul>	<p>Behandling med bortezomib ska inte ges.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om flera doseringar av bortezomib i en cykel inte ges (<math>\geq 3</math> doseringar under administrering två gånger per vecka eller <math>\geq 2</math> doseringar under administrering en gång per vecka)</li> </ul>	<p>Bortezomib dos ska reduceras 1 doseringsnivå (från <math>1,3 \text{ mg/m}^2</math> till <math>1 \text{ mg/m}^2</math>, eller från <math>1 \text{ mg/m}^2</math> till <math>0,7 \text{ mg/m}^2</math>).</p>

<p><i>Grad <math>\geq 3</math> icke-hematologiska toxiciteter</i></p>	<p>Behandling med bortezomib ska inte ges förrän symtom på toxicitet har bestämts till grad 1 eller baseline. Då kan bortezomib återinföras med en reducerad doseringsnivå (från 1,3 mg/m<sup>2</sup> till 1 mg/m<sup>2</sup>, eller från 1 mg/m<sup>2</sup> till 0,7 mg/m<sup>2</sup>). För bortezomib relaterad neuropatisk smärta och /eller perifer neuropati, gör uppehåll i och/eller modifiera bortezomib enligt översikt i tabell 1.</p>

För ytterligare information avseende melfalan och prednison, se motsvarande produktresumé.

Dosering för patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation (induktionsbehandling)

*Kombinationsterapi med dexametason*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning administreras som subkutan injektion eller efter utspädning även som intravenös injektion med rekommenderad dos på 1,3 mg/m<sup>2</sup> kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och 11 i en 21-dagars behandlingscykel. Denna treveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av bortezomib.

Dexametason ges oralt 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 och 11 av behandlingscykeln med bortezomib.

Fyra behandlingscykler med denna kombinationsbehandling administreras.

#### *Kombinationsterapi med dexametason och talidomid*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning administreras som subkutan injektion eller efter utspädning även som intravenös injektion med rekommenderad dos på 1,3 mg/m<sup>2</sup> kroppsytta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och 11 i en 28-dagars behandlingscykel. Denna fyraveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av bortezomib.

Dexametason ges oralt 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 och 11 av behandlingscykeln med bortezomib.

Talidomid ges oralt 50 mg dagligen på dag 1–14, och om detta tolereras ökas dosen därefter till 100 mg på dag 15–28 och kan därefter ökas ytterligare till 200 mg dagligen från cykel 2 (se tabell 4).

Fyra behandlingscykler av denna kombinationsbehandling administreras. Det rekommenderas att patienter med åtminstone partiell respons får ytterligare 2 behandlingscykler.

*Tabell 4: Dosering för bortezomib kombinationsterapi hos patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation*

<b>Bo + Dx</b>	<b>Cykel 1 till 4</b>			
	Vecka	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Bo (1,3 mg/m <sup>2</sup> )	Dag 1, 4	Dag 8, 11	Viloperiod

	Dx 40 mg	Dag 1, 2, 3, 4	Dag 8, 9, 10, 11	-	
<b>Bo + Dx + T</b>	<b>Cykel 1</b>				
	<b>Vecka</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Bo (1,3 mg/ m <sup>2</sup> )	Dag 1, 4	Dag 8, 11	Viloperiod	Viloperiod
	T 50 mg	Dagligen	Dagligen	-	-
	T 100 mg <sup>a</sup>	-	-	Dagligen	Dagligen
	Dx 40 mg	Dag 1, 2, 3, 4	Dag 8, 9, 10, 11	-	-
	<b>Cykel 2 till 4<sup>b</sup></b>				
	Bo (1,3 mg/ m <sup>2</sup> )	Dag 1, 4	Dag 8, 11	Viloperiod	Viloperiod
	T 200 mg <sup>a</sup>	Dagligen	Dagligen	Dagligen	Dagligen
	Dx 40 mg	Dag 1, 2, 3, 4	Dag 8, 9, 10, 11	-	-

Bo=Bortezomib, Dx=dexametason, T=talidomid

<sup>a</sup>. Talidomid dosen ökas till 100 mg fr.o.m. vecka 3 av cykel 1 endast om 50 mg tolereras och till 200 mg från cykel 2 och framåt om 100 mg tolereras.

<sup>b</sup>. Upp till 6 cykler kan ges till patienter som uppnår åtminstone partiell respons efter 4 cykler

*Dosjustering for patienter lämpliga för transplantation*

För dosjusteringar av bortezomib ska riktlinjer för dosmodifiering som beskrivs för monoterapi följas. När bortezomib ges i kombination med andra cytostatikaläkemedel skall dessutom lämpliga dosreduktioner för dessa produkter övervägas vid fall av toxicitet, i enlighet med rekommendationerna i produktresumén.

### Dosering för patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom (MCL)

*Kombinationsbehandling med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (BoR-CAP)*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning administreras som subkutan injektion eller efter utspädning även som intravenös injektion med en rekommenderad dos av 1,3 mg/m<sup>2</sup> kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och 11 följt av en viloperid på 10 dagar under dag 12–21. Denna 3-veckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Sex behandlingscykler med bortezomib rekommenderas, men till patienter för vilka ett svar dokumenteras först under cykel 6 kan ytterligare två behandlingscykler ges. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av bortezomib.

Följande läkemedel administreras som intravenösa infusioner dag 1 i varje 3-veckorscykel med bortezomib: rituximab 375 mg/m<sup>2</sup>, cyklofosfamid 750 mg/m<sup>2</sup> och doxorubicin 50 mg/m<sup>2</sup>.

Prednison 100 mg/m<sup>2</sup> administreras oralt dag 1, 2, 3, 4 och 5 i varje behandlingscykel med bortezomib.

*Dosjusteringar under behandling för patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom*

Innan en ny behandlingscykel påbörjas:

- Trombocyttallet bör vara  $\geq 100 \times 10^9/l$  och absolut neutrofilantal (ANC) bör vara  $\geq 1,5 \times 10^9/l$ .
- Trombocyttallet bör vara  $\geq 75 \times 10^9/l$  hos patienter med benmärgsinfiltration eller mjältsekvestrering.
- Hemoglobin  $\geq 8$  g/dl.
- Icke-hematologiska toxiciteter bör ha gått tillbaks till grad 1 eller baseline.

Behandlingen med bortezomib ska avbrytas vid debut av bortezomib -relaterade icke-hematologiska toxiciteter (exklusive neuropati)  $\geq$  grad 3 eller hematologiska toxiciteter  $\geq$  grad 3 (se även avsnitt Varningar och försiktighet). För dosjusteringar, se tabell 5 nedan.

Granulocytkolonistimulerande faktorer kan administreras för hematologisk toxicitet enligt lokal standardiserad praxis. Profylaktisk användning av granulocytkolonistimulerande faktorer bör övervägas i händelse av upprepade fördröjningar av cykeladministrering. Trombocyttransfusion för behandling av trombocytopeni bör övervägas när det är kliniskt lämpligt.

*Tabell 5: Dosjustering under behandling för patienter med tidigare obehandlat mantellcellslymfom*

Toxicitet	Förändring eller fördröjning av dosen
<i>Hematologisk toxicitet</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neutropeni av <math>\geq</math> grad 3 med feber, neutropeni grad 4 som</li> </ul>	Uppehåll i behandlingen med bortezomib bör göras i upp till 2 veckor tills patienten har ANC

<p>varar mer än 7 dagar, trombocyttal <math>&lt;10 \times 10^9/l</math></p>	<p><math>\geq 0,75 \times 10^9/l</math> och trombocyttal <math>\geq 25 \times 10^9/l</math>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om toxiciteten efter behandlingsuppehåll med bortezomib inte klingar av enligt definitionen ovan, ska behandlingen med bortezomib avbrytas.</li> <li>• Om toxiciteten klingar av, dvs. patienten har ANC <math>\geq 0,75 \times 10^9/l</math> och trombocyttal <math>\geq 25 \times 10^9/l</math>, kan bortezomib påbörjas på nytt med en dos reducerad med en dosnivå (från <math>1,3 \text{ mg/m}^2</math> till <math>1 \text{ mg/m}^2</math> eller från <math>1 \text{ mg/m}^2</math> till <math>0,7 \text{ mg/m}^2</math>).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid trombocyttal <math>&lt;25 \times 10^9/l</math> eller ANC <math>&lt;0,75 \times 10^9/l</math> på en doseringsdag med bortezomib (annan dag än dag 1 i varje cykel)</li> </ul>	<p>Uppehåll i behandlingen med bortezomib bör göras</p>
<p><i>Icke-hematologiska toxiciteter av grad <math>\geq 3</math> som anses ha samband med bortezomib</i></p>	<p>Uppehåll i behandlingen med bortezomib bör göras tills symtomen på toxicitet har</p>

	<p>avklingat till grad 2 eller bättre. Därefter kan bortezomib påbörjas på nytt med en dos reducerad med en dosnivå (från 1,3 mg/m<sup>2</sup> till 1 mg/m<sup>2</sup>, eller från 1 mg/m<sup>2</sup> till 0,7 mg/m<sup>2</sup>). Vid bortezomib-relaterad neuropatisk smärta och/eller perifer neutropati gör uppehåll i och/eller modifiera behandlingen med bortezomib enligt i tabell 1.</p>
--	--

När bortezomib ges i kombination med andra cytostatika ska dessutom lämpliga dosreduktioner för dessa läkemedel övervägas i händelse av toxicitet, i enlighet med rekommendationerna i deras produktresuméer.

### Speciella populationer

#### *Äldre*

Det finns inget som tyder på att dosjusteringar krävs vid behandling av patienter över 65 år med multipelt myelom eller med mantelcellslymfom.

Det finns inga studier på användningen av bortezomib till äldre personer med tidigare obehandlat multipelt myelom vilka är lämpliga för högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation.

Därför kan inga dosrekommendationer ges för denna population. I en studie med patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom var 42,9 % och 10,4 % av patienterna som



exponerades för bortezomib i åldern 65–74 år respektive  $\geq 75$  år. Hos patienter  $\geq 75$  år tolererades både behandlingen med BoR-CAP och R-CHOP mindre väl (se avsnitt Biverkningar).

### *Nedsatt leverfunktion*

Patienter med lätt nedsatt leverfunktion behöver ingen dosjustering och ska behandlas med den rekommenderade dosen. Patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion ska påbörja bortezomib -behandling med en reducerad dos på  $0,7 \text{ mg/m}^2$  per injektion under första behandlingscykeln och sedan kan en efterföljande doshöjning till  $1,0 \text{ mg/m}^2$  eller ytterligare dosreducering till  $0,5 \text{ mg/m}^2$  övervägas beroende på patientens tolererbarhet (se Tabell 6 och avsnitt Varningar och försiktighet. och 5.2).

*Tabell 6: Rekommenderad anpassning av startdosen för bortezomib hos patienter med nedsatt leverfunktion*

<b>Graden av leverfunktionsnedsättning*</b>	<b>Bilirubinnivå</b>	<b>SGOT (ASAT)-nivåer</b>	<b>Anpassning av startdosen</b>
Lindrig	$\leq 1,0 \times \text{ULN}$	$> \text{ULN}$	Ingen
	$> 1,0 \times -1,5 \times \text{ULN}$	Alla	Ingen
Måttlig	$> 1,5 \times -3 \times \text{ULN}$	Alla	Reducera bortezomib-dosen till $0,7 \text{ mg/m}^2$ under första behandlingscykeln. Överväg att höja dosen till
Kraftig	$> 3 \times \text{ULN}$	Alla	

			1,0 mg/m <sup>2</sup> , eller sänka dosen ytterligare till 0,5 mg/m <sup>2</sup> under efterföljande cykler beroende på patientens tolererbarhet.
--	--	--	---

Förkortningar: SGOT=serum glutamic oxaloacetic transaminase, ASAT=aspartataminotransferas, ULN=övre gränsen för normalvärdet.

\*Baserat på klassificeringen av NCI Organ Dysfunction Working Group beträffande kategorier av leverfunktionsnedsättning (lindrig, måttlig, kraftig).

### *Nedsatt njurfunktion*

Farmakokinetiken för bortezomib påverkas inte hos patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance [CrCl] >20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>), därav behövs inga dosjusteringar för dessa patienter. Det är inte känt om farmakokinetiken för bortezomib påverkas hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion som inte genomgår dialys (CrCl <20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>). Eftersom dialys kan minska koncentrationerna av bortezomib ska bortezomib administreras efter dialysproceduren (se avsnitt Farmakokinetik).

### *Pediatrik population*

Säkerhet och effekt för bortezomib för barn under 18 år har inte fastställts (se avsnitt Farmakodynamik och Farmakokinetik). Tillgänglig information finns i avsnitt Farmakodynamik men ingen dosrekommendation kan fastställas.

## Administreringsätt

Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning finns tillgänglig för subkutan injektion och efter utspädning även som intravenös administrering.

Bortezomib får inte ges via andra administreringsvägar. Intratekal administrering har resulterat i dödsfall.

### *Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet*

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

### *Intravenös injektion*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ ml injektionsvätska, lösning späds först till 1 mg/ ml (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering) och administreras efter utspädning som en intravenös bolusinjektion under 3–5 sekunder genom en perifer eller central venkateter följt av spolning med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid injektionsvätska. Det ska gå minst 72 timmar mellan upprepade doser av bortezomib.

### *Subkutan injektion*

Bortezomib Stada 2,5 mg/ ml injektionsvätska, lösning ges subkutant i låren (höger eller vänster) eller buken (höger eller vänster). Lösningen ska injiceras subkutant i en 45-90° vinkel. Injektionsstället ska varieras för påföljande injektioner.

Om lokala reaktioner på injektionsstället inträffar efter subkutan injektion av bortezomib kan antingen en mindre koncentrerad bortezomib lösning (1 mg/ ml i stället för 2,5 mg/ ml) administreras subkutant eller en övergång till intravenös injektion rekommenderas.

När bortezomib ges i kombination med andra läkemedel, se produktresuméerna för dessa läkemedel för anvisningar om administrering.

## **Varningar och försiktighet**

När bortezomib ges i kombination med andra läkemedel ska produktresuméerna för de andra läkemedlen studeras innan behandling med bortezomib sätts in. När talidomid används ska särskild uppmärksamhet ges till graviditetstest och preventiva åtgärder är nödvändiga (se avsnitt Graviditet).

### Intratekal administrering

Det har förekommit dödsfall vid oavsiktlig intratekal administrering av bortezomib. Bortezomib Stada 2,5 mg injektionsvätska, lösning är endast avsett för intravenös eller subkutan användning. Bortezomib ska inte administreras intratekalt.

### Gastrointestinal toxicitet

Gastrointestinal toxicitet, inklusive illamående, diarré, kräkningar och förstoppning är mycket vanligt förekommande vid behandling med bortezomib. Fall av ileus har rapporterats som mindre vanliga (se avsnitt Biverkningar). Därför ska patienter som drabbas av förstoppning övervakas noga.

### Hematologisk toxicitet

Behandling med bortezomib är mycket ofta förknippad med hematologisk toxicitet (trombocytopeni, neutropeni och anemi). I studier på patienter med recidiverande multipelt myelom behandlade med bortezomib och patienter med tidigare obehandlat MCL behandlade med bortezomib i kombination med rituximab, cyklofosamid, doxorubicin och prednison (BoR-CAP), var en av de vanligaste hematologiska toxiciteterna övergående trombocytopeni. Trombocyttallet var lägst dag 11 i varje behandlingscykel med bortezomib och hade vanligtvis återgått till baseline vid nästa cykel. Inget tydde på någon kumulativ trombocytopeni. Det genomsnittliga minimivärdet för trombocyttallet var ungefär 40 % av ursprungsvärdet i monoterapistudierna med multipelt myelom och 50 % i MCL-studien. Hos patienter med långt framskridet myelom var trombocytopenins svårighetsgrad relaterad till trombocyttallet före behandlingen. För initialt trombocytaltal  $<75 \times 10^9/l$  hade 90 % av 21 patienter ett trombocytaltal  $\leq 25 \times 10^9/l$  under studien, inklusive 14 %  $<10 \times 10^9/l$ . Åt andra sidan, hos patienter med initialt trombocytaltal  $>75 \times 10^9/l$  hade endast 14 % av 309 patienter ett tal  $\leq 25 \times 10^9/l$  under studien.

Hos patienter med MCL (studie LYM-3002) sågs en högre incidens (56,7 % mot 5,8 %) trombocytopeni grad  $\geq 3$  i behandlingsgruppen som fick bortezomib (BoR-CAP) jämfört med behandlingsgruppen som inte fick bortezomib (rituximab, cyklofosamid, doxorubicin, vinkristin och prednison [R-CHOP]). De två behandlingsgrupperna var jämförbara när det gäller den totala incidensen av alla grader av blödningshändelser (6,3 % i BoR-CAP-gruppen och 5,0 % i R-CHOP-gruppen) samt blödningshändelser grad 3 eller högre (BoR-CAP: 4 patienter [1,7 %]; R-CHOP: 3 patienter [1,2 %]). I

BoR-CAP-gruppen fick 22,5 % av patienterna trombocytttransfusioner jämfört med 2,9 % av patienterna i R-CHOP-gruppen.

Gastrointestinal och intracerebral blödning har rapporterats i samband med behandling med bortezomib. Trombocyttallet bör därför kontrolleras före varje dos av bortezomib. Behandlingen med bortezomib bör avbrytas när trombocyttallet är  $<25 \times 10^9/l$  eller vid kombination med melfalan och prednison, när trombocyttallet är  $\leq 30 \times 10^9/l$  (se avsnitt Dosering). Den förväntade behandlingsfördelen bör noga vägas mot riskerna, särskilt hos patienter med måttlig till allvarlig trombocytopeni och riskfaktorer för blödning.

Fullständig blodstatus (CBC) med differential och inklusive trombocytantal bör tas frekvent under behandling med bortezomib. Trombocytttransfusion bör övervägas när det är kliniskt lämpligt (se avsnitt Dosering).

Hos patienter med MCL observerades övergående neutropeni som var reversibel mellan cyklerna, utan tecken på kumulativ neutropeni. Neutrofiler var lägst dag 11 i varje behandlingscykel med bortezomib och hade vanligtvis återgått till baseline vid nästa cykel. I studie LYM-3002 gavs kolonistimulerande faktorer till 78 % av patienterna i BoR-CAP-gruppen och 61 % av patienterna i R-CHOP-gruppen. Eftersom patienter med neutropeni löper ökad risk för infektioner bör de övervakas för tecken och symtom på infektion och behandlas omedelbart. Granulocytkolonistimulerande faktorer kan administreras för hematologisk toxicitet enligt lokal standardiserad praxis. Profylaktisk användning av granulocytkolonistimulerande faktorer bör övervägas i händelse av

upprepade fördröjningar av cykeladministrering (se avsnitt Dosering).

### Herpes zoster virusreakivering

Antiviral profylax rekommenderas hos patienter som behandlas med bortezomib. I fas III-studien på patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom, var den totala incidensen av herpes zoster reaktivering vanligare hos patienter som behandlats med bortezomib + melfalan + prednison jämfört med melfalan + prednison (14 % jämfört med 4 %).

Hos patienter med MCL (studie LYM-3002) var incidensen av herpes zoster-infektion 6,7 % i BoR-CAP-gruppen och 1,2 % i R-CHOP-gruppen (se avsnitt Biverkningar).

### Hepatit B-virus (HBV) – reaktivering och infektion

När rituximab används i kombination med bortezomib måste HBV-screening alltid utföras på patienter som löper risk för infektion med HBV innan behandling påbörjas. Bärare av hepatit B och patienter med hepatit B i anamnesen måste övervakas noggrant för kliniska och laboratoriebaserade tecken på aktiv HBV-infektion under och efter kombinationsbehandling med rituximab och bortezomib. Antiviral profylax bör övervägas. Se produktresumén för rituximab för ytterligare information.

### Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Mycket sällsynta fall med okänd kausalitet av John Cunningham (JC) virusinfektion med PML och dödsfall till följd, har rapporterats hos patienter som behandlats med bortezomib. Patienter med diagnosen PML hade tidigare fått eller fick samtidig immunosuppressiv behandling. De flesta fall av PML diagnostiserades inom 12 månader efter första dosen av

bortezomib. Patienter bör övervakas regelbundet med avseende på nya eller förvärrade neurologiska symtom eller tecken som kan indikera PML som en del av differentialdiagnosen av CNS problem. Vid misstanke om PML- diagnos, bör patienten remitteras till specialist i PML och relevanta diagnostiska åtgärder för PML ska initieras. Bortezomib ska sättas ut om PML diagnostiseras.

### Perifer neuropati

Behandling med bortezomib är mycket ofta förknippad med perifer neuropati, mestadels sensorisk. Fall av allvarlig motorisk neuropati med eller utan perifer sensorisk neuropati har dock rapporterats. Incidensen av perifer neuropati ökar tidigt under behandlingen och ett maximum har setts under cykel 5.

Det rekommenderas att patienter noga övervakas för symtom på neuropati såsom brännande känsla, hyperestesi, hypoestesi, parestesi, obehagskänsla, neuropatisk smärta eller svaghet.

I fas III-studien som jämförde intravenös och subkutan administrering av bortezomib var incidensen av grad  $\geq 2$  perifera neuropatiepisoder 24 % i gruppen med subkutan injektion och 41 % i gruppen med intravenös injektion ( $p=0,0124$ ). Grad  $\geq 3$  perifer neuropati inträffade hos 6 % av patienterna i den subkutana behandlingsgruppen, jämfört med 16 % i den intravenösa behandlingsgruppen ( $p=0,0264$ ). Incidensen av alla grader av perifer neuropati med bortezomib som administrerats intravenöst var lägre i de historiska studierna där bortezomib administrerats intravenöst än i studien MMY-3021.

Patienter som drabbas av ny eller förvärrad perifer neuropati ska genomgå neurologisk utvärdering och kan behöva förändring av



dos, dosschema eller byte av administreringsväg till subkutan injektion (se avsnitt Dosering). Neuropati har hanterats med understödjande och annan behandling.

Tidig och regelbunden övervakning av symtom på behandlingsrelaterad neuropati med neurologisk utvärdering skall övervägas hos patienter som får bortezomib i kombination med läkemedel som är kända för att vara associerade med neuropati (t.ex .talidomid) och lämplig dosreduktion eller avbruten behandling bör övervägas.

Utöver perifer neuropati kan det föreligga bidrag av autonom neuropati till biverkningar såsom blodtrycksfall vid ändrad kroppsställning och allvarlig förstoppning med tarmvred. Informationen om autonom neuropati och dess bidrag till dessa oönskade effekter är begränsad.

### Krampanfall

Krampanfall har rapporterats i mindre vanlig utsträckning hos patienter utan tidigare krampanfall eller epilepsi i sjukdomshistorien. Särskild försiktighet erfordras när patienter med någon riskfaktor för krampanfall behandlas.

### Hypotension

Behandling med bortezomib är ofta förknippad med ortostatisk hypotension. Flertalet biverkningar är milda eller måttligt svåra till sin natur och observeras under hela behandlingsförloppet. De patienter som utvecklade ortostatisk hypotension under behandlingen med bortezomib (intravenös injektion) uppvisade inga tecken på ortostatisk hypotension före behandlingen med bortezomib. Flertalet patienter behövde behandlas för sin

ortostatiska hypotension. Ett fåtal patienter med ortostatisk hypotension drabbades av episoder av synkope. Ortostatisk hypotension var inte akut relaterad till bolusinfusion av bortezomib. Verkningsmekanismen hos denna biverkan är inte känd även om en komponent kan bero på autonom neuropati. Autonom neuropati kan vara relaterad till bortezomib, eller bortezomib kan förvärra ett bakomliggande tillstånd såsom diabetesneuropati eller amyloidotisk neuropati. Försiktighet tillråds vid behandling av patienter med synkope i sjukdomshistorien som behandlas med läkemedel med hypotension som känd biverkan, eller som är dehydrerade på grund av upprepade diarréer eller upprepade kräkningar. Behandling av ortostatisk hypotension kan innefatta inställning av blodtrycksläkemedel, rehydrering eller administrering av mineralkortikosteroider och/eller sympatomimetika. Patienterna bör instrueras att söka läkare om de får symtom såsom yrsel eller svimningsanfall.

### Posterioert reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

PRES har rapporterats hos patienter som fått bortezomib. PRES är ett sällsynt, ofta reversibelt snabbt utvecklande neurologiskt tillstånd, som kan förekomma med kramper, hypertoni, huvudvärk, letargi, förvirring, blindhet och andra visuella och neurologiska störningar. Hjärnscanning lämpligen med magnetisk resonanstomografi (MRT) används för att säkerställa diagnos. Hos patienter som utvecklar PRES, ska behandling med bortezomib avbrytas.

### Hjärtsvikt

Akut utveckling eller försämring av hjärtsvikt, och/eller debut av nedsatt ejektionsfraktion vänster kammare har rapporterats under behandling med bortezomib. Vätskeansamling kan vara en

predisponerande faktor för symtom på hjärtsvikt. Patienter med riskfaktorer för eller existerande hjärtsjukdom ska följas noggrant.

### Elektrokardiografi

Enstaka fall av QT-förlängning har rapporterats i kliniska prövningar, kausalitet har inte fastställts.

### Lungpåverkan

Sällsynta fall av akut infiltrativ lungsjukdom av okänd etiologi såsom pneumonit, interstitiell pneumoni, lunginfiltration och akut svår andningsinsufficiens (ARDS) har rapporterats hos patienter som behandlats med bortezomib (se avsnitt Biverkningar). Några av dessa händelser har haft dödlig utgång. Det rekommenderas att en lungröntgen görs före behandlingen för att ha som ett utgångsläge vid eventuella lungförändringar efter behandlingen. I händelse av nya eller förvärrade lungsymtom (t.ex. hosta, dyspné) ska en diagnostisk utvärdering utföras omgående och patienten ska behandlas på lämpligt sätt. Hänsyn ska tas till risk/nyttaförhållandet innan behandlingen med bortezomib fortsätter.

I en klinisk prövning tillfördes cytarabin i högdos (2 g/m<sup>2</sup> per dag) genom kontinuerlig infusion under 24 timmar med daunorubicin och bortezomib som behandling för recidiverande akut myeloisk leukemi. Två patienter (av två) avled av ARDS tidigt under behandlingsprogrammet och studien avbröts. Därför rekommenderas inte denna särskilda regim med samtidig administrering av cytarabin i högdos (2 g/m<sup>2</sup> per dag) genom kontinuerlig infusion under 24 timmar.

### Nedsatt njurfunktion

Njurkomplikationer är vanliga hos patienter med multipelt myelom. Patienter med nedsatt njurfunktion ska övervakas noga (se avsnitten Dosering och Farmakokinetik).

### Nedsatt leverfunktion

Bortezomid metaboliseras av leverenzymerna. Exponeringen av bortezomid är ökad hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion. Dessa patienter ska behandlas med bortezomid i reducerade doser och ska övervakas noggrant med avseende på toxicitet (se avsnitt Dosering och Farmakokinetik).

### Leverpåverkan

Sällsynta fall av leversvikt har rapporterats hos patienter som får bortezomid och samtidig medicinering med andra läkemedel och med underliggande allvarliga medicinska tillstånd. Annan rapporterad leverpåverkan inkluderar förhöjda leverenzymerna, hyperbilirubinemi och hepatit. Dessa förändringar kan vara reversibla när behandlingen med bortezomid avslutas (se avsnitt Biverkningar).

### Tumörcellsnekros med lytiskt syndrom

Eftersom bortezomid är ett cytotoxiskt läkemedel som snabbt kan döda maligna plasmaceller och MCL-celler kan komplikationer förknippade med tumörcellsnekros med lytiskt syndrom uppträda. De patienter som har en stor tumörbörda före behandlingen löper hög risk att drabbas av detta. Dessa patienter bör övervakas noga, och adekvata försiktighetsåtgärder bör vidtas.

### Samtidigt givna läkemedel

Patienter som får bortezomid tillsammans med potenta CYP3A4-inhibitorer ska övervakas noga. Försiktighet ska iakttas när

bortezomib kombineras med CYP3A4- eller CYP2C19-substrat (se avsnitt Interaktioner).

Normal leverfunktion bör bekräftas och försiktighet bör iakttas hos patienter som behandlas med orala diabetesmedel (se avsnitt Interaktioner).

### Reaktioner som kan vara immunkomplex-medierade

Reaktioner som kan vara immunkomplex-medierade, såsom serumsjuka, polyartrit med hudutslag och proliferativ glomerulonefrit har rapporterats som mindre vanliga. Behandling med bortezomib ska avbrytas om allvarliga reaktioner inträffar.

### Bortezomib Stada innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, dvs. är näst intill "natriumfritt".

## **Interaktioner**

*In vitro*-studier antyder att bortezomib är en svag hämmare av cytokrom P450 (CYP) 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A4. Baserat på det begränsade bidraget (7 %) av CYP2D6 till metabolismen av bortezomib förväntas inte genetiskt betingad låg CYP2D6 aktivitet påverka den totala dispositionen av bortezomib.

I en interaktionsstudie mellan läkemedel studerades effekten av ketokonazol, en potent CYP3A4- hämmare, på farmakokinetiken för bortezomib (intravenös injektion). Baserat på data från 12 patienter sågs en ökning av AUC för bortezomib med i genomsnitt 35 % (CI90% [1,032 till 1,772]). Därför ska patienter följas noggrant då de ges bortezomib i kombination med potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, ritonavir).

I en interaktionsstudie mellan läkemedel studerades effekten av omeprazol, en potent CYP2C19- hämmare, på farmakokinetiken för bortezomib (intravenös injektion). Ingen signifikant effekt på bortezomibs farmakokinetik påvisades baserat på data från 17 patienter.

I en interaktionsstudie mellan läkemedel studerades effekten av rifampicin, en potent CYP3A4- inducerare, på farmakokinetiken för bortezomib (intravenös injektion). Baserat på data från 6 patienter sågs en minskning av AUC för bortezomib med i genomsnitt 45 %. Samtidig användning av bortezomib och starka CYP3A4-inducerare (t.ex. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital och johannesört) rekommenderas därför inte eftersom effekten kan försämrans.

I samma interaktionsstudie mellan läkemedel studerades effekten av dexametason, en svagare CYP3A4-inducerare, på farmakokinetiken för bortezomib (intravenös injektion). Ingen signifikant effekt på bortezomibs farmakokinetik påvisades baserat på data från 7 patienter.

En interaktionsstudie mellan läkemedel, som utvärderade effekten av melfalan-prednison på farmakokinetiken för bortezomib (intravenös injektion), visade en genomsnittlig ökning av AUC för bortezomib med 17 % baserat på data från 21 patienter. Detta anses inte kliniskt relevant.

I kliniska prövningar rapporterades hypoglykemi och hyperglykemi i mindre vanlig och vanlig utsträckning hos patienter med diabetes vilka behandlades med orala diabetesläkemedel. Patienter som

behandlas med orala diabetesläkemedel och med bortezomib kan behöva täta kontroller av sina blodglukosnivåer och dosen av diabetesläkemedlet kan behöva anpassas.

### Pediatrik population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

## **Graviditet**

### Födelsekontroll hos män och kvinnor

Män och kvinnor i fertil ålder måste använda effektiva preventivmetoder under behandling och i tre månader efter behandling.

### Graviditet

Inga kliniska data finns tillgängliga för bortezomib vad gäller exponering under graviditet. Den teratogena potentialen för bortezomib har inte utretts fullständigt.

I prekliniska studier hade bortezomib ingen effekt på fosterutvecklingen hos råtta och kanin vid den högsta dos som tolererades av modern. Djurstudier för att bestämma effekten av bortezomib på nedkomsten eller den post-natala utvecklingen har inte utförts (se avsnitt 'Prekliniska uppgifter'). Bortezomib ska användas under graviditet endast då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med bortezomib. Om bortezomib används under graviditet eller om patienten blir gravid under behandlingen med läkemedlet ska patienten informeras om den potentiella risken för fostret.

Talidomid är känd som en humant teratogen aktiv substans som orsakar svåra livshotande fosterskador. Talidomid är kontraindicerat vid graviditet och till kvinnor i fertil ålder så tillvida inte alla kriterier i det graviditetsförebyggande programmet för talidomid är uppfyllda. Patienter som får bortezomib i kombination med talidomid ska ta del av det graviditetsförebyggande programmet för talidomid. Se produktresumén för talidomid för ytterligare information.

## **Amning**

Det är inte känt om bortezomib utsöndras i human modersmjölk. På grund av risken för allvarliga biverkningar hos ammade barn ska amning avbrytas under behandling med bortezomib.

## **Fertilitet**

Fertilitetsstudier med bortezomib har inte utförts (se avsnitt 'Prekliniska uppgifter').

## **Trafik**

Bortezomib kan ha måttlig inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Bortezomib kan vara förknippat med trötthet (mycket vanligt), yrsel (vanligt), synkope (mindre vanligt) och ortostatisk/postural hypotension eller dimsyn (vanligt). Därför måste patienter vara försiktiga vid bilkörning eller vid användning av maskiner och ska avrådas från att köra bil eller använda maskiner om de upplever dessa symtom (se avsnitt Biverkningar).

## **Biverkningar**

### Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Allvarliga biverkningar rapporterade som mindre vanliga under behandling med bortezomib inkluderar hjärtsvikt,



tumörlyssyndrom, pulmonell hypertoni, posterioert reversibelt encefalopatisyndrom, akut diffus infiltrativ lungsjukdom och som sällsynt rapporterades autonom neuropati. De vanligaste rapporterade biverkningarna under behandling med bortezomib är illamående, diarré, förstoppning, kräkningar, utmattning, pyrexia, trombocytopeni, anemi, neutropeni, perifer neuropati (inklusive sensorisk), huvudvärk, parestesi, minskad aptit, dyspné, utslag, herpes zoster och myalgi.

## Biverkningstabell

### *Multipelt myelom*

Biverkningarna i tabell 7 ansågs av prövarna ha åtminstone ett möjligt eller troligt orsakssamband med bortezomib. Dessa biverkningar baseras på en integrerad dataserie med 5 476 patienter varav 3 996 behandlades med bortezomib 1,3 mg/m<sup>2</sup> och är inkluderade i tabell 7. Totalt administrerades bortezomib för behandling av multipelt myelom hos 3 974 patienter.

Biverkningarna presenteras nedan, uppdelat på klass av organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: Mycket vanliga ( $\geq 1/10$ ); vanliga ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); mindre vanliga ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ); sällsynta ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ); mycket sällsynta ( $< 1/10000$ ), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Tabell 7 har skapats genom att använda version 14.1 av MedDRA. Biverkningar som observerats efter marknadsintroduktion, men inte i kliniska prövningar, ingår också.

Tabell 7: Biverkningar hos patienter med multipelt myelom behandlade med bortezomib i kliniska prövningar och alla biverkningar efter marknadsintroduktion oavsett indikation<sup>#</sup>

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
Infektioner och infestationer	Vanliga	Herpes zoster (inkl. disseminerad och oftalmisk) Lunginflammation* Herpes simplex* Svampinfektion*
	Mindre vanliga	Infektion* Bakteriella infektioner* Virala infektioner* Sepsis (inkl. septisk chock)* Bronkopneumoni Herpesvirusinfektion* Herpesviral meningoencefalit <sup>#</sup> Bakteriemi (inklusive stafylokocker) Hordeolum Influensa Cellulit Lokal infektion vid intravenös infart Hudinfektion* Öroninfektion* Stafylokockinfektion

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Tandinfektion*
	Sällsynta	Meningit (inkl. bakteriell) Epstein-Barr-virusinfektion Genital herpes Tonsillit, Mastoidit Postviralt trötthetssyndrom
Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)	Sällsynta	Maligna neoplasmer Plasmacytisk leukemi Njurcellskarcinom Knölar Mycosis fungoides Benigna neoplasmer*
Blodet och lymfsystemet	Mycket vanliga	Trombocytopeni* Neutropeni* Anemi*
	Vanliga	Leukopeni* Lymfopeni*
	Mindre vanliga	Pancytopeni* Febril neutropeni Koagulopati* Leukocytos* Lymfadenopati Hemolytisk anemi <sup>#</sup>
	Sällsynta	Disseminerad intravasal koagulation Trombocytos*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Hyperviskositetssyndrom Trombocytsjukdom UNS Trombotisk mikroangiopati (inkl. trombocytopen purpura) # Blodsjukdom UNS Blödningsbenägenhet Lymfocyt infiltration
Immunsystemet	Mindre vanliga	Angioödem# Överkänslighet*
	Sällsynta	Anafylaktisk chock Amyloidos Typ III immunkomplexmedierad reaktion
Endokrina systemet	Mindre vanliga	Cushings syndrom* Hypertyreoidism* Inadekvat insöndring av antidiuretiskt hormon
	Sällsynta	Hypotyreoidism
Metabolism och nutrition	Mycket vanliga	Nedsatt aptit
	Vanliga	Dehydrering
		Hypokalemi* Hyponatremi* Onormalt blodglukos*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Hypokalcemi* Enzymabnormalitet*
	Mindre vanliga	Tumörlyssyndrom Failure to thrive* Hypomagnesemi* Hypofosfatemi* Hyperkalemi* Hyperkalcemi* Hypernatremi* Onormalt urinsyra* Diabetes mellitus* Vätskeretention
	Sällsynta	Hypermagnesemi* Acidos Elektrolytobalans* Övervätskning Hypokloremi* Hyperkloremi* Hypovolemi Hyperfosfatemi* Metabola störningar B-vitaminkomplexbrist B12-vitaminbrist Gikt Ökad aptit Alkoholintolerens
Psykiska störningar	Vanliga	Humörpåverkan och störningar* Oro*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Sömnpåverkan och störningar*
	Mindre vanliga	Psykisk störning* Hallucinationer * Psykotisk störning* Förvirring* Rastlöshet
	Sällsynta	Själv mordstankar* Anpassningsstörning Delirium Minskad libido
Centrala och perifera nervsystemet	Mycket vanliga	Neuropatier* Perifer sensorisk neuropati Dysestesi* Neuralgi*
	Vanliga	Motorisk neuropati* Medvetslöshet (inkl. synkope) Yrsel* Dysgeusi* Letargi Huvudvärk*
	Mindre vanliga	Tremor Perifer sensomotorisk neuropati Dyskinesi* Cerebellära koordinations- och balansstörningar*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Minnesförlust (exkl. demens)* Encefalopati* Posterior reversibelt encefalopatisyndrom # Neurotoxicitet Krampsjukdomar* Postherpetisk neuralgi Talstörning* Rastlösa ben-syndrom Migrän Ischias Uppmärksamhetsstörning Onormala reflexer* Parosmi
	Sällsynta	Cerebral blödning* Intrakraniell blödning (inkl. subaraknoidal)* Hjärnödem Transitorisk ischemisk attack Koma Obalans i autonoma nervsystemet Autonom neuropati Kraniell pares* Paralys*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Pares* Presynkope Hjärnstamssyndrom Cerebrovaskulära störningar Nervrotskada Psykomotorisk hyperaktivitet Ryggmärgskompression Kognitiv störning UNS Motorisk dysfunktion Sjukdom i nervsystemet UNS Radikulit Dregling Hypotoni Guillain-Barrés syndrom# Demyeliniserande polyneuropati#
Ögon	Vanliga	Ögonsvullnad* Onormal syn* Konjunktivit*
	Mindre vanliga	Ögonblödning* Ögonlocksinfektion* Chalazion# Blefarit#



Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Ögoninflammation* Diplopi Torra ögon* Ögonirritation* Ögonsmärta Ökad tårsekretion Flytningar från ögat
	Sällsynta	Hornhinneskada* Exoftalmus Retinit Skotom Ögonsjukdom (inklusive ögonlock) UNS Förvärvad dakryoadenit Fotofobi Fotopsi Optisk neuropati# Olika grader av synförsämring (upp till blindhet)*
Öron och balansorgan	Vanliga	Vertigo*
	Mindre vanliga	Dysakusi (inkl. tinnitus)* Nedsatt hörsel (upp till och inkl. dövhet) Öronobehag*
	Sällsynta	Öronblödning

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Vestibulär neuronit Öronsjukdom UNS
Hjärtat	Mindre vanliga	Hjärttamponad <sup>#</sup> Hjärt-lungstillestånd* Hjärtflimmer (inkl. för maksflimmer) Hjärtsvikt (inkl. vänster och höger kammare)* Arytmi* Takykardi* Palpitationer Angina pectoris Perikardit (inkl. perikardiell effusion)* Kardiomyopati* Ventrikulär dysfunktion* Bradykardi
	Sällsynta	Förmaksfladder Hjärtinfarkt* AV-block* Kardiovaskulär sjukdo m (inkl. kardiogen ch ock) Torsade de pointes Instabil angina Hjärtklaffssjukdom* Kransartärinsufficiens Sinusarrest

<b>Klass av organsystem</b>	<b>Frekvens</b>	<b>Biverkningar</b>
Blodkärl	Vanliga	Hypotoni* Ortostatisk hypotoni Hypertoni*
	Mindre vanliga	Cerebrovaskulär händelse <sup>#</sup> Djup ventrombos* Blödning* Tromboflebit (inkl. yttlig) Cirkulatorisk kollaps (inkl. hypovolemisk chock) Flebit Rodnad* Hematom (inkl. perirenalt)* Dålig perifer cirkulation* Vaskulit Hyperemi (inkl. okulär)*
	Sällsynta	Perifer emboli Lymfödem Blekhet Erytromelalgi Vasodilatation Missfärgning av vener Venös insufficiens
	Vanliga	Dyspné* Epistaxis

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
Andningsvägar, bröstkorg och medias tinum		Övre/nedre luftvägsinfektion* Hosta*
	Mindre vanliga	Lungemboli Pleurautgjutning Lungödem (inkl. akut) Lungalveolblödning <sup>#</sup> Bronkospasm KOL* Hypoxemi* Trånghets känsla i luftvägarna* Hypoxi Pleurit* Hicka Rinorré Dysfoni Väsande andning
	Sällsynta	Andningssvikt Akut andnödssyndro m Apné Pneumotorax Atelektas Pulmonell hypertoni Hemoptys Hyperventilering Ortopné Pneumonit Respiratorisk alkalos

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Takypné Lungfibros Bronkialsjukdom* Hypokapni* Interstitiell lungsjukdom Lunginfiltration Trånghets känsla i halsen Torr hals Ökad övre luftvägssekretion Halsirritation Baksnuva
Magtarmkanalen	Mycket vanliga	Illamående och kräkning* Diarré* Förstoppning
	Vanliga	Gastrointestinal blödn ing (inkl. mukosal)* Dyspepsi Stomatit* Utspänd buk Smärta i mun och svalg* Buksmärta (inkl. gastr ointestinal smärta och smärta i mjälten)* Munstörningar* Flatulens

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
	Mindre vanliga	Pankreatit (inkl. kronisk)* Hematemes Läppsvullnad* Gastrointestinal obstruktion (inkl. tunntarmsobstruktion, ileus)* Obehagskänsla i buken Munsår* Enterit* Gastrit* Blödning i tandköttet Gastroesofageal refluxsjukdom* Kolit (inkl. Clostridium difficile)* Ischemisk kolit# Gastrointestinal inflammation* Dysfagi Colon irritabile Gastrointestinal sjukdom UNS Beläggningar på tungan Gastrointestinal motilitetsstörning* Spottkörtelsjukdom*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
	Sällsynta	Akut pankreatit Peritonit* Tungödem* Ascites Esofagit Keilit Fekal inkontinens Analsfinkterförslappning Fekalom* Gastrointestinal sårbildning och perforering* Tandköttshypertrofi Megakolon Rektalt utflöde Orofaryngeal blåsbildning* Läppsmärta Parodontit Analfissur Ändrade avföringsvanor Proktalgi Onormal avföring
Lever och gallvägar	Vanliga	Abnormala leverenzymmer*
	Mindre vanliga	Hepatotoxicitet (inkl. leversjukdom) Hepatit*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Kolestas
	Sällsynta	Leversvikt Hepatomegali Budd-Chiaris syndrom Cytomegalovirushepatit Hepatisk blödning Kolelitis
Hud och subkutan vävnad	Vanliga	Utslag* Pruritus* Erytem Torr hud
	Mindre vanliga	Erythema multiforme Urtikaria Akut febril neutrofil dermatos Toxiskt hudutslag Toxisk epidermal nekrolys# Stevens-Johnsons syndrom# Dermatit* Hårsjukdom* Petekier Ekkymos Hudskada Purpura Hudknölar* Psoriasis



Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Hyperhidros Nattsvette Trycksår <sup>#</sup> Akne* Blåsor* Missfärgning av huden*
	Sällsynta	Hudreaktion Jessners lymfocytära infiltrat Palmoplantart erytrodysestesisyndrom Subkutana blödningar Livedo reticularis Hudinduration Papula Ljuskänslighetsreaktion Seborré Kallsvette Hudsjukdomar UNS Erytros Hudsår Nagelproblem
Muskuloskeletala systemet och bindväv	Mycket vanliga	Muskuloskeletal smärta*
	Vanliga	Muskelspasmer* Värk i extremiteter Muskelsvaghet

<b>Klass av organsystem</b>	<b>Frekvens</b>	<b>Biverkningar</b>
	Mindre vanliga	Muskelryckningar Ledsvullnad Artrit* Stelhet i leder Myopatii* Tyngdkänsla
	Sällsynta	Rabdomyolys Käkledssyndrom Fistel Ledutgjutning Käksmärta Bensjukdom Muskuloskeletal- och bindvävsinfektioner och inflammationer* Synovialcysta
Njurar och urinvägar	Vanliga	Njurfunktionsnedsättning*
	Mindre vanliga	Akut njursvikt Kronisk njursvikt* Urinvägsinfektion* Urinvägsbesvär- och symtom* Hematuri* Urinretention Miktionsstörningar* Proteinuri Azotemi Oliguri* Pollakisuri

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
	Sällsynta	Irritation i urinblåsan
Reproduktionsorgan och bröstkörtel	Mindre vanliga	Vaginal blödning Genital smärta* Erektill dysfunktion
	Sällsynta	Testikelsjukdomar* Prostatit Bröstsjukdomar hos kvinnor Epididymal ömhet Epididymit Bäckensmärta Sår i vulva
Medfödda och/eller genetiska störningar	Sällsynta	Aplasi Gastrointestinala missbildningar Iktyos
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället	Mycket vanliga	Pyrexi* Trötthet Asteni
	Vanliga	Ödem (inkl. perifert) Frossbrytningar Smärta* Sjukdomskänsla*
	Mindre vanliga	Nedsatt allmäntillstånd* Ansiktsödem* Reaktion vid injektionsstället* Slemhinnesjukdom*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Bröstsmärta Gånggrubbning Köldkänsla Extravasering* Kateterrelaterad komplikation* Törst Obehagskänsla i bröstet Känsla av kroppstemperaturförändring* Smärta vid injektionsstället*
	Sällsynta	Dödsfall (inkl. plötsligt) Multiorgansvikt Blödning vid injektionsstället* Hernia (inkl. hiatus)* Försämrad läkning* Inflammation Flebit vid injektionsstället* Ömhet Sår Irritabilitet Icke-kardiell bröstsmärta Smärta vid kateter

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Känsla av främmande kropp
Undersökningar	Vanliga	Viktminskning
	Mindre vanliga	Hyperbilirubinemi* Proteinanalys onormalt* Viktökning Blodprov onormalt* Ökat C-reaktivt protein
	Sällsynta	Onormala blodgaser* Onormalt elektrokardiogram (inkl. QT-förlängning)* Onormal internationell normaliserad kvot (INR)* Minskat pH i magsäcken Ökad aggregering av blodplättar Ökat troponin I Virusidentifiering och serologi* Urinalanalys onormalt*
Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer	Mindre vanliga	Fall Blåmärke
	Sällsynta	Transfusionsreaktion Frakturer*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkningar
		Frossa* Ansiktsskada Ledskada* Brännskador Sårskada Procedurmässiga smärtor Strålningsskador*
Kirurgiska och medicinska åtgärder	Sällsynta	Makrofagaktivering

UNS=utan närmare specifikation

\* Indikerar termer där mer än en MedDRA-term är inkluderad

# Biverkning efter marknadsintroduktion oavsett indikation

### *Mantelcellslymfom (MCL)*

Säkerhetsprofilen hos bortezomib hos 240 patienter med MCL behandlade med bortezomib i dosen 1,3 mg/m<sup>2</sup> i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (BoR-CAP) och den hos 242 patienter behandlade med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednison [R-CHOP] var relativt likvärdig med den som observerats hos patienter med multipelt myelom med undantag för de huvudsakliga skillnader som beskrivs nedan. Ytterligare biverkningar som förknippades med kombinationsbehandling (BoR-CAP) var hepatit B-infektion (<1 %) och myokardis kemi (1,3 %). De jämförbara incidenserna av dessa händelser i båda behandlingsgrupperna tyder på att dessa biverkningar inte beror på bortezomib ensamt. Anmärkningsvärda skillnader i populationen med MCL jämfört med patienter i studierna av multipelt myelom var ≥5 % högre incidens av

hematologiska biverkningar (neutropeni, trombocytopeni, leukopeni, anemi, lymfopeni), perifer sensorisk neuropati, hypertoni, pyrexia, pneumoni, stomatit och hårsjukdom.

Biverkningar som identifierats med  $\geq 1$  % incidens, jämförbar eller högre incidens i

BoR-CAP-gruppen och med minst ett möjligt eller troligt orsakssamband med komponenterna i BoR-CAP-gruppen anges i

tabell 8 nedan. Även biverkningar som identifierats i BoR-CAP-gruppen och som prövarna ansåg ha minst ett möjligt eller troligt orsakssamband med bortezomib baserat på historiska data i studierna av multipelt myelom är inkluderade.

Biverkningarna presenteras nedan, uppdelat på klass av

organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: Mycket vanliga ( $\geq 1/10$ ); vanliga ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); mindre vanliga ( $\geq 1/1000$ ,

$< 1/100$ ); sällsynta ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ); mycket sällsynta ( $< 1/10000$ ), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Tabell 8 har skapats genom att använda MedDRA version 16.

*Tabell 8: Biverkningar hos patienter med mantelcellslymfom behandlade med BoR-CAP i en klinisk prövning*

<b>Klass av organsystem</b>	<b>Frekvens</b>	<b>Biverkning</b>
Infektioner och infestationer	Mycket vanliga	Lunginflammation*
	Vanliga	Sepsis (inkl. septisk chock)*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkning
		Herpes zoster (inkl. disseminerad och oftalmisk) Herpesvirusinfektion* Bakteriella infektioner* Övre/nedre luftvägsinfektion* Svampinfektion* Herpes simplex*
	Mindre vanliga	Hepatit B Infektion* Bronkopneumoni
Blodet och lymfsystemet	Mycket vanliga	Trombocytopeni* Febril neutropeni Neutropeni* Leukopeni* Anemi* Lymfopeni*
	Mindre vanliga	Pancytopeni*
Immunsystemet	Vanliga	Överkänslighet*
	Mindre vanliga	Anafylaktisk reaktion
Metabolism och nutrition	Mycket vanliga	Nedsatt aptit
	Vanliga	Hypokalemi* Onormalt blodglukos* Hyponatremi* Diabetes mellitus* Vätskeretention
	Mindre vanliga	Tumörlyssyndrom



<b>Klass av organsystem</b>	<b>Frekvens</b>	<b>Biverkning</b>
Psykiska störningar	Vanliga	Sömnpåverkan och störningar*
Centrala och perifera nervsystemet	Mycket vanliga	Perifer sensorisk neuropati Dysestesi* Neuralgi*
	Vanliga	Neuropatier* Motorisk neuropati* Medvetslöshet (inkl. synkope) Encefalopati* Perifer sensorimotorisk neuropati Yrsel* Dysgeusi* Autonom neuropati
	Mindre vanliga	Obalans i autonoma nervsystemet
Ögon	Vanliga	Onormal syn*
Öron och balansorgan	Vanliga	Dysakusi (inkl. tinnitus)*
	Mindre vanliga	Vertigo* Nedsatt hörsel (upp till och inkl. dövhet)
Hjärtat	Vanliga	Hjärtflimmer (inkl, atriellt) Arytmi*

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkning
		Hjärtsvikt (inkl. vänster och höger kammare)* Myokardiell ischemi Ventrikulär dysfunktion*
	Mindre vanliga	Kardiovaskulär sjukdom (inkl. kardiogen chock)
Blodkärl	Vanliga	Hypertoni* Hypotoni* Ortostatisk hypotoni
Andningsvägar, bröstorg och mediastinum	Vanliga	Dyspné* Hosta* Hicka
	Mindre vanliga	Akut andnödssyndrom Lungemboli Pneumonit Pulmonell hypertoni Lungödem (inkl. akut)
Magtarmkanalen	Mycket vanliga	Illamående och kräkningssymtom* Diarré* Stomatit* Förstoppning
	Vanliga	Gastrointestinal blödning (inkl. mukosal)* Utspänd buk

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkning
		Dyspepsi Orofaryngeal smärta* Gastrit* Munsår* Obehagskänsla i buken Dysfagi Gastrointestinal inflammation* Buksmärta (inkl. gastrointestinal smärta och smärta i mjälten)* Munbesvär*
	Mindre vanliga	Kolit (inkl. Clostridium difficile)*
Lever och gallvägar	Vanliga	Hepatotoxicitet (inkl. leversjukdom)
	Mindre vanliga	Leversvikt
Hud och subkutan vävnad	Mycket vanliga	Hårsjukdom*
	Vanliga	Pruritus* Dermatit* Utslag*
Muskuloskeletala systemet och bindväv	Vanliga	Muskelspasmer* Muskuloskeletal smärta* Värk i extremiteter
Njurar och urinvägar	Vanliga	Urinvägsinfektion*
	Mycket vanliga	Pyrexia* Trötthet

Klass av organsystem	Frekvens	Biverkning
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället		Asteni
	Vanliga	Ödem (inkl. perifert) Frossa Reaktion vid injektionsstället* Sjukdomskänsla*
Undersökningar	Vanliga	Hyperbilirubinemi* Onormala proteinanalyser* Viktminskning Viktökning

\* Indikerar termer där mer än en MedDRA-term är inkluderad.

### Beskrivning av utvalda biverkningar

#### *Reaktivering av Herpes Zoster-virus*

##### Multipelt myelom

Profylaktisk behandling med virushämmande medel administrerades till 26 % av patienterna i Bo+M+P-armen. Incidensen av Herpes Zoster hos patienterna i Bo+M+P-behandlingsgruppen var 17 % för patienter som inte erhöll virushämmande medel profylaktiskt jämfört med 3 % för patienter som erhöll virushämmande medel profylaktiskt.

##### Mantelcellslymfom

Antiviral profylax administrerades till 137 av 240 patienter (57 %) i BoR-CAP-gruppen. Incidensen av herpes zoster bland patienter i

BoR-CAP-gruppen var 10,7 % hos patienter som inte fick antiviral profylax jämfört med 3,6 % hos patienter som fick antiviral profylax (se avsnitt Varningar och försiktighet).

### *Hepatit B (HBV) -virusreakivering och -infektion*

#### Mantelcellslymfom

HBV-infektion med dödlig utgång inträffade hos 0,8 % (n = 2) av patienterna i behandlingsgruppen som inte fick bortezomib (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednison; R-CHOP) och hos 0,4 % (n = 1) av patienterna som fick bortezomib i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (BoR-CAP). Den totala incidensen av hepatit B-infektion er var jämförbar hos patienter behandlade med BoR-CAP eller R-CHOP (0,8 % respektive 1,2 %).

### *Perifer neuropati vid kombinationsbehandling*

#### Multipelt myelom

I kliniska studier där bortezomib gavs som induktionsbehandling i kombination med dexametason (studie IFM-2005-01) och dexametason-talidomid (studie MMY-3010), var incidensen av perifer neuropati vid kombinationsbehandlingarna enligt vad som anges i tabellen nedan:

*Tabell 9: Incidens av perifer neuropati under induktionsterapi redovisat som toxicitet och avbruten behandling till följd av perifer neuropati*

	IFM-2005-01		MMY-3010	
	VDDx (N=239)	BoDx (N=239)	TDx (N=126)	BoTDx (N=130)

Incidens av PN (%)				
PN alla grader	3	15	12	45
PN ≥grad 2	1	10	2	31
PN ≥grad 3	<1	5	0	5
Avbruten behandling till följd av PN (%)	<1	2	1	5

VDDx=vinkristin, doxorubicin, dexametason

BoDx=bortezomib, dexametason

TDx=talidomid, dexametason

BoTDx=bortezomib, talidomid, dexametason

PN=perifer neuropati

Observera: Perifer neuropati inkluderade följande rekommenderade termer: perifer neuropati, perifer motorisk neuropati, perifer sensorisk neuropati och polyneuropati.

### Mantelcellslymfom

I studie LYM-3002 där bortezomib administrerades med rituximab, cyklofosamid, doxorubicin och prednison (R-CAP) presenteras incidensen av perifer neuropati för kombinationsbehandlingarna i tabellen nedan:

*Tabell 10: Incidens av perifer neuropati i studie LYM-3002 vid toxicitet och behandlingsavbrott på grund av perifer neuropati*

			BoR-CAP (N=240)		R-CHOP (N=242)
--	--	--	--------------------	--	-------------------

Incidens av PN (%)				
PN alla Grader		30		29
PN ≥ grad 2		18		9
PN ≥ grad 3		8		4
Avbruten behandling till följd av PN (%)		2		<1

BoR-CAP=bortezomib, rituximab, cyklofosamid, doxorubicin och prednison; R-CHOP= rituximab, cyklofosamid, doxorubicin, vinkristin och prednison; PN=perifer neuropati

Perifer neuropati inkluderade rekommenderade termer: perifer sensorisk neuropati, perifer neuropati, perifer motorisk neuropati och perifer sensomotorisk neuropati

### *Äldre patienter med MCL*

42,9 % och 10,4 % av patienterna i BoR-CAP-gruppen var i åldern 65–74 år respektive ≥75 år. Även om BoR-CAP and R-CHOP tolererades mindre väl hos patienter ≥ 75 år var antalet allvarliga biverkningar i BoR-CAP-grupperna 68 % jämfört med 42 % i R-CHOP-gruppen.

### *Anmärkningsvärda skillnader i säkerhetsprofilen för bortezomib som monoterapi med subkutan jämfört med intravenös administrering*

Patienter som i fas III-studien fick bortezomib subkutant jämfört med intravenös administrering hade 13 % lägre total förekomst av behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller högre i toxicitet,

och en 5 % lägre förekomst av avbrytande av bortezomib. Den totala incidensen av diarré, gastrointestinal smärta och buksmärta, asteni, övre luftvägsinfektioner och perifera neuropatier var 12 %-15 % lägre i den subkutana gruppen än i den intravenösa gruppen. Incidensen av perifera neuropatier av grad 3 eller högre var dessutom 10 % lägre och andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av perifera neuropatier var 8 % lägre för den subkutana gruppen jämfört med den intravenösa gruppen.

Sex procent av patienterna fick en lokal biverkning vid subkutan administrering, huvudsakligen rodnad. Dessa biverkningar försvann med en median på 6 dagar, dosjustering krävdes hos två patienter. Två (1 %) av patienterna rapporterades ha allvarliga reaktioner; 1 fall av klåda och 1 fall av rodnad.

Incidensen av dödsfall under behandling var 5 % i den subkutana behandlingsgruppen och 7 % i den intravenösa behandlingsgruppen. Incidensen av dödsfall på grund av "progressiv sjukdom" var 18 % i den subkutana gruppen och 9 % i den intravenösa gruppen.

### *Upprepad behandling hos patienter med recidiverande multipelt myelom*

I en studie där bortezomib gavs som upprepade behandlingskur hos 130 patienter med recidiverande multipelt myelom, vilka tidigare hade minst ett partiellt svar på en bortezomib-innehållande regim, var de vanligaste biverkningarna av alla grader som inträffade hos minst 25 % av patienterna: trombocytopeni (55 %), neuropati (40 %), anemi (37 %), diarré (35 %) och förstoppning (28 %). Alla grader av perifer neuropati och perifer neuropati grad  $\geq 3$  observerades hos 40 % respektive 8,5 % av patienterna.



### *Rapportering av misstänkta biverkningar*

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se).

Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **Överdoser**

Överdoser av patienter med mer än dubbel rekommenderad dos har associerats med akut symtomatisk hypotension och trombocytopeni med dödlig utgång. För prekliniska farmakologiska kardiovaskulära säkerhetsstudier, se avsnitt Prekliniska uppgifter.

Det finns ingen känd specifik antidot vid överdoser med bortezomib. Vid eventuell överdoser måste patientens vitala funktioner övervakas och lämplig understödande behandling ges för att upprätthålla blodtryck (såsom vätska, blodtryckshöjande och/eller inotropa medel) och kroppstemperatur (se avsnitten Dosering och Varningar och försiktighet).

## **Farmakodynamik**

### Verkningsmekanism

Bortezomib är en proteasom-hämmare. Den är specifikt avsedd att hämma den chymotrypsin-liknande aktiviteten hos 26S-proteasom i mammalieceller. 26S-proteasom är ett stort proteinkomplex som

bryter ned ubiquitinerade proteiner. Metaboliseringsvägen ubiquitin-proteasom spelar en väsentlig roll i styrningen av omsättningen av specifika proteiner, varigenom homeostasen i cellen upprätthålls. Inhibering av 26S proteasom förhindrar denna riktade proteolys och påverkar ett flertal signalkaskader i cellen, vilket slutligen resulterar i att cancercellen dör.

Bortezomib är högst selektiv för proteasom. Vid en koncentration av 10  $\mu\text{M}$  inhiberar inte bortezomib någon av många studerade receptorer och proteaser och är mer än 1 500 gånger mer selektiv för proteasom än för det närmast föredragna enzymet. Kinetiken hos proteasom-inhiberingen studerades *in vitro*, och bortezomib visades dissociera från proteasom med en  $t_{1/2}$  av 20 minuter, vilket visar att proteasom-inhibition med bortezomib är reversibel.

Proteasom-hämning medierad av bortezomib påverkar cancerceller på flera sätt inklusive, men inte begränsat till, förändringar av reglerande proteiner, som kontrollerar cellcykelprogression och aktivering av nuclear factor kappa B (NF- $\kappa$ B). Inhibering av proteasom leder till cellcykelarrest och apoptos. NF- $\kappa$ B är en transkriptionsfaktor vars aktivering krävs för många aspekter av tumörbildning, inklusive celltillväxt och cellöverlevnad, angiogenes, interaktioner mellan celler och metastasbildning. Vid myelom påverkar bortezomib förmågan hos myelom-celler att interagera med mikroomgivningen i benmärgen.

Experiment har visat att bortezomib är cytotoxiskt i ett flertal typer av cancerceller och att cancerceller är känsligare för den pro-apoptotiska effekten av proteasom-inhibition än normala celler. Bortezomib förorsakar reduktion av tumörtillväxt *in vivo* i många prekliniska tumörmodeller inklusive multipelt myelom.

Data från *in vitro*, *ex vivo*, och djurmodeller tyder på att bortezomib ökar differentiering och aktivitet hos osteoblaster samt hämmar funktionen hos osteoklaster. Dessa effekter har setts hos patienter med multipelt myelom vilka har en långt framskriden osteolytisk sjukdom och som behandlats med bortezomib.

### Klinisk effekt för tidigare obehandlat multipelt myelom

En prospektiv fas III, internationell, randomiserad (1:1), öppen klinisk prövning (MMY-3002 VISTA) med 682 patienter genomfördes för att fastställa huruvida bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup> intravenös injektion) i kombination med melfalan (9 mg/m<sup>2</sup>) and prednison (60 mg/m<sup>2</sup>) resulterade i förbättring av tid till progression (TTP) jämfört med melfalan (9 mg/m<sup>2</sup>) och prednison (60 mg/m<sup>2</sup>) till patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom. Behandlingen administrerades i maximalt 9 cykler (cirka 54 veckor) och avbröts tidigt vid sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Medianåldern för patienterna i studien var 71 år, 50 % var män, 88 % var kaukasier och medianen för Karnofsky performance status score var 80. Patienterna hade IgG /IgA /light chain myelom i 63 %/ 25 %/ 8 % av fallen, hemoglobin på en median av 105 g/l och ett mediantrombocytantal på  $221,5 \times 10^9/l$ . Liknande andelar av patienterna hade kreatininclearance på  $\leq 30$  ml/min (3 % i varje arm).

Vid tidpunkten för en i förväg specificerad interimanalys mättes tid till progression (primär endpoint) och patienter i M+P-armen erbjöds Bo+M+P-behandling. Uppföljning var i median 16,3 månader. Den finala uppdateringen av överlevnad genomfördes med en genomsnittlig (median) uppföljning på 60,1 månader. En statistiskt signifikant överlevnadsfördel observerades i Bo+M+P-

behandlingsgruppen (HR = 0,695; p = 0,00043) trots att påföljande behandlingar inkluderade bortezomib-baserade behandlingsregimer. Genomsnittlig (median) överlevnad för Bo+M+P-behandlingsgruppen var 56,4 månader jämfört med 43,1 för M+P-behandlingsgruppen. Effekresultaten presenteras i Tabell 11:

*Tabell 11: Effekresultat efter den finala uppdateringen av överlevnad i VISTA-studien*

<b>Effekt endpoint</b>	<b>Bo + M + P n=344</b>	<b>M + P n=338</b>
<b>Tid till progression</b>		
Händelser n (%)	101 (29)	152 (45)
Median <sup>a</sup> (95 % CI)	20,7 mån (17,6; 24,7)	15,0 mån (14,1; 17,9)
Hazard ratio <sup>b</sup> (95 % CI)	0,54 (0,42; 0,70)	
p-värde <sup>c</sup>	0,000002	
<b>Progressionsfri överlevnad</b>		
Händelser n (%)	135 (39)	190 (56)
Median <sup>a</sup> (95 % CI)	18,3 mån (16,6; 21,7)	14,0 mån (11,1; 15,0)
Hazard ratio <sup>b</sup> (95 % CI)	0,61 (0,49; 0,76)	
p-värde <sup>c</sup>	0,00001	
<b>Total överlevnad *</b>		
Händelser (dödsfall) n (%)	176 (51,2)	211 (62,4)
Median <sup>a</sup> (95 % CI)	56,4 mån (52,8; 60,9)	43,1 mån (35,3; 48,3)

<b>Effekt endpoint</b>	<b>Bo + M + P n=344</b>	<b>M + P n=338</b>
Hazard ratio <sup>b</sup> (95 % CI)	0,695 (0,567; 0,852)	
p-värde <sup>c c</sup>	0,00043	
<b>Svarsfrekvens</b>		
population <sup>e</sup> n=668	n=337	n=331
CR <sup>f</sup> n (%)	102 (30)	12 (4)
PR <sup>f</sup> n = (%)	136 (40)	103 (31)
nCR n (%)	5 (1)	0
CR + PR <sup>f</sup> n (%)	238 (71)	115 (35)
p-värde <sup>d</sup>	<10 <sup>-10</sup>	
<b>Reduktion i serum M-protein</b>		
population <sup>g</sup> n=667	N=336	N=331
≥90 % n (%)	151 (45)	34 (10)
Tid till första svar CR + PR		
Median	1,4 mån	4,2 mån
Median <sup>a</sup> svarsduration		
CR <sup>f</sup>	24,0 mo	12,8 mo
CR + PR <sup>f</sup>	19,9 mo	13,1 mo
<b>Tid till nästa terapi</b>		
Händelser n (%)	224 (65,1)	260 (76,9)
Median <sup>a</sup> 95 % CI	27,0 mo (24,7; 31,1)	19.2 mo (17,0; 21,0)
Hazard ratio <sup>b</sup> (95 % CI)	0,557 (0,462; 0,671)	

Effekt endpoint	Bo + M + P n=344	M + P n=338
p-värde <sup>c</sup>	<0,000001	

<sup>a</sup> Kaplan-Meier-skattning.

<sup>b</sup> Hazard ratio skattning baseras på en Cox proportional-hazard modell justerad för stratifieringsfaktorer:  $\beta_2$ -mikroglobulin, albumin, och region. En hazard ratio mindre än 1 indikerar en fördel för VMP.

<sup>c</sup> Nominellt p-värde baserat på stratifierat log-rank test justerat för stratifieringsfaktorer:  $\beta_2$ -mikroglobulin, albumin, och region.

<sup>d</sup> p-värde för svarsfrekvens (CR+PR) från Cochran-Mantel-Haenszel chi-2-test justerat för stratifieringsfaktorer.

<sup>e</sup> Svarspopulation inkluderar patienter som hade mätbar sjukdom vid baseline.

<sup>f</sup> CR (Complete Response) = fullständigt svar, PR (Partial Response) = partiellt svar. EBMT kriterier.

<sup>g</sup> Alla randomiserade patienter med sekretorisk sjukdom.

\* Överlevnadsuppdateringen är baserad på en genomsnittlig (median) durationsuppföljning på 60,1 månader.

mån: månader

CI (Confidence Interval) = konfidensintervall

### *Patienter lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation*

Två randomiserade, öppna, multicenter, fas III-studier

(IFM-2005-01, MMY-3010) utfördes för att fastställa säkerhet och

effekt av bortezomib i dubbel- och trippelkombinationer med andra

cytostatikaläkemedel, som induktionsbehandling före stamcellstransplantation hos patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom.

I studie IFM-2005-01 jämfördes bortezomib i kombination med dexametason [BoDx, n = 240] med vinkristin-doxorubicin-dexametason [VDDx, n = 242]. Patienter i BoDx-gruppen fick fyra 21 dagars cykler, var och en bestående av bortezomib ( $1,3 \text{ mg/m}^2$ ) givet intravenöst två gånger per vecka på dag 1, 4, 8, och 11), och oralt dexametason (40 mg/dag på dag 1 till 4 och dag 9 till 12, under cykel 1 och 2, och på dag 1 till 4 under cykel 3 och 4).

Autogloga stamcellstransplantationer utfördes hos 198 (82 %) och 208 (87 %) av patienterna i de respektive VDDx- och BoDx-grupperna; majoriteten av patienterna genomgick ett enda transplantationsingrepp. Patienternas demografi- och baseline-profiler var jämförbara mellan behandlingsgrupperna.

Medianåldern för patienterna i studien var 57 år, 55 % var män och 48 % av patienterna hade högriskscytogenetik. Medianen på behandlingstiden var 13 veckor för VDDx gruppen och 11 veckor för BoDx-gruppen. Medianen på antalet behandlingscykler för båda grupperna var 4 cykler. Primär endpoint för studien var behandlingssvarsfrekvensen efter induktionsbehandling CR+nCR. En statistiskt signifikant skillnad i CR+nCR observerades till förmån för gruppen som fick bortezomib i kombination med dexametason. Sekundära effektbaserade endpoints inkluderade behandlingssvar efter transplantation (CR+nCR, CR+nCR+VGPR+PR), progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad. Huvudsakliga effektresultat presenteras i Tabell 12.

*Tabell 12: Effekresultat från studie IFM-2005-01*

Endpoints	BoDx	VDDx	OR; 95 % CI; P-värde <sup>a</sup>
<b>IFM-2005-01</b>	N=240 (ITT population)	N=242 (ITT population)	
<i>RR (Efter induktion)</i>	14,6 (10,4, 19,7)	6,2 (3,5, 10,0)	2,58 (1,37, 4,85); 0,003
* CR+nCR	77,1 (71,2, 82,2)	66,9	2,18 (1,46, 3,24); <0,001
CR+nCR+VGPR+PR % (95 % CI)			
<i>RR (Efter transplantation)</i>	37,5 (31,4, 44,0)	23,1 (18,0, 29,0)	1,98 (1,33, 2,95); 0,001
<sup>b</sup>	79,6 (73,9, 84,5)	74,4 (68,4, 79,8)	1,34 (0,87, 2,05); 0,179
CR+nCR			
CR+nCR+VGPR+PR % (95 % CI)			

CI (confidence interval) = konfidensintervall; CR (complete response) = fullständigt svar; nCR (near complete response) = nära fullständigt svar; ITT = intent to treat; RR = svarsfrekvens Bo = bortezomib; BoDx = bortezomib, dexametason; VDDx = vinkristin, doxorubicin, dexametason; VGPR (very good partial response) = mycket gott partiellt svar; PR (partial response) = partiellt svar; OR (odds ratio) = oddskvot.

\* Primär endpoint

<sup>a</sup> OR för behandlingssvarsfrekvenser baserad på Mantel-Haenszel-skattning av oddskvot för stratifierade tabeller; p-värden genom Cochran-Mantel-Haenszel-test.

<sup>b</sup> Baseras på svarsfrekvens efter en andra transplantation för individer som har fått en andra transplantation (42/240 [18 %] i BoDx-gruppen och 52/242 [21 %] i VDDx-gruppen).



Observera: En OR >1 indikerar en fördel för induktionsterapi med Bo som del av behandlingen.

I studie MMY-3010 jämfördes induktionsbehandling med bortezomib i kombination med talidomid och dexametason [BoTDx, n = 130] mot talidomid-dexametason [TDx, n = 127]. Patienter i BoTDxgruppen fick sex 4-veckors cykler, var och en bestående av bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup> givet två gånger per vecka dag 1, 4, 8, och 11, följt av en 17-dagars viloperiod från dag 12 till dag 28), dexametason (40 mg oralt på dag 1 till 4 och dag 8 till 11) och talidomid (administreras oralt 50 mg dagligen dag 1–14, ökas till 100 mg under dag 15–28 och därefter till 200 mg dagligen). En enda autolog stamcellstransplantation erhöles hos 105 (81 %) av patienterna och 78 (61 %) av patienterna i de respektive BoTDx- och TDx-grupperna. Patienternas demografi- och baseline-profiler var jämförbara mellan behandlingsgrupperna. Patienter i BoTDx- och TDx-grupperna hade en medianålder på 57 respektive 56 år, 99 % respektive 98 % av patienterna var kaukasier och 58 % respektive 54 % var män. I BoTDx-gruppen hade 12 % av patienterna högriskscytogenetik jämfört med 16 % i TDx-gruppen. Behandlingstiden var i medeltal 24,0 veckor och de erhållna behandlingscyklerna var i medeltal 6,0 och var konsekventa mellan behandlingsgrupperna. Primära effektbaserade endpoints i studien var behandlingssvarsfrekvenser efter induktionsbehandling och efter transplantation (CR+nCR). En statistiskt signifikant skillnad i CR+nCR observerades till förmån för gruppen som fick bortezomib i kombination med dexametason och talidomid. Sekundära effektbaserade endpoints inkluderade progressionsfri överlevnad och generell överlevnad. Huvudsakliga effektresultat presenteras i Tabell 13.

Tabell 13: Effekresultat från studie MMY-3010

Endpoints	BoTDx	TDx	OR; 95 % CI; P-värde <sup>a</sup>
<b>MMY-3010</b>	N=130 (ITT population)	N=127 (ITT population)	
* RR (Efter induktion)	49,2 (40,4, 58,1)	17,3 (11,2, 25,0)	4,63 (2,61, 8,22); <0,001 <sup>a</sup>
CR+nCR	84,6 (77,2, 90,3)	61,4 (52,4, 69,9)	3,46 (1,90, 6,27); <0,001 <sup>a</sup>
CR+nCR+PR % (95 % CI)			
* RR (Efter transplantation)	55,4 (46,4, 64,1)	34,6 (26,4, 43,6)	2,34 (1,42, 3,87); 0,001 <sup>a</sup>
CR+nCR	77,7 (69,6, 84,5)	56,7 (47,6, 65,5)	2,66 (1,55, 4,57); <0,001 <sup>a</sup>
CR+nCR+PR % (95 % CI)			

CI (confidence interval) = konfidensintervall; CR (complete response) = fullständigt svar; nCR (near Complete Response) = nära fullständigt svar; ITT = intent to treat; RR = svarsfrekvens; Bo = bortezomib;

BoTDx = bortezomib, talidomid, dexametason;

TDx = talidomid, dexametason;

PR (partial response) = partiellt svar, OR (odds ratio) = oddskvot;

\* Primär endpoint

<sup>a</sup> OR för behandlingssvarsfrekvenser baserad på Mantel-Haenszel-skattning av oddskvot för stratifierade tabeller; p-värden genom Cochran-Mantel-Haenszel-test.

Observera: En OR >1 indikerar en fördel för induktionsterapi med Bo som del av behandlingen.

## Klinisk effekt för recidiverande eller refraktärt multipelt myelom

Effekten och säkerheten hos bortezomib (intravenös injektion) studerades vid den rekommenderade dosen 1,3 mg/m<sup>2</sup> i 2 studier: en randomiserad, jämförande fas III-studie (APEX) mot dexametason (Dex), med 669 patienter med recidiverande eller refraktärt multipelt myelom, vilka hade erhållit 1–3 tidigare behandlingar, och en enarmad fas II-studie med 202 patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom, vilka hade erhållit minst 2 tidigare behandlingar och som progredierade på sin senaste behandling.

I fas III-studien ledde behandling med bortezomib till en signifikant längre tid till progress, en signifikant förlängd överlevnad och signifikant högre svarsgrad, jämfört med behandling med dexametason (se Tabell 14), hos samtliga patienter liksom hos patienter som erhållit 1 tidigare behandling. Som resultat av en förplanerad interimanalys avbröts dexametasonarmen på rekommendation från prövningens styrkommitté och alla patienter som randomiserats till dexametason blev erbjudna bortezomib, oavsett sjukdomsstatus. På grund av denna tidiga crossover är medianvärdet för uppföljningstiden för överlevande patienter 8,3 månader. Såväl hos patienter som var refraktära till sin senaste föregående behandling som hos patienter som inte var refraktära var den totala överlevnaden och svarsgraden signifikant högre i behandlingsarmen med bortezomib.

Av de rekryterade 669 patienterna var 245 (37 %) 65 år eller äldre. Svarsparametrar såväl som TTP kvarstod signifikant bättre för bortezomib, oberoende av ålder. Oavsett  $\beta_2$ -mikroglobulin-nivåer

vid baseline var alla effektparametrar (tid till progress, total överlevnad och svarsgrad) signifikant bättre i behandlingsarmen med bortezomib.

I den refraktära populationen i fas II-studien bedömdes behandlingssvaret av en oberoende granskningskommitté och svarskriterierna var de som fastställts av European Bone Marrow Transplant Group. Medianen för överlevnadstiden för alla inkluderade patienter var 17 månader (intervall <1 till 36+ månader). Denna överlevnad var större än den medianöverlevnad på sex till nio månader som konsulterade kliniska prövare uppskattade för en liknande patientpopulation. Med multivariatanalys visades svarsgraden vara oberoende av typ av myelom, patientens kondition, frånvaro av kromosom 13, liksom av antal och typ av tidigare behandlingar. Patienter som hade fått 2 till 3 tidigare behandlingar hade en svarsgrad av 32 % (10/32), och patienter som fick mer än 7 tidigare behandlingar hade en svarsgrad av 31 % (21/67).

*Tabell 14: Sammanfattning av sjukdomsförlopp från fas III- (APEX) och fas II-studien*

	Fas III		Fas III		Fas III		Fas II
	Alla patienter		1 tidigare behandling		>1 tidigare behandling		≥2 tidigare behandlingar
Tidsrelaterade händelser	Bo n=333 a	Dex n=336 a	Bo n=132 a	Dex n=119 a	Bo n=200 a	Dex n=217 a	Bo n=202 a

	Fas III		Fas III		Fas III		Fas II
	Alla patienter		1 tidigare behandling		>1 tidigare behandling		≥2 tidigare behandlingsar
Tid till progress, dagar [95 % CI]	189 <sup>b</sup> [148, 211]	106 <sup>b</sup> [86, 128]	212 <sup>d</sup> [188, 267]	169 <sup>d</sup> [105, 191]	148 <sup>b</sup> [129, 192]	87 <sup>b</sup> [84, 107]	210 [154, 281]
Ettårsöverlevnad, % [95 % CI]	80 <sup>d</sup> [74, 85]	66 <sup>d</sup> [59, 72]	89 <sup>d</sup> [82, 95]	72 <sup>d</sup> [62, 83]	73 [64, 82]	62 [53, 71]	60
<b>Bästa svar (%)</b>	<b>Bo</b> n=315 <sup>c</sup>	<b>Dex</b> n=312 <sup>c</sup>	<b>Bo</b> n=128	<b>Dex</b> n=110	<b>Bo</b> n=187	<b>Dex</b> n=202	<b>Bo</b> n=193
CR	20 (6) <sup>b</sup>	2 (<1) <sup>b</sup>	8 (6)	2 (2)	12 (6)	0 (0)	(4) **
CR+nCR	41 (13) <sup>b</sup>	5 (2) <sup>b</sup>	16 (13)	4 (4)	25 (13)	1 (<1)	(10) **
CR+nCR+PR	121 (38) <sup>b</sup>	56 (18) <sup>b</sup>	57 (45) <sup>b</sup>	29 (26) <sup>d</sup>	64 (34) <sup>b</sup>	27 (13) <sup>b</sup>	(27) **
CR+nCR+PR+MR	146 (46)	108 (35)	66 (52)	45 (41)	80 (43)	63 (31)	(35) **
<b>Median duration</b>	242 (8,0)	169 (5,6)	246 (8,1)	189 (6,2)	238 (7,8)	126 (4,1)	385 *

	Fas III		Fas III		Fas III		Fas II
	Alla patienter		1 tidigare behandling		>1 tidigare behandling		≥2 tidigare behandlingar
Dagar (månader)							
Tid till svar CR+PR (dagar)	43	43	44	46	41	27	38 *

<sup>a</sup> Intent to Treat (ITT) population

<sup>b</sup> p-värde från stratifierat log-rank test; analys per terapilinje utesluter stratifiering för terapihistoria;  $p < 0,0001$ .

<sup>c</sup> Populationen av responders innefattar patienter med mätbar sjukdom initialt och som erhöll minst en dos av studieläkemedlet.

<sup>d</sup> p-värde från Cochran-Mantel-Haenszel chi-kvadrattest anpassat för stratifieringsfaktorerna; analys per terapilinje utesluter stratifiering för terapihistoria.

\* CR+PR+MR \*\*CR = CR (IF-); nCR = CR (IF+).

NA = ej applicerbart, NE = går ej att uppskatta.

TTP = tid till progression.

CI (Confidence Interval) = konfidensintervall.

Bo = bortezomib, Dex = dexametason.

CR (Complete Response) = fullständigt svar; nCR (near Complete Response) = nära fullständigt svar.

PR (Partial Response) = partiellt svar, MR (Minimal Response) = minimalt svar.

I fas II-studien kunde patienter som inte uppnådde ett optimalt svar på behandlingen med enbart bortezomib få dexametason i högdos tillsammans med bortezomib. Protokollet medgav att patienterna fick dexametason om de hade ett svar på bortezomib enbart som var lägre än optimalt. Totalt 74 evaluerbara patienter fick dexametason tillsammans med bortezomib. Arton procent av patienterna uppnådde ett svar eller fick ett förbättrat svar [MR (11 %) eller PR (7 %)] med kombinationsbehandling.

*Klinisk effekt efter subkutan administrering av bortezomib hos patienter med recidiverande/refraktärt multipelt myelom*

I en öppen, randomiserad, fas III non-inferiority-studie jämfördes effekt och säkerhet av subkutan administrering av bortezomib jämfört med intravenös administrering. Denna studie inkluderade 222 patienter med recidiverande/refraktärt multipelt myelom, som randomiserades i förhållandet 2:1 för att få 1,3 mg/m<sup>2</sup> av bortezomib antingen subkutant eller intravenöst under 8 cykler. Patienter som inte uppnådde ett optimalt svar (mindre än Complete Response [CR]) med behandling med enbart bortezomib efter 4 cykler kunde få dexametason 20 mg dagligen på samma dag och dagen efter administrering av bortezomib. Patienter med baslinje på grad  $\geq 2$  perifer neuropati eller trombocyter  $< 50 \times 10^9/l$  exkluderades. Totalt utvärderas 218 patienter.

Denna studie uppnådde sitt primära mål om non-inferiority med avseende på svarsfrekvens (CR + PR) efter 4 cykler med bortezomib som monoterapi för både subkutan och intravenös administrering, 42 % i båda grupperna. Dessutom visade

sekundära svarsrelaterade och tid till händelse-relaterade effektmått konsekventa resultat för subkutan och intravenös administrering (tabell 15).

*Tabell 15: Sammanfattning av effekt vid jämförelse med subkutan och intravenös administration av bortezomib*

	<b>Bortezomib intravenö s grupp</b>	<b>Bortezomib subkutan grupp</b>
<b>Svar i evaluerbar population</b>	<b>n=73</b>	<b>n=145</b>
<b>Svarsfrekvens vid cykel 4 n (%)</b>		
ORR (CR+PR)	31 (42)	61 (42)
p-värde <sup>a</sup>	0,00201	
CR n (%)	6 (8)	9 (6)
PR n (%)	25 (34)	52 (36)
nCR n (%)	4 (5)	9 (6)
<b>Svarsfrekvens vid cykel 8 n (%)</b>		
ORR (CR+PR)	38 (52)	76 (52)
p-värde <sup>a</sup>	0,0001	
CR n (%)	9 (12)	15 (10)
PR n (%)	29 (40)	61 (42)
nCR n (%)	7 (10)	14 (10)
<b>Intent to Treat-population<sup>b</sup></b>	<b>n=74</b>	<b>n=148</b>
<b>TTP, månader</b>	9,4	10,4
(95% CI)	(7,6; 10,6)	(8,5 ; 11,7)



Hazard ratio (95% CI) C	0,839 (0,564; 1,249)	
p-värde	0,38657	
<b>Progressionsfri överlevnad, månader</b>	8,0	10,2
(95% CI)	(6,7; 9,8)	(8,1; 10,8)
Hazard ratio (95% CI) C	0,824 (0,574; 1,183)	
p-värde	0,295	
<b>1 års total överlevnad (%)<sup>e</sup></b>	76,7	72,6
(95% CI)	(64,1; 85,4)	(63,1; 80,0)

<sup>a</sup> p-värde är för non-inferiority hypotesen är att SC-armen behåller minst 60 % av svarsfrekvensen i IV-armen.

<sup>b</sup> 222 patienter inkluderades i studien; 221 patienter behandlades med bortezomib.

<sup>c</sup> Hazards ratio skattning baseras på en Cox-modell justerad för stratifieringsfaktorerna: ISS staging och antal tidigare behandlingar-

<sup>d</sup> Log-ranktest justerat för stratifieringsfaktorer: ISS staging och antal av tidigare terapier.

<sup>e</sup> Medianduration av uppföljning är 11,8 månader.

### *Kombinationsbehandling med bortezomib och pegylerat liposomalt doxorubicin (studie DOXIL-MMY-3001)*

En randomiserad, parallellgrupps, öppen, multicenter fas III-studie utfördes på 646 patienter för att jämföra säkerhet och effekt hos bortezomib plus pegylerat liposomalt doxorubicin jämfört med monoterapi med bortezomib till patienter med multipelt myelom

som hade fått minst 1 tidigare behandling, och där sjukdomen inte förvärrades medan de fick antracyklinbaserad behandling. Primär effektendpoint var TTP medan sekundära effektendpoints var OS och ORR (CR+PR), enligt kriterierna från European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).

En protokolldefinierad interimanalys (baserad på 249 TTP-händelser) utlöste ett förtida avslut av studien för effekt. Denna interimanalys visade en TTP-riskreduktion på 45 % (95 % CI; 29–57 %,  $p < 0,0001$ ) för patienter behandlade med en kombinationsbehandling med bortezomib och pegylerat liposomalt doxorubicin. Median-TTP var 6,5 månader för patienter med bortezomib som monoterapi jämfört med 9,3 månader för patienter med kombinationsbehandling med bortezomib plus pegylerat liposomalt doxorubicin. Även om dessa resultat inte var definitiva utgjorde de den protokolldefinierade slutliga analysen. Den slutliga analysen av total överlevnad (OS) utförd efter en medianuppföljning på 8,6 år visade ingen signifikant skillnad i OS mellan de två behandlingsgrupperna. Median OS var 30,8 månader (95 % CI: 25,2–36,5 månader) för patienter som fick bortezomib som monoterapi och 33,0 månader (95 % CI: 28,9–37,1 månader) för patienter som fick bortezomib plus pegylerat liposomalt doxorubicin som kombinationsbehandling.

### *Kombinationsbehandling med bortezomib och dexametason*

I avsaknad av någon direkt jämförelse mellan bortezomib och bortezomib i kombination med dexametason till patienter med progressivt multipelt myelom utfördes en statistisk analys med matchade par för att jämföra resultaten från den icke randomiserade armen med bortezomib i kombination med dexametason (den öppna fas II-studien MMY-2045) och resultat erhållna i monoterapiarmarna för bortezomib från olika

randomiserade fas III-studier (M34101-039 [APEX] och DOXIL MMY-3001) för samma indikation.

Analys med matchade par är en statistisk metod där patienterna i behandlingsgruppen (t.ex. bortezomib i kombination med dexametason) och patienterna i jämförelsegruppen (t.ex. bortezomib) görs jämförbara med hänsyn till förväxlingsfaktorer genom att försökspersonerna paras samman individuellt. Detta minimerar effekterna av observerade förväxlingsfaktorer vid en uppskattning av behandlingseffekterna med hjälp av icke randomiserade data.

Etthundratjugosju matchade patientpar identifierades. Analysen visade förbättrat ORR (CR+PR) (oddskvot 3,769; 95 % CI 2,045–6,947;  $p < 0,001$ ), PFS (riskkvot 0,511; 95 % CI 0,309–0,845;  $p = 0,008$ ), TTP (riskkvot 0,385; 95 % CI 0,212–0,698;  $p = 0,001$ ) för bortezomib i kombination med dexametason jämfört med bortezomib som monoterapi.

Begränsad information vid upprepad behandling med bortezomib vid recidiverande multipelt myelom finns tillgängligt.

Den enarmade, öppna, fas II-studien MMY-2036 (RETRIEVE), utfördes för att bestämma effekt och säkerhet vid upprepad behandling med bortezomib hos etthundratrettio patienter ( $\geq 18$  år) med multipelt myelom. Patienter ( $\geq 18$  år) som tidigare hade haft minst partiell respons på bortezomib innehållande regim behandlades på nytt vid progression. Vid minst 6 månader efter tidigare terapi startades bortezomib vid den sist tolererade dosen med  $1,3 \text{ mg/m}^2$  ( $n = 93$ ) eller  $\leq 1,0 \text{ mg/m}^2$  ( $n = 37$ ) och gavs på dag 1,4,8 och 11 var 3:e vecka i maximalt 8 cykler antingen ensamt eller i kombination med dexametason enligt gällande

vårdpraxis. Dexametason gavs i kombination med bortezomib till 83 patienter i cykel 1 och ytterligare 11 patienter fick dexametason under den upprepande behandlingscykeln med bortezomib. Den primära effekt-endpointen var det bäst konfirmerade svaret på upprepad behandling enligt bedömning med EBMT-kriterier. Den totalt sett bästa svarsfrekvensen (CR+PR) vid upprepad behandling hos 130 patienter var 38,5 % (95 % CI: 30,1, 47,4).

### Klinisk effekt vid tidigare obehandlat mantelcellslymfom (MCL)

Studie LYM-3002 var en randomised, öppen fas III-studie som jämförde effekt och säkerhet av kombinationen bortezomib, rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (BoR-CAP; n = 243) med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin och prednison (R-CHOP; n = 244) på vuxna patienter med tidigare obehandlat MCL (stadium II, III eller IV). Patienter i BoR-CAP-gruppen fick bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup>; dag 1, 4, 8, 11, viloperiod dag 12–21), rituximab 375 mg/m<sup>2</sup> intravenöst dag 1; cyklofosfamid 750 mg/m<sup>2</sup> intravenöst dag 1; doxorubicin 50 mg/m<sup>2</sup> intravenöst dag 1 och prednison 100 mg/m<sup>2</sup> oralt dag 1 till dag 5 i den 21 dagar långa behandlingscykeln med bortezomib. Patienter med ett svar som dokumenterades först i cykel 6 fick två ytterligare behandlingscykler.

Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad baserad på en bedömning av en oberoende granskningskommittée (IRC, *Independent Review Committee*). Sekundära resultatmått omfattade tid till progression (TTP), tid till nästa anti-lymfombehandling (TNT), duration behandlingsfritt intervall (TFI), total svarsfrekvens (ORR) och komplett svarsfrekvens (CR/CRu), total överlevnad (OS) och svarsduration.

Demografiska egenskaper och sjukdomsegenskaper vid baseline var i allmänhet väl balanserade mellan de två behandlingsgrupperna: median patientålder var 66 år, 74 % var män, 66 % var kaukasier och 32 % asiater, 69 % av patienterna hade ett positivt benmärgsaspirat och/eller en positiv benmärgsbiopsi för MCL, 54 % av patienterna hade IPI-poäng (*International Prognostic Index*)  $\geq 3$  och 76 % hade sjukdom i stadium IV. Behandlingsduration (median = 17 veckor) och uppföljningsduration (median = 40 månader) var jämförbara i båda behandlingsgrupperna. Patienterna i båda behandlingsgrupperna fick 6 cykler i median och 14 % av patienterna i BoR-CAP-gruppen och 17 % av patienterna i R-CHOP-gruppen fick ytterligare 2 cykler. Majoriteten av patienterna i båda grupperna avslutade behandlingen, 80 % i BoR-CAP-gruppen och 82 % i R-CHOP-gruppen. Effekresultaten visas i tabell 16:

Tabell 16: Effekresultat från studie LYM-3002

Effekresultat	BoR-CAP	R-CHOP	
n: ITT patienter	243	244	
<b>Progressionsfri överlevnad (IRC) <sup>a</sup></b>			
Händelser (%)	133 (54,7 %)	165 (67,6 %)	HR <sup>b</sup> (95 % CI)
Median <sup>c</sup> (95 % CI) (månader)	24.7 (19,8; 31,8)	14.4 (12; 16,9)	= 0,63 (0,50; 0,79) p-value <sup>d</sup> <0,001
<b>Svarsfrekvens</b>			
n: svar utvärderbara patienter	229	228	

<i>Totalt komplett svar (CR + CRu)<sup>f</sup> n (%)</i>	122 (53,3 %)	95 (41,7 %)	OR <sup>e</sup> (95 % CI) = 1,688 (1,148; 2,481) p-value <sup>g</sup> = 0,007
<i>Totalt svar (CR + Cru + PR)<sup>h</sup> n (%)</i>	211 (92,1 %)	204 (89,5 %)	OR <sup>e</sup> (95 % CI) = 1,428 (0,749; 2,722) p-value <sup>g</sup> = 0,275

<sup>a</sup> Baserad på IRC-bedömning (*Independent Review Committee*) (endast radiologiska data).

<sup>b</sup> Uppskattning av riskkvot baseras på en Cox modell stratifierad med IPI-risk och sjukdomsstadium. Riskkvot <1 indikerar en fördel för BoR-CAP.

<sup>c</sup> Baserad på Kaplan-Meier-skattningar.

<sup>d</sup> Baserat på Log rank-test stratifierat med IPI-risk och sjukdomsstadium.

<sup>e</sup> Mantel-Haenszel-skattning av den vanliga oddskvoten för stratifierade tabeller används med IPI-risk och sjukdomsstadium som stratifieringsfaktorer. En oddskvot (OR) >1 indikerar en fördel för BoR-CAP.

<sup>f</sup> Inkluderar alla CR + CRu av IRC, benmärg och LDH.

<sup>g</sup> p-värde från Cochran Mantel-Haenszel chi-kvadrattest, med IPI och sjukdomsstadium som stratifieringsfaktorer.

<sup>h</sup> Inkluderar alla radiologiska CR+CRu+PR av IRC oavsett verifiering med benmärg och LDH.

CR = Kompletta svar; CRu = Kompletta svar, obekräftat; PR = partiella svar; CI = konfidensintervall, HR = riskkvot; OR = oddskvot; ITT = Intent to Treat.

Median PFS vid prövarbedömning var 30,7 månader i BoR-CAP-gruppen och 16,1 månader i R-CHOP-gruppen (riskkvot [HR] = 0,51;  $p < 0,001$ ). En statistiskt signifikant fördel ( $p < 0,001$ ) för BoR-CAP-behandlingsgruppen jämfört med R-CHOP-gruppen observerades för TTP (median 30,5 jämfört med 16,1 månader, TNT (median 44,5 jämfört med 24,8 månader) och TFI (median 40,6 jämfört med 20,5 månader). Median duration för komplett svar var 42,1 månader i BoR-CAP-gruppen jämfört med 18 månader i R-CHOP-gruppen. Durationen för totalt svar var 21,4 månader längre i BoR-CAP-gruppen (median 36,5 månader jämfört med 15,1 månader i R-CHOP-gruppen). Den slutliga analysen av total överlevnad (OS) utfördes efter en medianuppföljning på 82 månader. Median OS var 90,7 månader för BoR-CAP-gruppen jämfört med 55,7 månader för R-CHOP-gruppen (HR = 0,66;  $p = 0,001$ ). Den observerade slutliga skillnaden i median OS mellan de 2 behandlingsgrupperna var 35 månader.

### Patienter med tidigare behandlad AL-Amyloidos (AL = amyloid lättkedja)

En icke randomiserad öppen fas I/II-studie genomfördes för att undersöka säkerhet och effekt av referensläkemedlet som innehåller bortezomib hos patienter med tidigare behandlad AL-Amyloidos. Inga nya säkerhetsproblem observerades under studien, och framför allt förvärrades inte skadan på målorgan (hjärta, njure och lever) av bortezomib. I en explorativ effektanalys rapporterades svarsfrekvensen 67,3 % (inkluderande en CR-frekvens på 28,6 %) mätt som hematologiskt svar (M-protein)

hos 49 utvärderbara patienter behandlade med de maximala tillåtna doserna 1,6 mg/m<sup>2</sup> per vecka och 1,3 mg/ m<sup>2</sup> två gånger per vecka. För dessa dosgrupper var den kombinerade 1 årsöverlevnaden 88,1 %.

### Pediatrik population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för referensläkemedlet som innehåller bortezomib för alla grupper av den pediatrika populationen för multipelt myelom och för mantelcellslymfom (information om pediatrik användning finns i avsnitt Dosering).

En fas II-studie av effekt, säkerhet och farmakokinetik med en behandlingsgrupp utförd av "The Children's Oncology Group" utvärderade effekten av tillägg av bortezomib till reinduktionskemoterapi med flera läkemedel hos pediatrika och unga vuxna patienter med lymfoida maligniteter (pre-B-cell akut lymfatisk leukemi [ALL], T-cell ALL och T-cell lymfoblastlymfom [LBL]). En effektiv regim av reinduktionskemoterapi med flera läkemedel administrerades i 3 block. Bortezomib administrerades bara i block 1 och 2 för att undvika möjlig överlappande toxicitet med samtidigt administrerade läkemedel i block 3.

Komplett behandlingssvar (CR) utvärderades i slutet av block 1. Hos alla B-ALL patienter med recidiv inom 18 månader efter diagnos (n = 27) var CR-frekvensen 67 % (95 % CI: 46, 84), och frekvensen för 4 månaders händelsefri överlevnad 44 % (95 % CI: 26, 62). Hos B-ALL patienter med recidiv 18–36 månader från diagnos (n = 33) var CR-frekvensen 79 % (95 % CI: 61, 91) och frekvensen för 4 månaders händelsefri överlevnad 73 % (95 % CI: 54, 85). CR-frekvensen för patienter med första recidiv av T-cell



ALL (n = 22) var 68 % (95 % CI: 45, 86) och frekvensen för 4 månaders händelsefri överlevnad 67 % (95 % CI: 42, 83). Rapporterade effektdata anses vara ofullständiga (se avsnitt Dosering).

Det fanns 140 patienter med ALL eller LBL som inkluderats och utvärderats avseende säkerhet; medianålder 10 år (intervall 1 till 26). Inga nya biverkningar observerades när bortezomib lades till i den standardiserade pediatrika bakgrundregimen med kemoterapi vid pre-B-cell ALL. Följande biverkningar (grad  $\geq 3$ ) observerades med en högre incidens i behandlingsregimen som innehöll bortezomib jämfört med bakgrundsregimen i den historiska kontrollstudien där bakgrundsregimen gavs ensamt: i block 1 perifer sensorisk neuropati (3 % mot 0 %), ileus (2,1 % mot 0 %), hypoxi (8 % mot 2 %). Ingen information om möjligt följd tillstånd eller frekvens av upphörande av perifer neuropati fanns tillgänglig i den här studien. Högre incidenser noterades också för infektioner med neuropati av grad  $\geq 3$  (24 % mot 19 % i block 1 och 22 % mot 11 % i block 2), förhöjt ALAT (17 % mot 8 % i block 2), hypokalemi (18 % mot 6 % i block 1, och 21 % mot 12 % i block 2) och hyponatremi (12 % mot 5 % i block 1, och 4 % mot 0 % i block 2).

## **Farmakokinetik**

### Absorption

Efter intravenös bolusadministrering av en dos på 1,0 mg/m<sup>2</sup> och 1,3 mg/m<sup>2</sup> till 11 patienter med multipelt myelom och kreatininclearancevärden över 50 ml/min var medelvärdet av de maximala plasmakoncentrationerna av bortezomib efter första dos en 57 respektive 112 ng/ml. Under senare doser varierade

medelvärde av de maximala observerade plasmakoncentrationerna från 67 till 106 ng/ml för dosen på 1,0 mg/m<sup>2</sup> och 89 till 120 ng/ml för dosen på 1,3 mg/m<sup>2</sup>.

Efter en intravenös bolusdos eller subkutan injektion av en 1,3 mg/m<sup>2</sup> dos till patienter med multipelt myelom (n = 14 i den intravenösa gruppen, n = 17 i den subkutana gruppen), var den totala systemiska exponeringen efter upprepade dosering (AUC<sub>last</sub>) ekvivalent för subkutan och intravenös administrering. C<sub>max</sub> efter SC administrering (20,4 ng/ml) var lägre än IV (223 ng/ml). AUC<sub>last</sub> - geometriska medelvärde var 0,99 och 90 % konfidensintervall var 80,18 %-122,80 %.

### Distribution

Den genomsnittliga distributionsvolymen (V<sub>d</sub>) för bortezomib varierade från 1 659 l till 3 294 l efter administrering av singeldoser eller upprepade intravenösa doser på 1,0 mg/m<sup>2</sup> eller 1,3 mg/m<sup>2</sup> till patienter med multipelt myelom. Detta tyder på en omfattande distribution av bortezomib till perifera vävnader. Över ett koncentrationsintervall för bortezomib av 0,01-1,0 mikrog/ml var proteinbindningsgraden *in vitro* i genomsnitt 82,9 % i human plasma. Fraktionen bortezomib bundet till plasmaproteiner var inte koncentrationsberoende.

### Metabolism

*In vitro*-studier med humana levermikrosomer och humana cDNA-uttryckta cytokrom P450-isozymer antyder att bortezomib främst metaboliseras oxidativt via cytokrom P450-enzymerna 3A4, 2C19 och 1A2. Den huvudsakliga metabolismvägen är deborering

för bildning av två deborerade metaboliter som därefter genomgår hydroxylering till flera metaboliter. Metaboliter av deborerad bortezomib är inaktiva som 26S proteasomhämmare.

### Eliminering

Den genomsnittliga eliminationshalveringstiden ( $t_{1/2}$ ) för bortezomib vid flerdosadministrering varierade mellan 40 och 193 timmar. Bortezomib elimineras snabbare efter den första dosen jämfört med efterföljande doser. Den genomsnittliga totala kroppselimineringen efter den första dosen på  $1,0 \text{ mg/m}^2$  och  $1,3 \text{ mg/m}^2$  var 102 respektive 112 liter/timme. Efter de efterföljande doserna var den genomsnittliga kroppselimineringen 15–32 liter/timme för dosen  $1,0 \text{ mg/m}^2$  respektive 18–32 liter/timme för dosen  $1,3 \text{ mg/m}^2$ .

### Speciella populationer

#### *Nedsatt leverfunktion*

Påverkan av leverfunktionsnedsättning på bortezomibs farmakokinetik utvärderades i en fas 1-studie, omfattande 61 patienter som huvudsakligen hade solida tumörer och varierande grader av leverfunktionsnedsättning, med bortezomibdoser från  $0,5$  till  $1,3 \text{ mg/m}^2$  under den första behandlingscykeln. Jämfört med patienter med normal leverfunktion ändrade inte en lätt leverfunktionsnedsättning bortezomibs dosnormaliserade AUC. De genomsnittliga dosnormaliserade AUC-värdena ökades dock med ungefär 60 % hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion. En lägre startdos rekommenderas till patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion och dessa patienter ska observeras noggrant (se avsnitt Dosering, Tabell 6).

### *Nedsatt njurfunktion*

En farmakokinetisk studie utfördes på patienter med nedsatt njurfunktion av varierande grad. Patienterna indelades utifrån sina kreatininclearancevärden (CrCl) i följande grupper: normal njurfunktion ( $\text{CrCl} \geq 60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ,  $n = 12$ ); lätt nedsatt njurfunktion ( $\text{CrCl} = 40\text{--}59 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ,  $n = 10$ ); måttligt nedsatt njurfunktion ( $\text{CrCl} = 20\text{--}39 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ,  $n = 9$ ) samt kraftigt nedsatt njurfunktion ( $\text{CrCl} < 20 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ,  $n = 3$ ). En grupp dialyspatienter, som medicinerades efter dialys, ingick också i studien ( $n = 8$ ). Patienterna fick bortezomib intravenöst i doser på 0,7 till 1,3  $\text{mg/m}^2$  två gånger i veckan. Exponeringen för bortezomib (dosnormaliserade värden på AUC och  $C_{\text{max}}$ ) var jämförbar i samtliga grupper (se avsnitt Dosering).

### *Ålder*

De farmakokinetiska parametrarna för bortezomib bestämdes efter intravenös administrering två gånger i veckan av bolusdoser på 1,3  $\text{mg/m}^2$  till 104 pediatrika patienter (2–16 år) med akut lymfatisk leukemi (ALL) eller akut myeloisk leukemi (AML). Baserat på en farmakokinetisk populationsanalys ökade clearance av bortezomib med ökande kroppsyta (*body surface area*, BSA). Geometriskt medelvärde (% CV) för clearance var 7,79 (25 %)  $\text{l/timme/m}^2$ , distributionsvolym vid steady state var 834 (39 %)  $\text{l/m}^2$ , och elimineringshalveringstiden var 100 timmar (44 %). Efter korrigering för BSA-effekten hade andra demografiska parametrar såsom ålder, kroppsvikt och kön inga kliniskt signifikanta effekter på clearance av bortezomib. BSA-normaliserad clearance av bortezomib hos pediatrika patienter överensstämde med den som observerats hos vuxna.

## Prekliniska uppgifter

Bortezomib var klastogent (strukturella kromosomavvikelser) i *in vitro* kromosomaberrationstest på ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) vid koncentrationer ned till 3,125 mikrog/ml, vilket var den lägsta utvärderade koncentrationen. Bortezomib var inte gentoxiskt när det testades i *in vitro* mutagentest (Ames test) och *in vivo* mikronukleustest på mus.

Studier avseende reproduktionstoxikologi på råtta och kanin har visat embryo-fetal dödlighet vid för moderdjuret toxiska doser, men ingen direkt embryo-fetal toxicitet vid doser lägre än de som var toxiska för modern. Fertilitetsstudier har inte utförts men undersökning av reproduktionsorgan har gjorts i de allmänna toxicitetsstudierna. I en 6-månadersstudie på råtta har degenerativa effekter setts på såväl testiklar som ovarier. Därför är det sannolikt att bortezomib kan ha en potentiell inverkan på såväl manlig eller kvinnlig fertilitet. Studier avseende peri- och postnatal utveckling har inte utförts.

I allmänna toxicitetsstudier omfattande ett flertal behandlingscykler utförda på råtta och apa var de viktigaste målorganen magtarmkanalen, vilket resulterade i kräkningar och/eller diarré, hematopoetisk och lymfatisk vävnad som resulterade i cytopenier i perifert blod, atrofi i lymfvävnad, hematopoetisk hypocellularitet i benmärg, perifer neuropati (iakttagen hos apa, mus och hund) innefattande sensoriska axoner, samt lindriga njurförändringar. Alla dessa målorgan har uppvisat partiell till fullständig återhämtning efter utsättande av behandlingen.

Baserat på djurstudier förefaller penetration av bortezomib genom blod-hjärnbarriären, att vara begränsad, om överhuvud någon, och relevansen för människa är okänd.

Farmakologiska kardiovaskulära säkerhetsstudier på apa och hund visar att intravenösa doser på cirka två till tre gånger den rekommenderade kliniska dosen, räknat på  $\text{mg}/\text{m}^2$ , förknippas med ökning av hjärtfrekvensen, minskad kontraktionsförmåga, hypotension och död. Hos hund svarade den minskade kontraktionsförmågan och hypotensionen på akut behandling med medel med positiv inotrop eller blodtryckshöjande effekt. Vidare sågs i hundstudierna en lätt ökning av det korrigerade QT-intervall et.

## **Innehåll**

### **Kvalitativ och kvantitativ sammansättning**

Varje injektionsflaska innehåller 1,4 ml injektionsvätska, lösning innehållande 3,5 mg bortezomib (som en manitol-boronsyraester).  
Varje injektionsflaska innehåller 2,8 ml injektionsvätska, lösning innehållande 7 mg bortezomib (som en manitol-boronsyraester).

För subkutan injektion är ingen utspädning nödvändig.

1 ml lösning för subkutan injektion innehåller 2,5 mg bortezomib.

För intravenös injektion krävs utspädning.

Efter utspädning innehåller 1 ml intravenös injektionsvätska 1 mg bortezomib.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.

## Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

## Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

## Hållbarhet, förvaring och hantering

### Hållbarhet

#### Oöppnad injektionsflaska

3 år.

#### Stabilitet under användning

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning efter första öppning och/eller efter beredning har visats i 28 dagar vid 2 – 8 °C skyddad från ljus, 7 dagar vid 25 °C skyddad från ljus eller 24 timmar vid 25 °C i vanlig inomhusbelysning vid förvaring i originalflaskan och/eller i en polypropeninjektionsspruta.

Utifrån ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas omedelbart, såvida inte öppning och/eller utspädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstiderna och förhållandena före användning användarens ansvar.

Under beredning för administrering och under administrering är det inte nödvändigt att skydda läkemedlet från ljus.

## Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

### **Särskilda anvisningar för destruktion**

Gravida kvinnor ska inte hantera detta läkemedel.

### Allmänna försiktighetsåtgärder

Bortezomib är ett cytotoxiskt läkemedel. Därför ska försiktighet iakttas under hantering och beredning av Bortezomib Stada.

Användning av handskar och annan skyddsklädsel rekommenderas för att undvika hudkontakt.

**Aseptisk teknik** måste iakttas strikt under hanteringen av Bortezomib Stada eftersom produkten inte innehåller något konserveringsmedel.

Det har förekommit dödsfall vid oavsiktlig intratekal administrering av bortezomib. Bortezomib Stada 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning, är endast avsett för subkutan injektion och efter spädning också för intravenös användning. Bortezomib ska inte ges intratekalt.

### Anvisningar för beredning och administrering

Bortezomib Stada måste beredas av sjukvårdspersonal.

### *Intravenös injektion*



Injektionsflaskor innehållande 1,4 ml injektionsvätska, lösning/3,5 mg bortezomib

Varje injektionsflaska med Bortezomib Stada måste spädas försiktigt med 2,1 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion *genom att använda en spruta av lämplig storlek utan att ta bort injektionsflaskans propp*. Efter utspädning innehåller varje ml lösning 1 mg bortezomib. Den utspädda lösningen är klar och färglös till ljusgul, med ett slutligt pH mellan 4 och 7. Lösningen måste inspekteras visuellt för förekomst av partiklar och missfärgning före administrering.

Om någon missfärgning eller partikelförekomst observeras ska den utspädda lösningen kasseras.

Injektionsflaskor innehållande 2,8 ml injektionsvätska, lösning/7 mg bortezomib

Varje injektionsflaska med Bortezomib Stada måste spädas försiktigt med 4,2 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion *genom att använda en spruta av lämplig storlek utan att ta bort injektionsflaskans propp*. Efter utspädning innehåller varje ml lösning 1 mg bortezomib. Den utspädda lösningen är klar och färglös till ljusgul, med ett slutligt pH mellan 4 och 7. Lösningen måste inspekteras visuellt för förekomst av partiklar och missfärgning före administrering.

Om någon missfärgning eller partikelförekomst observeras ska den utspädda lösningen kasseras.

### *Subkutan injektion*

Varje injektionsflaska med Bortezomib Stada är klar att användas för subkutan injektion. Varje ml lösning innehåller 2,5 mg bortezomib. Lösningen är klar och färglös till ljusgul, med ett pH mellan 4,0 och 6,0. Lösningen måste inspekteras visuellt efter

partiklar och missfärgning före administrering. Om någon missfärgning eller partiklar observeras ska lösningen kasseras.

### Destruktion

Bortezomib Stada är endast avsett för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för cytostatika.

## **Egenskaper hos läkemedelsformen**

Injektionsvätska, lösning.

Klar och färglös till ljusgul lösning med ett pH-värde på 4,0–6,0.

## **Förpackningsinformation**

*Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml* Färglös till ljusgul lösning med ett pH-värde på 4,0–5,5.

1,4 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF