

## Scalibor<sup>®</sup> vet.

MSD Animal Health Sweden

Medicinskt halsband 1 g

(Vitt, elastiskt, medicinskt halsband. 65 cm i längd.)

Medel mot ektoparasiter, för utvärtes bruk till hund, inklusive insekticider, pyretriner och pyretroider

### Djurslag:

Hund

### Aktiv substans:

Deltametrin

### ATC-kod:

QP53AC11

Texten nedan gäller för:

**Scalibor<sup>®</sup> vet.** medicinskt halsband 0,76 g och 1 g

**FASS VET-text:** *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på veterinär produktresumé: 17/01/2024.*

## Innehåll

Varje vitt halsband med längden 48 cm (19 g) innehåller:

**Aktiv substans:**

Deltametrin 0,76 g

**Hjälpämnen:** Titandioxid (E 171) 0,285 g, organo Ca-Zn tvålblandning, epoxiderad sojaolja, diisooktyladipat, trifenylfosfat, polyvinylklorid.

Varje vitt halsband med längden 65 cm (25 g) innehåller:

**Aktiv substans:**

Deltametrin 1,0 g

**Hjälpämnen:** Titandioxid (E 171) 0,375 g, organo Ca-Zn tvålblandning, epoxiderad sojaolja, diisooktyladipat, trifenylfosfat, polyvinylklorid.

## Egenskaper

### Farmakodynamiska egenskaper

Insekter och kvalster exponeras för deltametrin genom kontakt. Verkningsmekanismen baseras på en utdragen ökning av natriumpermeabiliteten i insektens nervmembran. Detta resulterar i hyperaktivitet, följt av paralytisk (chockeffekt), tremor och parasitens död.

### Farmakokinetiska egenskaper

Deltametrin frisätts kontinuerligt från halsbandet till pälsen och den fettfilm som täcker huden. Den aktiva substansen sprids från området med direktkontakt över hela hudytan via fettfilmen och i hårremmen. Deltametrin absorberas inte systemiskt hos värdjuret.

## Indikationer

Förebyggande mot fästingangrepp (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) under en tid av fem till sex månader.

Förebyggande av blodsugning från fjärilmyggor (*Phlebotomus perniciosus*) under en tid av fem till sex månader.

Förebyggande av blodsugning från adulta myggor (*Culex pipiens pipiens*) under en tid av sex månader.

## **Kontraindikationer**

Använd inte till valpar yngre än sju veckor.

Använd inte till hundar med hudskador.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

Använd inte till katter.

## **Försiktighet**

Eftersom halsbandet utövar sin fulla effekt efter en vecka, bör halsbandet sättas på en vecka innan djuret förväntas bli exponerat för angrepp.

I sällsynta fall kan fästingar förekomma på en hund som bär halsbandet. Överföring av infektionssjukdom via fästingar eller fjärilmyggor kan under ogynnsamma omständigheter därför inte helt uteslutas.

Påverkan av schamponering på effektens varaktighet har inte undersökts.

## **Dräktighet och laktation**

### **Dräktighet:**

Kan användas under dräktighet.

### **Laktation:**

Kan användas under laktation.

## **Biverkningar**

Hund:

Sällsynta (1 till 10 av 10 000 behandlade djur):	Lokala hudreaktioner (t.ex. klåda/kliande, erytem/utslag, håravfall) <sup>1</sup> Överkänslighetsreaktion <sup>1</sup>
Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):	Förändrat beteende (t.ex. slöhet/hyperaktivitet) <sup>2</sup> Gastrointestinala symtom (t.ex. kräkningar, diarré, hypersalivering) Neurologiska symtom (t.ex. ataxi, muskeltremor) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> omfattar nacken eller huden i allmänhet och kan tyda på en lokal eller allmän överkänslighetsreaktion.

<sup>2</sup> ofta i kombination med hudirritation.

<sup>3</sup> avklingar inom 48 timmar efter att halsbandet har tagits av.

Om något av dessa symtom uppträder ska halsbandet tas av. Behandlingen är symtomatisk eftersom kännedom om specifik antidot saknas.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Rapporter ska, företrädesvis via en veterinär, skickas till antingen innehavaren av godkännande för försäljning eller dennes lokala företrädare eller till den nationella behöriga myndigheten via det nationella rapporteringssystemet. Se även avsnitt "Kontaktuppgifter" i bipacksedeln.

## Dosering

## **Dos och administreringsätt**

Halsband med en längd av 48 cm används till små och medelstora hundar med halsomfång mindre än 43 cm.

Halsband med en längd av 65 cm används till större hundar med halsomfång överstigande 43 cm men mindre än 60 cm.

Halsbandet fästes runt hundens hals.

Ett halsband per hund.

För kutan användning.

Ta ut halsbandet ur den förseglade innerpåsen. Justera halsbandet kring hundens hals utan att dra åt för hårt. Två fingrar i bredd ska få plats mellan halsbandet och hundhalsen. För in den fria änden i spännet och klipp bort eventuellt överflödigt längd utöver fem cm.

## **Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning**

Ej relevant.

## **Karenstider**

Ej relevant.

## **Interaktioner**

Använd inte tillsammans med andra ektoparasitocida medel innehållande organofosfater.

## **Överdoser**

Skulle hunden tugga i sig av halsbandet kan följande symtom uppträda:

Okoordinerade rörelser, tremor, salivering, kräkningar och stelhet i bakdelen.

Dessa symtom klingar vanligtvis av inom 48 timmar. Om nödvändigt kan Diazepam användas för symptomatisk behandling.

## **Observera**

### **Särskilda varningar för respektive djurslag**

Om hudlesioner uppkommer ska halsbandet tas av tills dess att symptomen försvunnit.

### **Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur**

Tvätta händerna med tvål och kallt vatten efter tillpassning av halsbandet.

Personer med känd överkänslighet mot trifenylfosfat bör undvika kontakt med läkemedlet och det behandlade djuret. Rådgör med sjukvården vid överkänslighetsreaktioner.

Läkemedlet innehåller deltametrin som kan orsaka övergående stickningar, klåda och fläckig rodnad på exponerad hud.

Tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun.

Se till att små barn inte tillåts ha långvarig, intensiv kontakt, t.ex. sova, med en hund som bär halsbandet.

Förvara innerpåsen med halsbandet i ytterkartongen tills dess att halsbandet ska användas.

### **Särskilda försiktighetsåtgärder för skydd av miljön:**

Även om normal kontakt med vatten inte minskar effekten hos halsbandet bör halsbandet alltid tas av innan hunden ska simma eller bada, eftersom den aktiva substansen är skadlig för fisk och vattenlevande organismer. Hunden ska avhållas från bad under de första fem dagarna efter halsbandets applicering

## **Övrigt**

Ett halsband är förpackat i en innerpåse av papper-aluminium-polyetylen eller

papper-aluminium-polyester-polyeten och förseglat i en ytterkartong.

## Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

## Förvaring

### Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Innerpåsen ska förvaras i ytterkartongen.

### Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Läkemedel ska inte kastas i avloppet.

Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av att deltametrin kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser.

## Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptfritt läkemedel.

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas <https://medicines.health.europa.eu/veterinary>

## Förpackningsinformation

*Medicinskt halsband 0,76 g Vitt*, elastiskt, medicinskt halsband. 48 cm i längd.

48 cm endosbehållare, receptfri

*Medicinskt halsband 1 g Vitt*, elastiskt, medicinskt halsband. 65 cm i längd.

65 cm endosbehållare, receptfri