

Terramycin[®] vet.

Zoetis Animal Health

Intrauterin tablett 500 mg

(Tillhandahålls ej)

R_x

Djurslag:

Får

Nötkreatur

Svin

Aktiv substans:

Oxitetracyklin (vattenfri)

ATC-kod:

QG01AA07

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2022-06-01

Innehåll

Varje tablett innehåller: Oxytetracyklin hydroklorid 510 mg motsvarande oxytetracyklin 500 mg.

Hjälpämnen: Natriummetabisulfit, vinsyra, ceftrimid, natriumbikarbonat, polyvidon, magnesiumstearat, talk, mannitol och renat vatten.

Egenskaper

Den verksamma substansen oxitetracyklin är bakteriostatisk och hämmar proteinsyntesen hos känsliga mikroorganismer. Korsresistens föreligger mellan tetracykliner och samtliga tetracyklinderivat. Tetracyklin har stor benägenhet att selektera fram gramnegativa tarmbakterier med R-faktoröverförd multipelresistens.

Antimikrobiellt spektrum:

Aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa bakterier, Mycoplasma, Rickettsia och Chlamydia.

Terramycin vet. uteritorier är skumbildande och sönderfaller vanligen inom 10-15 minuter, varigenom risken för utstötning minskas. Oxitetracyklin resorberas och kan påvisas i plasma och mjölk i ca 24 timmar. Vid intrauterin behandling med 2 tabletter (1,0 g oxitetracyklin) når man en koncentration i mjölk från friska djur av 0,3-1,2 mikrogram oxitetracyklin/ml. Oxitetracyklin utsöndras i aktiv form i faeces, urin och mjölk.

Indikationer

För behandling av infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för oxitetracyklin vid akuta infektioner i livmodern, t.ex. metrit eller vid kvarbliven efterbörd.

Kontraindikationer

Skall ej ges till djur med känd överkänslighet mot tetracykliner.

Försiktighet

Försiktighet skall iakttas vid behandling av djur med nedsatt njurfunktion.

Dräktighet och laktation

Skall ej ges till dräktiga djur.

Dosering

Endast för intrauterint bruk.

1-2 tabletter deponeras efter att var och nekrotisk vävnad i möjligaste mån avlägsnats.

Karenstider

Slakt: Nöt: 7 dygn. Svin och Får: 10 dygn. *Mjolk:* 2 dygn

Observera

Tvätta händerna efter beröring av produkten.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Intrauterin tablett 500 mg

10 styck påse, receptbelagd, *tillhandahålls ej*