

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

## **IMOGAZE**

240 mg mjuk kapsel

Simetikon

### **Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Detta läkemedel är receptfritt. Imogaze måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. VAD IMOGAZE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER IMOGAZE
3. HUR DU ANVÄNDER IMOGAZE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

5. HUR IMOGAZE SKA FÖRVARAS

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

## **1. VAD IMOGAZE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR**

Imogaze verkar genom att lösa upp den gas i magtarmkanalen som orsakar uppblåsthet/uppsvälldhet. Den används för att behandla symtomet väderspänning (flatulens) som gör att din mage känns uppsvälld.

## **2. INNAN DU ANVÄNDER IMOGAZE**

### **Använd inte Imogaze**

om du är allergisk (överkänslig) mot simetikon eller något av övriga innehållsämnen i Imogaze.

### **Var särskilt försiktig med Imogaze**

Du bör råd göra med din läkare om:

- Dina gasbevärr inte lättar efter 10 dagars behandling
- Du har förstoppning som inte vill ge med sig/bli bättre

### **Graviditet och amning**

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Imogaze kan användas under graviditet och amning eftersom upptaget av simetikon i kroppen (systemisk exponering) är försumbart.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Imogaze har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

### **3. HUR DU ANVÄNDER IMOGAZE**

Vanlig dos är:

**Om du är 15 år eller äldre:** En kapsel efter varje huvudmåltid. Svälj kapseln med ett stort glas vatten. Ta inte fler än 3 kapslar om dagen. Ta inte kapslarna under mer än 10 dagar i följd. Ge inte Imogaze till barn under 15 år.

**Om du har tagit för stor mängd av Imogaze:** Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

#### **Om du har glömt att ta Imogaze**

Ta en kapsel efter nästa huvudmål. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda kapseln.

### **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Imogaze orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats. Frekvensen är inte känd:

- Magsmärta, illamående, kräkningar och förstoppning
- Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar, hals och tunga eller andningssvårigheter.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

### *Rapportering av biverkningar*

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **5. HUR IMOGAZE SKA FÖRVARAS**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter "Utg. dat./EXP:" Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

## **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är simetikon. Varje kapsel innehåller 240 mg simetikon.
- Övriga innehållsämnen är gelatin och glycerol.

## **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Imogaze är en genomskinlig mjuk gelatinkapsel. Varje förpackning innehåller 10, 20 eller 30 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

## **Innehavare av godkännande för försäljning**

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

E-mail: med-info@its.jnj.com

## **Tillverkare**

Catalent France Beinheim S.A.

74, Rue Principale

67930 Beinheim

Frankrike

Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-09-15