

Bipacksedel: Information till användaren

## **Atomoxetin Glenmark**

10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg hårda kapslar  
atomoxetin

### **Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Atomoxetin Glenmark är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atomoxetin Glenmark
3. Hur du använder Atomoxetin Glenmark
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atomoxetin Glenmark ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

# 1. Vad Atomoxetin Glenmark är och vad det används för

Atomoxetin Glenmark innehåller den aktiva substansen atomoxetin och används för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD). Det används hos:

- barn från 6 års ålder
- ungdomar
- vuxna

Det används endast som en del i ett helt behandlingsprogram av sjukdomen som även innefattar behandling som inte involverar läkemedel, såsom samtal och beteendeterapi.

Hos vuxna används Atomoxetin Glenmark för att behandla ADHD när symtomen är mycket besvärande och påverkar ditt jobb eller sociala liv och när du haft symtom av sjukdomen som barn.

## Hur Atomoxetin Glenmark fungerar

Atomoxetin Glenmark ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns naturligt och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter med ADHD. Detta läkemedel hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Detta läkemedel är inte centralstimulerande.

## Om ADHD

Barn och ungdomar med ADHD upplever att det är:

- svårt att sitta still och
- svårt att koncentrera sig.

Det är inte deras fel att de inte kan göra detta. Många barn och ungdomar har svårt för dessa saker, men med ADHD kan detta skapa problem i vardagen. Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårigheter med inläring och att göra läxor. De upplever att det är svårt att uppföra sig hemma, i skolan eller på andras platser. ADHD påverkar inte intelligensen hos barn och ungdomar.

Vuxna med ADHD har svårigheter med samma saker som barn upplever som svårt men det kan innebära att de har problem med:

- arbete
- relationer
- låg självkänsla
- utbildning

Atomoxetin som finns i Atomoxetin Glenmark kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

## **2. Vad du behöver veta innan du använder Atomoxetin Glenmark**

2. Vad du behöver veta innan du tar Atomoxetin Glenmark

### **Ta inte Atomoxetin Glenmark:**

- om du är allergisk mot atomoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- under de senaste 14 dagarna har tagit ett läkemedel som tillhör gruppen monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t.ex. fenelzin. MAO-hämmare används bland annat för att behandla depression och andra psykiska problem. Samtidigt intag av Atomoxetin Glenmark och en MAO-hämmare kan orsaka allvarliga biverkningar eller vara livshotande. Minst 14 dagar måste ha förflutit efter avslutad behandling med Atomoxetin Glenmark innan du kan börja ta en MAO-hämmare
- har en ögonsjukdom som kallas glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck inne i ögat)
- har allvarliga problem med hjärtat, som kan påverkas av en ökning av hjärtfrekvensen och/eller blodtryck, eftersom det kan vara en effekt av Atomoxetin Glenmark
- har allvarliga problem med blodkärlen i hjärnan - som en stroke, svullnad och försvagning av en del av ett blodkärl (aneurysm) eller förträngning eller blockering av blodkärl
- har en tumör i binjuren (feokromocytom).

Ta inte Atomoxetin Glenmark om någon av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Glenmark. Detta eftersom att Atomoxetin Glenmark kan förvärra dessa problem.

## **Varningar och försiktighet**

Både vuxna och barn bör vara medvetna om följande varningar och försiktighetsåtgärder. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Glenmark om du har:

- tankar om att ta ditt liv eller försöker ta ditt liv
- hjärtproblem (inklusive hjärtfel) eller ökade hjärtslag. Atomoxetine Glenmark kan öka din hjärtfrekvens (puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel

- högt blodtryck. Atomoxetin Glenmark kan orsaka förhöjt blodtryck
- lågt blodtryck. Atomoxetin Glenmark kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt blodtryck
- problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen
- hjärt-kärlsjukdom eller har haft stroke
- leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos
- psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro på saker som inte är sanna eller vara misstänksam
- mani (känna sig upprymd och exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende) och agitation (en känsla av att vara både kroppsligt orolig och psykiskt upphetsad)
- aggressiva känslor
- ovänliga och arga (fientliga) känslor
- epilepsi eller har haft krampanfall av någon annan orsak. Atomoxetin Glenmark kan eventuellt öka risken för krampanfall
- annat humör än vanligt (humörsvängningar) eller känner dig väldigt olycklig
- svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller att du upprepar ljud och ord.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av ovanstående stämmer in på dig innan du börjar behandlingen. Detta eftersom att Atomoxetin Glenmark kan förvärra dessa problem. Din läkare kommer att vilja följa upp hur läkemedlet påverkar dig.

**Undersökningar som din läkare kommer att göra innan du börjar ta Atomoxetin Glenmark**

Dessa undersökningar görs innan du börjar - för att säkerställa att Atomoxetin Glenmark är säkert och kommer att hjälpa dig. När du startat - undersökningar kommer att genomföras minst var 6:e månad, troligen oftare. Dessa kommer även att göras när dosen ändras.

Din läkare kommer att mäta

- ditt blodtryck och hjärtfrekvens (puls)
- din längd och vikt om du är ett barn eller tonåring

Din läkare kommer att tala med dig om:

- andra läkemedel som du tar
- om det finns någon i slakten som dött en plötslig oförklarlig död
- andra medicinska problem (så som hjärtproblem) som du eller någon i din släkt har eller om du fått mer biverkningar när du tagit Atomoxetin Glenmark.

Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Detta hjälper din läkare att besluta om Atomoxetin Glenmark är rätt läkemedel för dig. Din läkare kan besluta att andra medicinska kontroller är nödvändiga innan du börjar ta detta läkemedel.

### **Viktig information om innehållet i kapslarna**

Öppna inte Atomoxetin Glenmark kapslarna eftersom att innehållet i kapseln kan irritera ögonen. Om innehållet i en kapsel kommer i kontakt med ögonen, bör det drabbade ögat omedelbart spolas med vatten, och medicinsk rådgivning kontaktas. Händer och

andra delar av kroppen som kan ha kommit i kontakt med kapselinnehållet bör tvättas av så snart som möjligt.

## **Andra läkemedel och Atomoxetin Glenmark**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar både receptbelagda och receptfria läkemedel. Din läkare avgör om du kan ta Atomoxetin Glenmark tillsammans med andra läkemedel och i vissa fall kan din läkare behöva justera din dos eller öka dosen mycket mer långsamt.

Ta inte Atomoxetin Glenmark tillsammans med läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare (monoaminooxidashämmare) som används vid depression. Se avsnitt 2. "Ta inte Atomoxetin Glenmark om du:".

Om du tar andra läkemedel, så kan Atomoxetin Glenmark påverka hur bra de fungerar eller orsaka biverkningar. Om du tar något av följande läkemedel, tala om detta för din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Glenmark:

- läkemedel som ökar blodtrycket eller används för att kontrollera blodtrycket
- läkemedel såsom medel mot depression t.ex. imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin och paroxetin
- vissa medel mot hosta och förkylning som innehåller läkemedel som kan påverka blodtrycket. Det är viktigt att kontrollera med apotekspersonal när du får dessa produkter
- vissa läkemedel som används för att behandla psykiska åkommor
- läkemedel som man vet kan öka risken för kramper

- vissa läkemedel kan göra att Atomoxetin Glenmark kan stanna kvar i kroppen längre tid än normalt (så som kinidin och terbinafin)
- salbutamol (ett läkemedel mot astma) kan ge en känsla av att hjärtat rusar när man tar det via munnen eller som en injektion, men detta kommer inte att förvärra din astma.

Läkemedlen nedan kan leda till en ökad risk för onormal hjärtrytm när de tas med Atomoxetin Glenmark:

- läkemedel som används för att behandla rytmstörningar i hjärtat
- läkemedel som förändrar koncentrationen av salter i blodet
- läkemedel för att förebygga och behandla malaria
- vissa antibiotika (såsom erytromycin och moxifloxacin).

Om du är osäker på om någon av de läkemedel du tar finns med i listan ovan, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Glenmark.

## **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om detta läkemedel påverkar det ofödda barnet eller passerar över i modersmjölken.

- Detta läkemedel ska inte tas under graviditet utan att du först rådfrågat din läkare.
- Du ska antingen sluta ta detta läkemedel eller undvika att amma.



## **Körförmåga och användning av maskiner**

Du kan känna dig trött, sömning eller yr när du tagit Atomoxetin Glenmark. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du vet hur Atomoxetin Glenmark påverkar dig. Om du känner dig trött, sömning eller yr bör du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **3. Hur du använder Atomoxetin Glenmark**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

#### **Hur mycket ska man ta**

##### **Vuxna**

- Behandlingen med Atomoxetin Glenmark bör inledas med en total daglig dos på 40 mg i minst 7 dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen på 80 mg -100 mg. Den maximala dagliga dosen som din läkare kommer att ordinera är 100 mg.

Om du har problem med din lever kan din läkare välja att ordinera en lägre dos.

- Kapslarna tas vanligtvis en eller två gånger dagligen (på morgonen och sent på eftermiddagen/tidigt på kvällen). Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om man tar det vid samma tid varje dag. Om du tar Atomoxetin Glenmark en gång dagligen och blir trött eller illamående kan din läkare ändra ordinationen till två gånger om dagen.

### **Barn eller ungdomar (6 år eller äldre):**

Din läkare kommer att informera dig om hur mycket Atomoxetin Glenmark du ska ta, dosen är beräknad efter din kroppsvikt. Han/hon kommer normalt att be dig starta med en låg dos för att sedan öka mängden Atomoxetin Glenmark du ska ta enligt din kroppsvikt.

- Kroppsvikt upp till 70 kg: en inledande total daglig dos på 0,5 mg per kg kroppsvikt i minst 7 dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen på ungefär 1,2 mg per kg kroppsvikt.
- Kroppsvikt över 70 kg: en inledande total dagsdos på 40 mg i minst 7 dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen på 80 mg. Den maximala dagliga dosen som din läkare kommer att ordinera är 100 mg.

Atomoxetin Glenmark är inte för behandling av barn under 6 år eftersom det inte är känt om behandlingen fungerar eller är säker för dessa personer.

### **Hur du använder läkemedlet**

- Ska sväljas.
- Kapslarna ska sväljas hela, med eller utan mat.
- Kapslarna ska inte öppnas och innehållet i kapseln får inte tas ur och intas på annat sätt.
- Barn ska inte ta detta läkemedel utan hjälp från en vuxen.

## **Behandlingstid**

Det kan ta några veckor efter det att du börjat ta läkemedlet innan läkemedlet når full effekt.

Atomoxetin Glenmark behöver man inte ta för all framtid. Om du tar Atomoxetin Glenmark i mer än ett år kommer din läkare att se över din behandling, för att utvärdera om läkemedlet fortfarande behövs.

## **Om du har tagit för stor mängd av Atomoxetin Glenmark**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Berätta hur många kapslar du har tagit. De vanligaste symtomen vid överdos är symtom från mage/tarm, sömnhet, yrsel, darrningar och onormalt beteende.

## **Om du har glömt att ta Atomoxetin Glenmark**

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg, men överskrid inte den totala dagliga dosen under en 24-timmarsperiod. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

## **Om du slutar att ta Atomoxetin Glenmark**

Om du slutar ta Atomoxetin Glenmark uppträder det oftast inga biverkningar, men dina ADHD symtom kan komma tillbaka. Du bör prata med din läkare innan du slutar med din behandling. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. **Om du får någon av biverkningarna nedan, uppsök genast läkare.**

**Mindre vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 1 00 användare)

- en känsla av eller att ha mycket snabb puls, onormal hjärtrytm.
- tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv
- känna sig aggressiv
- känna sig ovänlig och arg (fientlig)
- humörsvängningar eller förändringar i humöret
- allvarlig allergisk reaktion med symtom av
  - svullnad av ansiktet och halsen
  - svårigheter att andas
  - nässelutslag (små upphöjda, kliande fläckar i huden)
- kramper
- psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

**Barn och ungdomar under 18 år har en ökad risk för biverkningar som:**

- tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
- humörsvängningar eller förändringar i humöret (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

**Vuxna har en minskad risk (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) för biverkningar som:**

- kramper
- psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

**Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)**

- leverskada.

**Du ska sluta ta Atomoxetin Glenmark och genast kontakta din läkare om du har något av följande:**

- mörkfärgad urin
- gul hud eller gula ögon
- magsmärta och ömhet när du trycker på höger sida strax under revbenen
- oförklarligt illamående
- trötthet
- klåda

- influensaliknande symtom

**Andra rapporterade biverkningar inkluderar följande. Om de blir allvarliga, tala med din läkare eller apotekspersonal.**

<b>Mycket vanliga</b> biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)	
<b>BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder</b>	<b>VUXNA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- huvudvärk</li> <li>- magont</li> <li>- minskad aptit (inga hungerskänslor)</li> <li>- illamående eller kräkningar</li> <li>- sömnhet</li> <li>- förhöjt blodtryck</li> <li>- förhöjd hjärtfrekvens (puls)</li> </ul> <p>Dessa biverkningar kan försvinna efter en tid hos de flesta patienter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● illamående</li> <li>● muntorrhet</li> <li>● huvudvärk</li> <li>● minskad aptit (inga hungerskänslor)</li> <li>● svårt att somna, sova och vaknar tidigt</li> <li>● förhöjt blodtryck</li> <li>● förhöjd hjärtfrekvens (puls).</li> </ul>

<b>Vanliga</b> biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)	
<b>BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder</b>	<b>VUXNA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vara irriterad eller uppretad</li> <li>- sömnproblem, tidigt uppvaknande</li> <li>- depression</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- känna sig uppretad</li> </ul>

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- känna sig ledsen eller hopplös</li><li>- känna sig orolig</li><li>- tics (svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller att du upprepar ljud och ord)</li><li>- stora pupiller (den mörka delen i ögats centrum)</li><li>- yrsel</li><li>- förstoppning</li><li>- aptitlöshet</li><li>- matsmältningsstörningar</li><li>- svullen, röd och kliande hud</li><li>- utslag</li><li>- känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet) bröstsmärta</li><li>- utmattning</li><li>- viktminskning.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- minskat intresse för sex</li><li>- sömnstörningar</li><li>- depression</li><li>- känna sig ledsen eller hopplös</li><li>- känna sig orolig</li><li>- yrsel</li><li>- onormal smak eller smak i munnen som inte vill försvinna</li><li>- darrningar</li><li>- stickningar eller domningar i händer eller fötter</li><li>- sömnighet, dåsighet, trötthet</li><li>- förstoppning</li><li>- magont</li><li>- dålig matsmältning</li><li>- gaser i magen</li><li>- kräkningar</li><li>- värmevallningar eller rodnad</li><li>- känsla av att ha mycket snabb puls</li></ul> |
|---|--|

- svullen, röd och kliande hud
- ökad svettning
- utslag
- problem i samband med toalettbesök, så att man måste kissa ofta eller svårigheter att kissa, smärta när man kissar
- prostatainflammation (prostatit)
- ljumsksmärta hos män
- oförmåga att få erektion
- försenad orgasm
- svårigheter att behålla erektion
- kramp under menstruation
- svaghetskänsla
- utmattning
- känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)
- frossa
- känna sig irriterad, skakis



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- känna sig törstig</li> <li>- viktminskning.</li> </ul>
--	---

**Mindre vanliga** biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

<b>BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder</b>	<b>VUXNA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- att svimma</li> <li>- darrningar</li> <li>- migrän</li> <li>- dimsyn</li> <li>- onormala förnimmelser i huden såsom brännande känsla, stickningar, klåda eller myrkrypningar</li> <li>- stickningar eller domningar i händer eller fötter</li> <li>- kramper (anfall)</li> <li>- en känsla av att ha eller har mycket snabb puls, (QT-förlängning)</li> <li>- andnöd</li> <li>- ökad svettning</li> <li>- kliande hud</li> <li>- svaghetskänsla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rastlöshet</li> <li>- tics</li> <li>- att svimma</li> <li>- migrän</li> <li>- dimsyn</li> <li>- onormal hjärtrytm (QT-förlängning)</li> <li>- köldkänsla i fingrar och tår</li> <li>- bröstsmärta</li> <li>- andnöd</li> <li>- svullen, röd och kliande hud (utslag)</li> <li>- muskelryckningar</li> <li>- ofta urinträngningar</li> <li>- onormal eller utebliven orgasm</li> <li>- oregelbunden menstruation</li> <li>- oförmåga att få utlösning.</li> </ul>

**Sällsynta** biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

<b>BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder</b>	<b>VUXNA</b>
---	--------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- dålig blodcirkulation som får tår och fingrar att domna och bli bleka (Raynauds fenomen)</li><li>- problem i samband med toalettbesök så som att man måste kissa ofta eller svårigheter att kissa, smärta när man kissar</li><li>- förlängda och smärtsamma erektioner</li><li>- ljumsksmärta hos pojkar.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- dålig blodcirkulation som får tår och fingrar att domna och bli bleka (Raynauds fenomen).</li><li>- förlängda och smärtsamma erektioner</li></ul> |
|---|---|



### **Effekt på tillväxt**

Vissa barn kan minska i tillväxt (vikt och längd) i början av behandlingen med Atomoxetin Glenmark. Däremot har man sett att vid långtidsbehandling återgår barnet sedan till den normala vikt och längd för barn i samma ålder. Din läkare kommer att följa ditt barns längd och vikt kontinuerligt. Om ditt barn inte växer eller ökar i vikt som förväntat, kan läkaren ändra på dosen eller tillfälligt avbryta behandlingen med Atomoxetin Glenmark.

### *Rapportering av biverkningar*

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **5. Hur Atomoxetin Glenmark ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

Den aktiva substansen är atomoxetin.

Atomoxetin Glenmark 10 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 10 mg atomoxetin motsvarande 11,43 mg atomoxetinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

*Kapselinnehåll:* Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

*Kapselhölje:* Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171).

Atomoxetin Glenmark 18 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 18 mg atomoxetin motsvarande 20,57 mg atomoxetinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

*Kapselinnehåll:* Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

*Kapselhölje:* Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

Atomoxetin Glenmark 25 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 25 mg atomoxetin motsvarande 28,57 mg atomoxetinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

*Kapselinnehåll:* Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

*Kapselhölje:* Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), indigokarmin (E132).

Atomoxetin Glenmark 40 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 40 mg atomoxetin motsvarande 45,71 mg atomoxetinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

*Kapselinnehåll:* Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

*Kapselhölje:* Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), indigokarmin (E132).

Atomoxetin Glenmark 60 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 60 mg atomoxetin motsvarande 68,57 mg atomoxetinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

*Kapselinnehåll:* Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

*Kapselhölje:* Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), indigokarmin (E132), gul järnoxid (E172).

Atomoxetin Glenmark 80 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 80 mg atomoxetin motsvarande 91,42 mg atomoxetinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

*Kapselinnehåll:* Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

*Kapselhölje:* Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

Atomoxetin Glenmark 100 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 100 mg atomoxetin motsvarande 114,28 mg atomoxetinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

*Kapselinnehåll:* Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

*Kapselhölje:* Gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

Svart tryckfärg består av: shellack-45 % (20 % esterifierad) i etanol, svart järnoxid (E172), propylenglykol.

## Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atomoxetin Glenmark 10 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel storlek 3 (ca  $15,7 \pm 0,4$  mm längd), ogenomskinlig, vit överdel märkt med "10" i svart bläck och ogenomskinlig, vit underdel märkt med "mg" i svart bläck.

Atomoxetin Glenmark 18 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel, storlek 3 ( $15,7 \pm 0,4$  mm lång), ogenomskinlig, gul överdel märkt med "18" i svart bläck och ogenomskinlig, vit underdel märkt med "mg" i svart bläck.

Atomoxetin Genmark 25 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel, storlek 3 ( $15,7 \pm 0,4$  mm lång), ogenomskinlig, blå överdel märkt med "25" i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel märkt med "mg" i svart bläck.

Atomoxetin Genmark 40 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel, storlek 3 ( $15,7 \pm 0,4$  mm lång), ogenomskinlig, blå överdel märkt med "40" i svart bläck och ogenomskinlig, blå underdel märkt med "mg" i svart bläck.

Atomoxetin Genmark 60 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel, storlek 2 ( $17,6 \pm 0,4$  mm lång), ogenomskinlig, blå överdel märkt med "60" i svart bläck och ogenomskinlig, gul underdel märkt med "mg" i svart bläck.

Atomoxetin Genmark 80 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel, storlek 2 ( $17,6 \pm 0,4$  mm lång), ogenomskinlig, brun överdel märkt med "80" i svart bläck och ogenomskinlig, vit underdel märkt med "mg" i svart bläck.

Atomoxetin Glenmark 100 mg hårda kapslar  
Hård gelatinkapsel, storlek 1 (19,1 ± 0,4 mm lång), ogenomskinlig,  
brun överdel märkt med "100" i svart bläck och ogenomskinlig,  
brun underdel märkt med "mg" i svart bläck.

Atomoxetin Glenmark 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg och 60 mg  
finns i förpackningar om 7, 28, 30 och 56 kapslar.

Atomoxetin Glenmark 80 mg och 100 mg finns i förpackningar om  
28, 30 och 56 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att  
marknadsföras.

## **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Glenmark Arzneimittel GmbH  
Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,  
Tyskland

### **Tillverkare**

Pharmathen International SA  
Dervenakion 4, Pallini Attiki, 15351, Grekland  
Site Address: Pharmathen International SA, Industrial, Park Sapes,  
Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grekland

Pharmathen SA  
Dervenakion 6  
Pallini 15351  
Attiki, Grekland

Pharmadox Healthcare Ltd  
KW20A Kordin Industrial Park,  
Paola PLA 3000,  
Malta

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  
Praha 4, Hvezdova 1716/2b, 140 78, Tjeckien  
Site Address: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.,  
Fibichova 143, 566 17, Vysoke Myto, Tjeckien

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-02