

## Alcosanal<sup>®</sup>

EF

### Meda

Rektalsalva 110 mg/g  
(vit)

Antihemorroidalmedel

### Aktiv substans:

Natriumoleat

### ATC-kod:

C05AX03

Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Texten nedan gäller för:

**Alcosanal<sup>®</sup>** rektalsalva 110 mg/g; suppositorium 200 mg

**FASS-text:** *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-15 (rektalsalva), 2016-09-23 (suppositorium).*

## Indikationer

Hemorroider, analfissurer, analeksem samt postoperativt som recidivprofylax.

## Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

## Dosering

Salvan eller 1 suppositorium appliceras morgon och kväll.

## Graviditet

Kategori A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

## Amning

Grupp IVa.

Uppgift saknas om ALCOSANAL passerar över i modersmjölk.

## Biverkningar

Sällsynta (1/1000 - 1/10000)	Hud: Sveda, klåda.
---------------------------------	--------------------

De få fall av biverkningar som rapporterats anses ha samband med den adstringerande effekten. Kontaktdermatit kan anses vara en möjlighet.

### *Rapportering av misstänkta biverkningar*

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Postadress

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala

## Farmakodynamik

ALCOSANAL är vävnadsvänligt och har en adstringerande och klådstillande effekt.

## Innehåll

*1 g salva innehåller:* Natriumoleat 110 mg, konserveringsmedel (Oxynex LM, 5-klorkarvakrol), ullfett, flytande paraffin, oleyloleat, glycerol, renat vatten.

*1 suppositorium innehåller:* Natriumoleat 200 mg, konserveringsmedel (Oxynex LM, 5-klorkarvakrol), hårdfett, oleyloleat, renat vatten.

## Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 °C (suppositorium).

## Förpackningsinformation

*Rektalsalva 110 mg/g (vit)*

20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

*Suppositorium 200 mg (vitt)*

10 styck blister, receptfri (fri prissättning), *tillhandahålls för närvarande ej*

25 styck blister, receptfri (fri prissättning), *tillhandahålls för närvarande ej*