

Canergy vet

R_x

Virbac

Tablett 100 mg

(ljusbrun med bruna fläckar, rund och konvex med brytskåra på ena sidan, köttsmak)

perifert vasodilaterande medel

Djurslag:

Hund

Aktiv substans:

Propentofyllin

ATC-kod:

QC04AD90

FASS VET-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-12-21.

Innehåll

En tablett innehåller: Propentofyllin 100 mg, laktosmonohydrat, majsstärkelse, krosprovidon, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumbehenat, jäst, avaktiverad, artificiell köttsmak

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Propentofyllin har visat sig öka blodflöde, särskilt i hjärtat och skelettmuskulatur. Det ökar också blodflödet i hjärnan och därmed dess syretillförsel, utan att öka hjärnans glukosbehov. Det har en blygsam kronotrop effekt och en tydlig positiv inotrop effekt. Dessutom har det visat sig ha en antiarytmisk effekt på hundar med myokardischemi och en bronkodilaterande effekt motsvarande den hos aminofyllin.

Propentofyllin hämmar trombocyttaggregation och förbättrar erytrocyternas flödesegenskaper.

Det har en direkt effekt på hjärtat och minskar perifert vaskulärt motstånd vilket således minskar kardiell belastning.

Propentofyllin kan öka viljan att motionera och motionstolerans, framför allt hos äldre hundar.

Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas propentofyllin snabbt och fullständigt och distribueras snabbt till vävnaderna. Maximala plasmanivåer nås 15 minuter efter oral dosering till hundar.

Halveringstiden är cirka 30 minuter och biotillgängligheten för moderssubstansen är cirka 30 %. Det finns ett flera effektiva metaboliter och metabolismen sker i huvudsak i levern. 80-90 % av propentofyllin utsöndras i form av metaboliter via njurarna. Resten elimineras via faeces. Det sker ingen bioackumulering.

Indikationer

För att förbättra perifer och cerebral vaskulär cirkulation. För förbättring av matthet, slöhet och allmänt medvetande hos hundar.

Kontraindikationer

Se avsnitt Däktighet och laktation

Använd inte till hundar som väger mindre än 5 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Specifika sjukdomar (t.ex. njursjukdom) ska behandlas.

Revidering av behandlingen till hundar som redan behandlas mot kronisk hjärtsvikt eller luftrörssjukdom bör övervägas.

Vid njursvikt bör dosen reduceras.

Dräktighet och laktation







Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och/eller laktation. Användning till dräktiga eller lakterande tikar eller på avelsdjur rekommenderas därför inte.





Biverkningar























I sällsynta fall (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur), har allergiska hudreaktioner, kräkningar och hjärtstörningar rapporterats. I dessa fall ska behandlingen avbrytas.

Dosering

Normaldosen är 6-10 mg propentofyllin/kg kroppsvikt dagligen uppdelat på två doser enligt följande:


Kroppsvikt (kg)	100 mg tabletter		Totalt antal tabletter dagligen	Daglig total dos (mg/kg)
	Morgon	Kväll		
5 kg-8 kg			1/2	6,25-10,0
>8 kg-10 kg			3/4	7,5-9,4
>10 kg-15 kg			1	6,7-10,0
>15 kg-25 kg			1 1/2	6,0-10,0

 = 1/4 tablett  = 1/2 tablett  = 3/4 tablett  = 1 tablett

				
>25 kg-33 kg			2	6,1-8,0
>33 kg-49 kg	 	 	3	6,1-9,1
>49 kg-66 kg	 	 	4	6,1-8,2
>66 kg-83 kg	  	  	5	6,0-7,6
 = ¼ tablett  = ½ tablett  = ¼ tablett  = 1 tablett				

Tabletterna kan administreras direkt i munnen, baktill på hundens tunga eller blandas i en liten boll med föda och bör administreras minst 30 minuter före utfodring.

Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med dess skårade sida uppåt och den konvexa (rundade) sidan mot ytan.



Halvor: tryck med tummarna på tabletternas båda sidor.

Fjärdedelar: tryck ned tummen mitt på tabletten.

Överdoser

Takykardi vid upphetsning, hypotoni, rodnad av slemhinnor och kräkningar. Utsättning av behandlingen leder till en spontan remission av dessa tecken.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Försiktighet ska iaktas för att förhindra oavsiktligt intag.

I händelse av oavsiktligt intag av tabletter, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

Hållbarhet

Hållbarhet för delade tabletter i öppnad innerförpackning: 4 dagar.

Förvaring

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Alla oanvända tablettedelar ska läggas tillbaka i det öppnade blistret och läggas tillbaka i kartongen för användning vid nästa administrering.

Förpackningsinformation

Tablett 100 mg (ljusbrun med bruna fläckar, rund och konvex med brytskåra på ena sidan, köttsmak)
100 tablett(er) blister, receptbelagd