

*Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

## **1 NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL**

Banminth vet. 44 % oral pasta

## **2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING**

### **2.1 Aktivt(a) innehållsämne(n)**

Pyrantelembonat 439 mg per g pasta.

### **2.2 Förteckning över hjälpämnen**

Sorbitol 127 mg, natriumalginat 13 mg, polysorbat 0,84 mg, metylparaben E218 1,05 mg, propylparaben E216 0,3 mg och renat vatten till 1 g.

## **3 LÄKEMEDELSFORM**

Oral pasta

## **4 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER**

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot trematoder, nematoder och cestoder.

ATCvet-kod: QP52AF02

### **4.1 Farmakodynamiska egenskaper**

Pyrantelpamoat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralytisk av masken. Hos bandmask hämmar pyrantel ett antal biologiskt aktiva aminer. Pyrantel har hög aktivitet (>90 %) mot matura och immatura stadier av stora och små strongylider, spolmask och springmask. Substansen har vidare god effekt mot matura stadier av bandmask.

## 4.2 Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantelpamoat är svårlösligt i vatten och absorberas dåligt från tarmkanalen.

De små mängder som absorberas (ca 10 %) metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

## 5 KLINISKA UPPGIFTER

### 5.1 Djurslag

Häst

### 5.2 Indikationer

För behandling av adulta infektioner av strongylider (inkl. benzimidazol-resistenta små strongylider), *Oxyuris*, *Parascaris* och *Anoplocephala perfoliata*.

### 5.3 Kontraindikationer

Inga kända.

### 5.4 Biverkningar

Inga kända.

### 5.5 Särskilda försiktighetsmått vid användning

Inga.

## **5.6 Dräktighet och laktation**

Kan ges till dräktiga och lakterande ston.

## **5.7 Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktioner**

Inga kända.

## **5.8 Dosering och administreringsätt**

*Rundmaskar:* Normaldos 19 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 600 kg.

*Bandmask:* Normaldos 38 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 300 kg.

## **5.9 Överdoser**

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

## **5.10 Särskilda varningar för respektive djurslag**

Inga.

## **5.11 Karenstid**

Slakt: 0 dygn

## **5.12 Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur**

Inga särskilda.

## **6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER**

## **6.1 Blandbarhet**

Inga kända.

## **6.2 Hållbarhet**

3 år

## **6.3 Särskilda förvaringsanvisningar**

Förvaras vid högst 25° C.

## **6.4 Förpackningstyp och innehåll**

Engångsspruta av plast 26 g.

Förpackningsstorlek: 1x26 g, 2x26 g, 10x26 g respektive 10x10x26 g.

## **6.5 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall**

Överbliven medicin lämnas till apotek för destruktion.

## **7 FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING**

-

## **8 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING**

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki/Helsingfors

Finland

## **9 NUMMER PÅ GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING**

9395

## **10 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

Första godkännandet: 1979-02-23

Förnyat godkännande: 2010-01-01

## **11 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

2015-07-27