

Bipacksedel: Information till användaren

## **Probecid**

500 mg tabletter

probenecid

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Probecid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Probecid
3. Hur du använder Probecid
4. Eventuella biverkningar

5. Hur Probecid ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

## **1. Vad Probecid är och vad det används för**

Probecid innehåller den aktiva substansen probenecid och används vid gikt för att lindra giktbesvär. Probecid påskyndar utsöndringen av urinsyra genom att förhindra att denna återupptas i njurarna. Därigenom sjunker blodets halt av urinsyra och detta leder till minskade giktbesvär. Tillförsel av Probecid skall ske kontinuerligt. Vid avbrytande av behandling stiger blodets halt av urinsyra. Probecid saknar direkt smärtlindrande effekt. Vid akuta giktanfall måste därför smärtlindrande preparat användas.

Probecid hämmar också utsöndringen av penicillin via njurarna och kan i vissa speciella fall användas för att förstärka penicillinets effekt. Om Probecid ges tillsammans med penicillin erhålles därför högre halt av penicillin i kroppen under längre tid. Penicillindoserna kan då ges med längre mellanrum.

## **2. Vad du behöver veta innan du använder Probecid**

### **Ta inte Probecid:**

- om du är allergisk mot probenecid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har svåra njurskador.

## **Andra läkemedel och Probecid**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Probecid kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel såsom:

- metotrexat (läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet)
- naproxen, indometacin, ketorolak (läkemedel mot inflammation och reumatism)
- zidovudin (virushämmande läkemedel)
- paracetamol (läkemedel mot smärta och feber)

## **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

*Graviditet:* Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Probecid under graviditet.

*Amning:* Okänt om Probecid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare *före* regelbunden användning under amning.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Probecid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

## **3. Hur du använder Probecid**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för *vuxna* vid gikt är 1 tablett 2 gånger dagligen (första veckan dock 1/2 tablett 2 gånger dagligen).

Du bör dricka mycket när du använder Probecid vid giktbehandling.

Vanlig dos för *vuxna* vid kombination med penicillin är 2 tabletter 2 gånger dagligen.

## **Om du har tagit för stor mängd av Probecid**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

*Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):*

Illamående

*Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):*

Hudutslag

*Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):*

Coombs positiv hemolytisk anemi (en speciell typ av blodbrist)

*Rapportering av biverkningar*

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **5. Hur Probecid ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är probenecid 500 mg.
- Övriga innehållsämnen är gelatin, potatisstärkelse, kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, talk och magnesiumstearat.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

*Förpackningsstorlek:* Plastburk, 50 st tabletter.

# **Innehavare av godkännande för försäljning**

BioPhausia AB, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm

## **Tillverkare**

Recipharm Stockholm AB, Jordbro

Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-06