

Bipacksedel: Information till användaren

## **Ery-Max**

250 mg enterokapslar, hårda  
erytromycin

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Ery-Max är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Ery-Max
3. Hur du använder Ery-Max
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ery-Max ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

# 1. Vad Ery-Max är och vad det används för

Ery-Max stör bakteriernas produktion av för dem livsviktiga ämnen och hindrar dem därmed från att föröka sig.

Ery-Max används vid lunginflammation orsakad av vissa ovanliga bakterier, vid kikhosta och difteri samt vid infektioner i underlivet orsakade av Chlamydia-bakterien.

Ery-Max används även vid öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och hud- och mjukdelsinfektioner vid överkänslighet för penicillin.

# 2. Vad du behöver veta innan du tar Ery-Max

## Ta inte Ery-Max:

- om du är allergisk mot erytromycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du tidigare visat dig vara överkänslig för makrolider (den grupp av antibiotika som Ery-Max tillhör).
- om du har vissa hjärtrytmrubbningar (långt QT-syndrom, eller förvärvad QT-förlängning).
- om du samtidigt använder läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (läkemedel mot allergi), cisaprid (läkemedel mot störningar i mag-tarmkanalen), disopyramid (läkemedel mot hjärtbesvär), pimozid (läkemedel vid psykisk sjukdom), ergotamin (läkemedel mot migrän), dihydroergotamin (läkemedel mot lågt blodtryck) eller statiner (läkemedel för kontroll av blodfetter).

## Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ery-Max. Om du har nedsatt leverfunktion eller myastenia gravis bör du rådgöra med läkare innan behandling med Ery-Max påbörjas.

Om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir irriterat vid matning bör du omedelbart kontakta läkare eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.

## Andra läkemedel och Ery-Max

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ery-Max, till exempel:

- mot hjärtbesvär (kinidin, digoxin)
- mot smärta vid operationer (alfentanil)
- med lugnande effekt (alprazolam, midazolam)
- mot Parkinsons sjukdom (bromokriptin)
- mot ångest (buspiron)
- vid transplantation (ciklosporin, takrolimus)
- mot magsår (cimetidin)
- mot allergi (fexofenadin)
- mot epilepsi (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)
- mot psykiska sjukdomar (klozapin)
- mot inflammation (metylprednisolon)
- mot erektionsproblem (sildenafil)
- mot astma (teofyllin)
- mot smärta (tramadol)
- mot sömnbesvär (triazolam, zopiklon)
- med blodförtunnande effekt (warfarin)
- vid behandling av cancer (vinca-alkaloider)

- vid tuberkulos (rifampicin)

Användningen av naturläkemedel innehållande Johannesört kan påverka behandlingen med Ery-Max.

## **Graviditet och amning**

Det finns risk för fosterskadande effekter. Ery-Max ska därför inte användas vid graviditet eller då graviditet planeras annat än på bestämd ordination av läkare.

Erytromycin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ery-Max under amning.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Ery-Max har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

## **Ery-Max innehåller laktos**

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

## **3. Hur du använder Ery-Max**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

*Vanlig dos för vuxna:* 2 kapslar (à 250 mg) 2 gånger dagligen. Ery-Max kan tas i samband med måltid.

Kapslarna bör sväljas hela. Vid behov kan kapseln öppnas men innehållet får inte krossas eller tuggas.

*Även om du känner dig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att du tar hela Ery-Maxkuren enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.*

## **Om du har tagit för stor mängd av Ery-Max**

Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

*Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas):* Magknip, illamående, diarré och hudutslag.

*Mindre vanliga:* Nässelutslag.

*Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas):* Förhöjda levervärden, ökning av gallfärgämne (bilirubinstegring), gallstockning i levern (intrahepatisk gallstas), kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) och övergående hörsselförlust.

*Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):* Förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (förlängt QTc-intervall, syns på EKG), påverkan på hjärtrytmen.

Kontakta omedelbart läkare om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir oroligt i samband med matning eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och sjukhus eller behandlande läkare kontaktas. Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.

Kontakta genast läkare om du får en allvarlig hudreaktion: röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos). Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats).

### *Rapportering av biverkningar*

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **5. Hur Ery-Max ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. Dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är erytromycin. En enterokapsel innehåller 250 mg erytromycin.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 26 mg (sötningsmedel), dietylfталat, kaliumfosfat, cellacefat, povidon, gelatin, järnoxid (färgämne E 172).

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna  
Telefon 08-630 19 00

Denna bipacksedel ändrades senast 2018-11-12