

## Resulax<sup>®</sup>

F<sub>f</sub>

### Meda

Rektallösning 8,5 g

(Klar, färglös till svagt gul trögflytande lösning.)

Snabbverkande mikrolavemang

### Aktiv substans:

Sorbitol

### ATC-kod:

A06AG07

Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

**FASS-text:** *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-25.*

## Indikationer

Rektumobstipation. Förberedelse vid rektoskopi. För att åstadkomma tarmtömning före och efter t ex förlossning och kirurgiska ingrepp.

## Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen.

## Dosering

*Vuxna och barn:* Innehållet i en tub appliceras rektalt. Till barn under tre år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen. Förslutningsringen träs därför över tubspetsen som stopp, och spetsen förs därefter in så långt det går.

## Varningar och försiktighet

Inga särskilda.

## Interaktioner

Inga kända.

## Graviditet

Kategori A.

Resulax förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

## Amning

Grupp I.

Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

## Trafik

Resulax har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

## Biverkningar

Inga kända.

### *Rapportering av misstänkta biverkningar*

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## Överdoser

Inga kända fall.

## Farmakodynamik

Resulax är ett mikrolavemang avsett för engångsbruk. Sorbitol mjukar upp hårda fekalier och verkar smörjande på tarmslemhinnan och underlättar därigenom tarmtömningen på ett fysiologiskt sätt. Effekten insätter vanligen inom 5-15 minuter. Vid studier på äldre patienter har en övervägande del av dessa fått god effekt av en dos Resulax. Vid behov kan ytterligare en dos Resulax ges.

## Innehåll

1 ml rektallösning innehåller sorbitol 850 mg och vatten.

## Hållbarhet, förvaring och hantering

För en illustrerad bruksanvisning, se produktresumé på Fass.se.

## Förpackningsinformation

*Rektallösning 8,5 g Klar*, färglös till svagt gul trögflytande lösning.

4 styck tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

50 styck tub, receptfri, 240:67, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

50 styck flaska, receptfri (fri prissättning), *tillhandahålls för närvarande ej*

8 x 50 styck flaska, receptfri (fri prissättning), *tillhandahålls för närvarande ej*