

Bipacksedel: Information till användaren

## Angemin

1 mg/2 mg filmdragerade tabletter  
Estradiol /Drospirenon

### **Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Angemin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Angemin
3. Hur du använder Angemin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Angemin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### **1. Vad Angemin är och vad det används för**

Angemin är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon; ett östrogen och ett gestagen. Angemin används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 1 år efter deras sista naturliga menstruation.

#### **Angemin används för att:**

##### **Lindra symtom under och efter övergångsåldern**

När menstruationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som svettningar och värmevallningar. Angemin lindrar dessa symtom efter menopaus. Angemin ska bara användas om besvären ger problem i det dagliga livet.

##### **Förebygga benskörhet**

Efter menopaus drabbas vissa kvinnor av benskörhet (osteoporos). Diskutera alla tänkbara möjligheter med

din läkare.

Om du har en ökad risk för frakturer (benbrott) och andra läkemedel inte passar för dig kan du använda Angemin för att förebygga benskörhet efter menopaus.

Angemin är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon; ett östrogen och ett gestagen. Angemin används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 1 år efter deras sista naturliga menstruation.

## 2. Vad du behöver veta innan du använder Angemin

### Använd inte Angemin

#### Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

Användning av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller fortsätta en pågående behandling.

Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.

Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen, och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av bröstet.

När du påbörjat behandling med Angemin ska du gå på regelbundna läkarkontroller (minst en gång per år). Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling med Angemin.

**Gör regelbundna undersökningar av bröstet enligt läkarens rekommendationer.**

#### Ta inte Angemin

om något av följande gäller dig. **Tala med din läkare** innan du tar Angemin om du är osäker.

- om du har eller har haft **bröstcancer** eller om det finns misstanke att du kan ha det.
- om du har en **östrogenberoende tumör** t. ex. cancer i livmoderslemhinnan (endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer.
- om du har **oförklarliga blödningar från underlivet**
- om du har kraftig **förtjockning av livmoderslemhinnan** (endometriehyperplasi) och inte behandlas för det.
- om du har eller har haft **blodpropp i en ven** (venös tromboembolism) t ex i benen (djup ventrombos) **eller i lungorna** (lungemboli).
- om du har en **koagulationsrubbing**, ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C, protein S eller antitrombin).
- om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som **hjärtinfarkt, stroke** (slaganfall) **eller kärlkramp**.
- om du har eller någonsin har haft någon **leversjukdom** och fortfarande har onormala leverfunktionsvärden.
- om du har **porfyri** (en sällsynt, ärftlig blodsjukdom).
- om du har en **allvarlig njursjukdom eller akut njursvikt**.

- om du är **allergisk** (överkänslig) mot östrogener, gestagener eller något av övriga ämnen som ingår i Angemin (dessa är listade i avsnitt 6).

Om något av ovanstående tillstånd drabbar dig första gången du använder Angemin, ska du genast sluta ta Angemin och omedelbart kontakta läkare.

## Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Angemin.

Tala med din läkare om du någonsin har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen. De kan återkomma eller förvärras under behandling med Angemin. Om det skulle inträffa ska du göra tätare kontroller hos läkare.

- godartad vävnadsknuta i livmodern
- tillväxt av livmoderslemhinna utanför livmodern (endometrios) eller onormal tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)
- ökad risk för blodproppar (se "Blodproppar i en ven (trombos)")
- ökad risk för att drabbas av en östrogenberoende tumör (om du t ex har en mor, syster eller mormor som har haft bröstcancer)
- högt blodtryck
- leversjukdom, t ex godartad levertumör
- diabetes
- gallsten
- migrän eller kraftig huvudvärk
- en sjukdom i immunsystemet som påverkar många av kroppens organ (systemisk lupus erythematosus, SLE)
- epilepsi
- astma
- en sjukdom som drabbar mellanörat och hörseln (otoskleros)
- mycket hög nivå av fett i blodet (triglycerider)
- vätskeansamling som beror på hjärt- eller njurproblem

### Sluta ta Angemin och uppsök omedelbart läkare

Om du märker något av följande när du använder HRT:

- något av det som nämns i avsnittet "Ta inte Angemin"
- om hud eller ögonvitor blir guldfärgade (gulsot). Det kan vara tecken på leversjukdom
- om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet, yrsel)
- om du för första gången får migränliknande huvudvärk
- om du blir gravid
- om du får symtom på blodpropp som t ex
  - smärtsam svullnad och rodnad av benen
  - plötslig smärta i bröstet
  - andningssvårigheter

För ytterligare information, se "Blodpropp i en ven (trombos)"

**Observera:** Angemin är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista menstruation, eller om du är yngre än 50 år, kan du behöva använda preventivmedel för att förhindra graviditet. Be din läkare om råd.

## HRT och cancer

### **Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)**

Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer). Gestagenet i Angemin skyddar dig mot denna extra risk.

### **Oregelbundna blödningar**

Du kan få oregelbundna stänklödningar under de första 3 - 6 månaderna du tar Angemin.

Om de oregelbundna blödningarna:

- pågår under längre tid än de första 6 månaderna
- börjar efter att du tagit Angemin mer än 6 månader
- fortsätter efter att du slutat ta Angemin

**bör du snarast uppsöka läkare.**

### **Bröstcancer**

Uppgifter tyder på att behandling med kombinerad östrogen -gestagen, och möjligen även med enbart östrogen, ökar risken för bröstcancer. Den ökade risken beror på hur länge du tar HRT. Den ökade risken ses inom några år, men återgår till det normala inom några år (högst 5) efter att behandlingen upphört.

#### *Jämförelse*

För kvinnor i åldern 50 -79 år som inte tar HRT kommer i genomsnitt 9 - 17 av 1000 att få diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod. För kvinnor i åldern 50 - 79 år som tar östrogen-gestagen HRT under 5 år, kommer 13- 23 av 1000 användare att få diagnosen (dvs. 4 - 6 extra fall).

**Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:**

- gropar i huden
- förändringar av bröstvårtan
- knölar du kan se eller känna

Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som gör undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i bröstet. En ökad täthet i bröstet kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

### **Äggstockscancer (ovarialcancer)**

Äggstockscancer är sällsynt. En något ökad risk för äggstockscancer har rapporterats för kvinnor som använt HRT under minst 5 till 10 år.

För kvinnor i åldern 50 - 69 år som inte tar HRT kommer i genomsnitt 2 av 1000 att få diagnosen äggstockscancer under en 5-årsperiod. För kvinnor som har tar HRT under 5 år, kommer i genomsnitt 2 - 3 av 1000 att få diagnosen (dvs. upp till 1 extra fall).

## Hur HRT påverkar hjärta och cirkulation

### Blodproppar i en ven (trombos)

Risken för **blodpropp i en ven** är ungefär 1,3 - 3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, svimning eller till och med leda till döden.

Risken för blodpropp i en ven ökar med stigande ålder och om något av det som nämns nedan gäller dig. Informera din läkare om något av följande gäller dig:

- du kan inte gå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom (se även avsnitt 3, Om du ska genomgå en operation)
- du är kraftigt överviktig (BMI > 30 kg/m<sup>2</sup>)
- du har en koagulationsrubbningsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger blodproppar
- om någon nära släkting någonsin har haft en blodpropp i ben, lunga eller annat organ
- du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
- du har cancer

Symtomen för blodpropp finns beskrivet i avsnittet "Sluta ta Angemin och uppsök genast läkare".

#### *Jämförelse*

För kvinnor i 50-årsåldern som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 4 - 7 av 1000 att få en blodpropp i en ven.

Av kvinnor i 50-årsåldern som tar HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9 - 12 av 1000 användare att drabbas (dvs. 5 extra fall).

### Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.

Kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen löper en något högre risk att utveckla hjärtsjukdom än kvinnor som inte tar HRT.

### Stroke (slaganfall)

Risken för stroke är ungefär 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det. Ökningen av antalet fall av stroke, på grund av användning av HRT, ökar med stigande ålder.

#### *Jämförelse*

Av kvinnor i 50-årsåldern som inte använder HRT kan 8 av 1000 förväntas drabbas av stroke under en 5-årsperiod. Av kvinnor i 50-årsåldern som använder HRT väntas 11 av 1000 drabbas (dvs. 3 extra fall).

### Andra tillstånd

HRT förhindrar inte försämring av minnet. Det finns vissa bevis för att kvinnor som börjar använda HRT efter 65 års ålder har en ökad risk för försämrat minne. Rådgör med din läkare.

- Om du har en njursjukdom och har höga kaliumvärden, särskilt om du använder andra läkemedel som ökar nivåerna av serum-kalium, kan din läkare behöva mäta kaliumnivåerna i blodet under den första behandlingsmånaden.
- Om du har högt blodtryck, kan behandling med Angemin sänka det. Angemin ska inte användas för att behandla högt blodtryck.
- Om du har anlag för att utveckla pigmentförändringar (kloasma) i ansiktet ska du undvika att utsätta dig för solljus eller ultraviolett ljus när du tar Angemin.

## Andra läkemedel och Angemin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Angemin. Detta kan leda till oregelbundna blödningar. Det gäller följande läkemedel:

- läkemedel för **epilepsi** (t.ex. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)
- läkemedel för **tuberkulos** (t.ex. rifampicin och rifabutin)
- läkemedel för **HIV-infektioner** (t.ex. nevirapin, efavirenz, nelfinavir och ritonavir) och hepatit C-virusinfektioner
- naturläkemedel som innehåller **johannesört** (*Hypericum perforatum*)
- läkemedel för **svampinfektioner** (t.ex. itrakonazol, vorikonazol, flukonazol)
- läkemedel för **bakteriella infektioner** (t.ex. klaritromycin, erytromycin)
- läkemedel för **vissa hjärtsjukdomar, högt blodtryck** (t.ex. verapamil, diltiazem)
- grapefruktjuice

Följande kan leda till små ökningar av serum-kalium:

Läkemedel som används för behandling av:

- **inflammation** eller **smärta** (t.ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen)
- **vissa typer av hjärtsjukdom** eller **högt blodtryck** (t.ex. diuretika (vattendrivande läkemedel), ACE-hämmare (t.ex. enalapril), angiotensin II receptorantagonister (t.ex. losartan)). Om du behandlas för högt blodtryck och tar Angemin kan blodtrycket sänkas ytterligare.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel, växtbaserade läkemedel eller andra naturprodukter.

### Resultat från blodprovsanalyser

Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du tar Angemin eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

## Graviditet, amning och fertilitet

Angemin är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört.

Om du blir gravid ska du genast sluta ta Angemin och kontakta läkare.

## Körförmåga och användning av maskiner

Angemin påverkar inte din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

## Angemin innehåller laktos

Angemin innehåller laktos (ett slags socker). Kontakta din läkare innan du börjar använda detta läkemedel om du är **intolerant/allergisk mot vissa sockerarter**.

### 3. Hur du använder Angemin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är din läkare som avgör hur länge du ska ta Angemin.

Ta en tablett om dagen, helst vid samma tidpunkt. Svälj tabletten hel med lite vatten. Angemin kan tas tillsammans med måltid eller mellan måltider. När du tagit den sista tabletten i en tablettkarta, ska du nästa dag börja med en ny tablettkarta.

Gör inget uppehåll mellan kartorna.

**Om du har tagit andra HRT-preparat:** fortsätt tills du har tagit den sista tabletten i en tablettkarta och har tagit alla tabletter för den månaden. Ta din första Angemin-tablett nästa dag. Gör inget uppehåll mellan de gamla tabletterna och Angemin-tabletterna.

**Om detta är din första HRT-behandling:** du kan börja ta Angemin-tabletterna vilken dag som helst. Använd alltid Angemin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är din läkare som avgör hur länge du ska ta Angemin.

Ta en tablett om dagen, helst vid samma tidpunkt. Svälj tabletten hel med lite vätska. Angemin kan tas tillsammans med måltid eller mellan måltider. När du tagit den sista tabletten i en tablettkarta, ska du nästa dag börja med en ny tablettkarta.

Gör inget uppehåll mellan kartorna.

### Om du har tagit för stor mängd av Angemin

Om du av misstag fått i dig för stor mängd Angemin kan du bli illamående, kräkas eller få menstruationsliknande blödningar. Ingen särskild behandling är nödvändig men du bör tala med din läkare eller apotekspersonal om du känner dig orolig.

### Om du har glömt att använda Angemin

Om du glömt att ta en tablett vid den vanliga tidpunkten och om det gått mindre än 24 timmar bör du ta den så snart som möjligt.

Om det har gått mer än 24 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett, lämna då den glömda tabletten i förpackningen. Fortsätt sedan att ta nästa tablett på samma tid som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda tabletten. Om du glömmet att ta din tablett flera dagar i rad kan du få oregelbundna blödningar.

### Om du slutar ta Angemin

Du kan åter känna av de vanliga klimakteriesymtomen, som t. ex. värmevallningar, sömnproblem, nervositet, yrsel eller vaginal torrhet. Du kommer också att börja tappa benmassa när du slutar använda Angemin. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du vill sluta ta Angemin. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

### Om du behöver genomgå en operation

Om du ska genomgå en operation, berätta för kirurgen att du tar Angemin. Du kanske måste sluta använda Angemin 4 till 6 veckor före operationen för att minska risken för blodpropp (se även avsnitt 2 "Angemin och blodpropp"). Fråga din läkare när du kan börja använda Angemin igen.

## 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Angemin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:

- bröstcancer
- kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)
- äggstockscancer
- blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)
- hjärtsjukdom
- stroke (slaganfall)
- sannolik minnesförsämring om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder

För mer information om dessa biverkningar, se avsnitt 2.

Likt alla läkemedel kan Angemin orsaka biverkningar men alla behöver inte drabbas. Nedan följer en förteckning över biverkningar som har kopplats till användning av Angemin,

**De vanligaste biverkningarna** (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

- oväntad menstruationsliknande blödning (se även avsnitt 2 "HRT och cancer/cancer i livmoderslemhinnan")
- ömmande bröst
- smärta i bröstet

**Oväntad menstruationsliknande blödning** uppträder under de första månaderna av behandlingen med Angemin. Den är oftast övergående och försvinner vanligen när behandlingen pågått en tid. Om besvären kvarstår bör du kontakta din läkare.

**Vanliga biverkningar** (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter):

- depression, humörsvängningar, nervositet
- huvudvärk
- buksmärta, illamående, bukförstoring
- bröstknutor (godartad bröstneoplasi), svullna bröst
- tillväxt av myom (muskelknutor i livmodern)
- icke-cancerogen tillväxt av celler vid livmoderhalsen (godartad cervikal tumör)
- blödningsstörningar
- flytningar
- kraftlöshet, lokaliserad vätskeansamling

**Mindre vanliga biverkningar** (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 patienter):



- viktökning eller viktnedgång, minskad eller ökad aptit, förhöjning av blodfetter
- sömnproblem, oro, minskad sexlust
- brännande eller stickande känsla, minskad koncentrationsförmåga, yrsel
- ögonbesvär (t. ex. röda ögon), synstörningar (t. ex. suddig syn)
- hjärtklappning
- blodpropp, venös trombos (se även avsnitt 2 "Blodpropp i en ven (trombos)"), högt blodtryck, migrän, kärlinflammation, åderbråck
- andfåddhet
- magproblem, diarré, förstoppning, kräkningar, muntorrhet, väderspänning, smakerändringar
- ändrade leverenzym (syns vid blodprov)
- hudbesvär, akne, håravfall, klåda, ökad behåring
- ryggvärk, ledvärk, värk i armar och ben, muskelspasmer
- urinvägsbesvär och urinvägsinfektioner
- bröstcancer, förtjockning av livmodersslemhinnan, godartad tumör i livmodern, svampinfektion i underlivet, torr slida och klåda i vagina
- bröstknutor (fibrocystiska bröstförändringar), påverkan på äggstockarna, livmoderhalsen och livmodern, smärta i bäckenet
- ansamling av vätska i kroppen, bröstsmärtor, allmän sjukdomskänsla, ökad svettning

**Sällsynta biverkningar** (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 patienter):

- blodbrist (anemi)
- yrsel
- öronringning (tinnitus)
- gallsten
- muskelsmärta
- äggledarinflammation
- mjölkproduktion utan att amma
- frossa

Följande biverkningar rapporterades från kliniska studier hos kvinnor med högt blodtryck:

- höga halter av kalium i blodet (hyperkalemi), som ibland kan leda till muskelspasmer, diarré, illamående, yrsel eller huvudvärk
- hjärtsvikt, hjärtförstoring, hjärtfladder, effekter på hjärtrytmen
- ökning av hormonet aldosteron i blodet

Följande biverkningar har rapporterades för andra HRT:

- sjukdomar i gallblåsan,
- olika hudsjukdomar
  - pigmentförändringar särskilt i ansiktet och på halsen, så kallade "graviditetsfläckar" (kloasma)
  - ömmande rodnade knölar på huden (erythema nodosum)
  - röda ringformade utslag ibland med blåsor i mitten (erythema multiforme)

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

### *Rapportering av biverkningar*

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala

## 5. Hur Angemin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för Angemin.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Vad Angemin innehåller

De **aktiva substanserna** är estradiol (som estradiolhemihydrat) och drospirenon; varje tablett innehåller 1 mg estradiol och 2 mg drospirenon.

**Övriga innehållsämnen** är laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, povidon och magnesiumstearat (E470b). Innehållsämnen i tablettens filmdragering är hypromellos (E464), makrogol 6000, talk (E553b), titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172).

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Angemin är filmdragerade tabletter. Tabletterna är röda, runda och har konvexa sidor. Bokstäverna DL finns inne i en regelbunden sexhörning på den ena sidan.

Angemin finns i blisterförpackningar som innehåller 28 tabletter med veckodagarnas namn tryckta på blistret. Det finns förpackningar med en eller tre blisterkartor.

### Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer AB  
Box 606  
SE-169 26 Solna

**Tillverkare**  
Bayer AG  
Müllerstrasse 178  
13353 Berlin  
Tyskland

**Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:**

Angeliq

- Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Estland, Tyskland, Grekland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien

Angemin

- Danmark, Island, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 2017-06-15.