

Användarinformation

Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dos inhalationspulver

Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dos inhalationspulver

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteketiketten.

Vad innehåller läkemedlet?

100 mikrogram/dos:

1 dos (inhalation) innehåller: *Verksamt ämne:* salbutamol 100 mikrogram. *Övrigt:* laktosmonohydrat 9,9 mg.

200 mikrogram/dos:

1 dos (inhalation) innehåller: *Verksamt ämne:* salbutamol 200 mikrogram. *Övrigt:* laktosmonohydrat 9 mg.

Hur verkar läkemedlet?

Buventol Easyhaler vidgar luftrören och gör det lättare att andas.

Innehavare av försäljningstillstånd

Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland

Vad används läkemedlet för?

Buventol Easyhaler används för symtomlindring vid astma och förvärring av astma, och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Buventol Easyhaler används också till att förebygga kramp i luftrören som utlöses av ansträngning, eller inför exponering av ett känt oundvikligt allergiframkallande ämne som kan utlösa astma. Buventol Easyhaler är till användning för vuxna och barn över 6 år.

När ska läkemedlet inte användas?

Vid överkänslighet mot salbutamol eller mjölkproteiner (hjälpämnet laktosmonohydrat innehåller mjölkprotein).

Att tänka på innan och under tiden du använder läkemedlet

Rådgör med läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar innan du börjar använda Buventol Easyhaler:

- hjärt- och kärlsjukdomar
- kärlkramp
- ökad sköldkörtelfunktion

- diabetes
- för låga kaliumvärden i blodet (hypokalemi).

Om du har för låga kaliumvärden i blodet (hypokalemi) kan detta tillstånd försämrats om Buventol Easyhaler används tillsammans med vattendrivande medel, steroider eller vissa andra läkemedel mot astma (xantinderivat). Kontakta i sådana fall din läkare för rådgivning.

Buventol Easyhaler innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Buventol Easyhaler försämrats, skall du kontakta din läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall betyder att annan behandling behövs.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Buventol Easyhaler under graviditeten.

Amning

Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare *före* användning under amning.

Trafikvarning

Inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder läkemedlet?

Vissa hjärtmediciner (betablockerare) kan upphäva effekten av Buventol Easyhaler. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna är 1-2 inhalationer vid behov.

Vanlig dos för barn över 6 år är 100-200 mikrogram 1-4 gånger om dagen.

Vid anfallskupering kan ytterligare inhalationer tas.

Effekten av en inhalation märks efter ett par minuter.

Läkemedlet följer med inandningen ner i luftrören när du andas in genom Easyhalern enligt bruksanvisningen. Barn bör alltid övervakas av en vuxen person när de använder Easyhaler.

Det är viktigt att hela dosen inandas ordentligt. När du känner en mild, söt smak i munnen kan du vara säker på att du fått i dig dosen.

Läs och följ bruksanvisningen noggrant!

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du har tagit för stor dos kan du få huvudvärk, hjärklappning, muskelkramp, rastlöshet, darrningar, yrsel, illamående, muntorrhet och trötthet.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

De biverkningar som orsakas av normala inhaledoser är lindriga och försvinner vanligen med fortsatt behandling.

Vanliga (mer än 1 patient av 100): Darrningar och hjärklappning, speciellt i början av behandlingen.

Mindre vanliga (mindre än 1 patient av 100): Huvudvärk, överkänslighetsreaktioner t.ex. klåda, utslag och svullnader.

Sällsynta (mindre än 1 patient av 1000): Kramp i luftrören (bronkospasm), mun- och halsirritation, hosta, låga kaliumvärden, muskelkramper, rastlöshet och yrsel, överaktivitet. Oregelbunden hjärtrytm.

Mycket sällsynt (mindre än 1 patient av 10 000): I mycket sällsynta fall kan vissa personer utveckla bröstsmärta (som tecken på kärlkramp) vid användning av Buventol Easyhaler. Om detta skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.

Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande ska du kontakta läkare.

Hur ska läkemedlet förvaras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Efter det att aluminiumfolien är öppnad är hållbarheten 6 månader. Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad förpackning är fuktkänslig.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Datum för senaste revidering av bipacksedeln 2011-03-23


ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV EASYHALER

Buventol Easyhaler är enkel att använda. Läs igenom dessa anvisningar först. De talar om vad du ska göra och vad du ska vara uppmärksam på.

PACKA UPP EASYHALER

Easyhaler (Figur 1) levereras i en laminatpåse för att hålla pulvret torrt. **Öppna inte påsen förrän du är redo att börja använda Easyhaler.**

Figur 1.



Det finns ett fodral som är frivilligt att använda. **Om du inte använder fodralet**, gå vidare till avsnittet "Ta en dos från Buventol Easyhaler (se b-figurerna).

Öppna fodralet och sätt in Easyhaler i det (figur 2). Kontrollera att skyddshuven täcker munstycket på Easyhaler (det förhindrar att Easyhaler doserar av misstag).

Figur 2.



Stäng fodralet om du inte ska använda Easyhaler omedelbart.

TA EN DOS FRÅN BUVENTOL EASYHALER


Om du använder ett lindrande inhalationsläkemedel ska du ta det först.

Öppna fodralet om du använder det.

Ta bort skyddshuven.


A. Skaka

Skaka Easyhaler kraftigt upp och ned tre till fem gånger (figur 3a eller 3b) för rätt pulverflöde och rätt dos. Håll därefter Easyhaler **upprätt**.



B. Klick

Håll Easyhaler mellan fingret och tummen och tryck en gång tills du hör ett klick (figur 4a eller 4b) och låt den klicka tillbaka för att dosera pulver i inhalationskanalen i munstycket. Fortsätt hålla Easyhaler upprätt.




Om du tror att du har klickat på Easyhaler mer än en gång, se avsnittet OBS! (figur 6a eller 6b).

C. Inhalera

I sittande eller stående

- Andas ut normalt (men andas INTE ut i Easyhaler).
- Placera munstycket i munnen mellan tänderna och slut läpparna ordentligt runt inhalatorn.
- Ta ett kraftigt och djupt andetag genom Easyhaler (figur 5a eller 5b).
- Ta bort Easyhaler från munnen.
- Håll andan i minst 5 sekunder, andas därefter normalt.

Figur 5a.




Figur 5b.




Kontrollera att du inte andas ut i Easyhaler, eftersom det kan täppa till den. Om detta inträffar se avsnitt OBS! (figur 6a eller 6b).

Figur 6a.



Figur 6b.



Upprepa **A**, **B** och **C** om du har ordinerats mer än en dos.

Sätt tillbaka skyddshuven på munstycket. Stäng fodralet om du använder det.


OBS!

Om du av misstag klickar på Easyhaler, eller om du har klickat mer än en gång, eller om du andas ut i den, knacka på munstycket för att tömma ut pulvret på bordet eller i handflatan (figur 6a eller 6b). Det säkerställer korrekt dosering. Börja därefter igen med steg A, B och C.


RENGÖRING

Rengör munstycket minst en gång i veckan med en ren, torr trasa eller en servett. Använd inte vatten eller andra vätskor, pulvret är fuktkänsligt. Om du använder fodralet kan du ta ut Easyhaler för att torka av den. När du sätter tillbaka den i fodralet, ska du sätta skyddshuven på munstycket för att förhindra dosering av misstag.

Figur 7a.




Figur 7b.



SKAFFA EN NY EASYHALER

Easyhaler har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar (figur 7a eller 7b). Räkneverket snurrar efter var 5:e dosering. När siffrorna blir röda finns det 20 doser kvar. Om du inte redan har en ny Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. När räkneverket når 0 måste du byta ut Easyhaler även om du fortfarande kan se pulvret i fönstret på baksidan av Easyhaler (figur 8).

Figur 8.



Spara fodralet till nästa Easyhaler.

Senaste revision. 2018-09-12