



CHECKLISTA FÖR SJÄLVADMINISTRERING AV NPLATE®

Kontrollera att din patient är ...

Vuxen	✓
Intresserad av och lämplig för hemadministrering	✓
På en stabil dos Nplate® - För självadministrering innebär en stabil dos Nplate® att patientens dos av Nplate® inte har behövt justerats under de senaste 4 veckorna. Patienter som behöver justera dosen får inte börja självadministrera förrän dosen har stabiliserats - dvs. tills deras dos av Nplate® inte har behövt justerats under minst 4 veckor	✓
Villig att genomgå utbildning Berätta för patienterna att hemadministrering innebär att de måste genomgå utbildning och att de måste visa att de kan självadministrera	✓

Se till att patienten återvänder hem med ...

Rätt dos inskriven i sin <i>Dagbok för självadministrering</i>	✓
Ett recept på Nplate® beredningsförpackning(ar) (se till att patienten inte har tagit med sig beredningssatsen för demonstration med placebo av misstag)	✓
Allt patientmaterial i <i>Utbildningspaketet för hemadministrering</i>	✓
Kontaktuppgifter till vårdpersonal (ska finnas inskrivna på baksidan av <i>Dagboken för självadministrering</i>, i avsnittet "Om du behöver hjälp...")	✓
Ett datum för återbesök efter de 4 första veckorna med självadministrering. Vid detta besök ska trombocyntalet kontrolleras och patienten ska återigen få vägledning vid beredning och administrering av Nplate®. Endast patienter som visar att de kan bereda och självadministrera Nplate® bör få fortsätta att göra det.	✓





För ytterligare information se www.fass.se

AMGEN[®]
© 2012 Amgen. All rights reserved.

Nplate_EU_Swedish_HAT Pack_EU RMP_JUNE-2018

