
DOSKORT

FLIXABI™ Infliximab från Biogen

Reumatoid artrit
3 mg/kg

**Ulcerös kolit, Crohns
sjukdom, psoriasisartrit,
ankyloserande spondylit
och psoriasis**
5 mg/kg

Exempelberäkning med en kroppsvikt på 64 kg

64 kg x 3 mg/
kg = 192 mg



Varje FLIXABI injektionsflaska innehåller 100 mg infliximab och du behöver att **bereda 2 injektionsflaskor** vardera med 10 ml vatten för injektioner. Av de 20 ml beredda lösning använd **19.2 ml för att förbereda den färdiga** infusionslösningen.

FÖRBERED INFUSIONSLÖSNINGEN



Förvara FLIXABI i kylskåp (2°C–8°C).



Beräkna dos och det antal FLIXABI-injektionsflaskor som behövs (1 injektionsflaska innehåller 100 mg infliximab) och bered varje injektionsflaska med 10 ml vatten för infusionsvätskor under aseptiska förhållanden med en spruta försedd med en 21 gauge (0,8 mm) eller en tunnare nål.



Ta bort flip-locket från injektionsflaskan. Torka av toppen (gummipropp) med en 70% alkoholservett.



Sätt in sprutans nål i mitten av gummiproppen och rikta strålen med vattnen till injektionsvätskor mot injektionsflaskans glasvägg.



Blanda lösningen genom att försiktigt rotera injektionsflaskan. Undvik att rotera flaskan kraftig eller för länge.
SKAKA INTE! Det är inte ovanligt att lösningen skummar vid beredningen.



Låt lösningen stå i 5 minuter.



Kontrollera att lösningen är färglös eller lätt gul och opaliserande. I lösningen uppstår ibland några små genomskinliga partiklar på grund av att infliximab är ett protein. Använd inte lösningen om den är grumlig, missfärgad eller innehåller andra främmande partiklar.



Späd den totala volymen av den beredda FLIXABI lösning till 250 ml med natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml (0,9%). Du ska ta bort motsvarande volym infusionslösning ur påse eller flaska innan tillsats av beredda FLIXABI så att den totala volymen är 250ml. Späd inte med något annat spädningsmedel. Blanda försiktigt.



Lösningen ska användas så snart som möjligt men definitivt inom 3 timmar efter beredning och spädning*. Förvara inte eventuell överbliven infusionsvätska för återanvändning.



FLIXABI ska ges intravenöst över en 2-timmarsperiod. Ge inte FLIXABI samtidigt med andra läkemedel i samma infusionsset. Använd endast ett infusionsset med en inbyggd, steril, icke-pyrogen filter med låg proteinbindning (porstorlek 1,2 µm eller mindre).



Övervakning i minst 1–2 timmar efter infusion med akututrustning tillgängligt.

* När beredning och spädning görs under aseptiska förhållanden kan FLIXABI infusionsvätska användas inom 24 timmar om den förvaras vid 2°C–8°C. Förvara inte eventuell överbliven infusionsvätska för återanvändning.

FLIXABI-behandling ska initieras och övervakas av läkare som har erfarenhet av diagnosen och behandling av reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdomar, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit eller psoriasis. FLIXABI ska ges intravenöst. FLIXABI-infusioner ska administreras av erfaren sjukvårdspersonal utbildad i att upptäcka infusionsrelaterade problem. Patienter som behandlas med FLIXABI ska ges bipacksedeln och det speciella Patientkortet.
Se alltid produktresumén för fullständig information.