

Sepelvaltimotauti – Hyödyllistä tietoa Xarelto®-hoidosta (rivaroksabaani)

Sait tämän esitteen, koska lääkärisi on määrännyt sinulle Xarelto-valmistetta sepelvaltimotaudin hoitoon. Esitteessä kerrotaan taudistasi ja selitetään, miksi on tärkeää ottaa Xarelto lääkärin määräämään tapaan.

Jos haluat lisätietoa sepelvaltimotaudista, voit ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

Täydelliset käyttöohjeet, ks. pakkauksessa oleva pakkausseloste tai www.fass.se.

Hoidon tarpeen syyt

Sepelvaltimotauti vaikuttaa sydämen pinnalla kulkeviin sepelvaltimoihin.¹

Taudin alussa sepelvaltimoiden sisään muodostuu rasvakertymiä, jotka huonontavat sydämen verenkiertoa. Joskus rasvakertymän päälle muodostuu verihyytymä, jolloin sepelvaltimo tukkeutuu kokonaan tai osittain ja sydämen verenkierto huononee äkillisesti. Tätä kutsutaan sydäninfarktiksi.^{2,3}

Riskien minimointi

Useimmiten muissa sepelvaltimoissa on edelleen rasvakertymiä, joten verihyytymiä voi muodostua muihinkin suoniin. Sinä ja hoitava lääkäri voitte yhteistyössä pienentää tämän tilanteen riskiä.

Tietoa Xarelto®-hoidon syistä

Sepelvaltimotautisi hoitosuunnitelman osana lääkäri on määrännyt sinulle sekä Xarelto-valmistetta että asetyylisalisyylihappoa. Hoidon avulla pyritään ehkäisemään verihyytymien muodostumista ja siten pienentämään riskiäsi saada sydäninfarkti tai aivohalvaus.

Tietoa Xarelto-valmisteen ja asetyylisalisyylihapon yhdistelmähoidosta

Xarelto-lääke ohentaa hieman verta ja pienentää siten riskiä, että sepelvaltimoihin muodostuu verihyytymiä. Myös asetyylisalisyylihapolla on verta ohentava vaikutus.

Yhdistelmähoidon käytön perusteet

Asetyylisalisyylihappo ja Xarelto ohentavat verta eri tavoin, ja yhdessä käytettyinä ne vaikuttavat tehokkaammin kuin kumpikaan lääkkeitä erikseen.

Xarelton ja asetyylisalisyylihapon yhdistelmähoito voi pienentää sydäninfarktin ja aivohalvauksen riskiä tehokkaammin kuin pelkkä asetyylisalisyylihappo.

Xarelto®-valmisteen ja asetyylisalisyylihapon vaikutustapa

Xarelto vähentää fibriiniverkon (eli verihyytymää muodostavan verkon) muodostusta, kun taas asetyylisalisyylihappo vähentää verihyutaleiden (eli verkkoa kiinnittävien solujen) aktivoitumista. Yhdessä käytettyinä ne pienentävät riskiä, että sepelvaltimoihin muodostuu verihyytymä.

Xarelto®-valmisteen ja asetyylisalisyylihapon ottaminen

Xarelto otetaan kahdesti vuorokaudessa ja asetyylisalisyylihappo kerran vuorokaudessa. Lääkkeenoton muistamista voi helpottaa erilaisin keinoin. Syötkö yleensä aina samaan aikaan tai käytätkö jotakin esinettä (esimerkiksi hammasharjaa) kahdesti vuorokaudessa?

Asetyylisalisyylihappo, 75 mg kerran vuorokaudessa (aamuisin TAI iltaisin). **Xarelto, 2,5 mg** kahdesti vuorokaudessa (aamuisin JA iltaisin).

Älä ota kaksinkertaista Xarelto-annosta äläkä kaksinkertaista asetyylisalisyylihappoannosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Xarelto®-hoidon kesto

Lääkäri päättää, miten pitkään hoitoasi tulee jatkaa.

Muuta tarvittavaa tietoa Xarelto®-hoidosta

Potilaskortti

Saat potilaskortin, jossa on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua tietoa verta ohentavasta lääkityksestäsi. Näytä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille, hammaslääkäreille ja sairaanhoitajille ja pidä se aina mukana (esim. lompakossa) tapaturmien ja äkillisten sairaustapausten varalta.

Muita keinoja parantaa tilannettasi

Muista, että on erittäin tärkeää ottaa lääkkeitä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Voit parantaa sepelvaltimoidesi tilannetta myös seuraavilla tavoilla:³

- ◆ Lopeta tupakointi.
- ◆ Liiku säännöllisesti.
- ◆ Pudota painoa tarvittaessa.
- ◆ Syö terveellisesti.

Jos otat enemmän Xarelto®-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos olet ottanut liikaa tabletteja. Liian suuren Xarelto-annoksen ottaminen suurentaa verenvuotojen riskiä.

Haittavaikutukset

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan niitä saa. Ota yhteys hoitavaan klinikkaan, jos sinulla esiintyy verenvuotoa esim. nenästä, suusta, virtsateistä tai mahasta/suolistosta. Hakeudu päivystykseen, jos sinulla on voimakasta verenvuotoa tai verenvuotoa, joka ei tyrehydy itsestään. Hakeudu päivystykseen myös siinä tapauksessa, että saat voimakkaan iskun vatsan, rintakehän tai pään alueelle. Näin varmistetaan, että sinulla ei ole sisäistä verenvuotoa. Ota myös yhteys päivystykseen, jos sinulla on epätavallista heikotusta, väsymystä, kalpeutta, huimausta, päänsärkyä, selittämätöntä turvotusta, lisääntynyttä hengästymistä, rintakipua tai rasisurintakipua. Ne voivat olla verenvuodon merkkejä.

Yhteiskäyttö muiden lääkkeiden kanssa

Älä ota tulehduskipulääkkeitä (esim. Voltaren, Naproxen) äläkä muita asetyylisalisyylihappo-valmisteita kysymättä ensin neuvoa lääkäriltä. Parasetamolia sisältäviä särkylääketabletteja (esim. Alvedon ja Panodil) voi käyttää yhdessä Xarelton kanssa. **On tärkeää, että kerrot hoitavalle lääkärille muista mahdollisesti käyttämistäsi lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä ja luontaistuotteita. Käänny myös lääkärin puoleen, jos käytät SSRI-lääkkeiden ryhmään kuuluvia masennuslääkkeitä.** Lääkäri päättää, miten hoitosi kohdalla toimitaan.

Rajoitukset

Ota yhteys hoitavaan lääkäriin:

- ♦ jos olet allerginen (yliherkkä) rivaroksabaanille tai Xarelton jollekin muulle aineelle
- ♦ jos sinulla on runsasta verenvuotoa tai jatkuvaa verenvuotoa
- ♦ jos sinulla on maksasairaus tai jokin muu tila, joka suurentaa verenvuotoriskiä
- ♦ jos olet raskaana tai imetät
- ♦ jos olet menossa suunniteltuun leikkaukseen tai sinulta aiotaan ottaa kudoksenäyte.

Ota yhteys hammaslääkäriin, jos sinulle suunnitellaan esimerkiksi hampaanpoistoa, ja kerro hänelle Xarelto-hoidostasi. Ota myös yhteys hoitavaan lääkäriin, jos suunnittelet raskautta.

HUOM. Tämä esite ei korvaa lääkärin eikä muiden terveydenhuollon ammattilaisten antamia neuvoja ja ohjeita.

Viitteet:

1. Mayo Clinic. Coronary artery disease. Saatavilla osoitteesta <https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/coronary-artery-disease/symptoms-causes/syc-20350613> [viitattu toukokuussa 2020].
2. Heart & Stroke Foundation. Coronary Artery Disease. Saatavilla osoitteesta <https://www.heartandstroke.ca/heart/conditions/coronary-artery-disease> [viitattu toukokuussa 2020].
3. NHS Choices. Atherosclerosis (arteriosclerosis). Saatavilla osoitteesta <https://www.nhs.uk/conditions/atherosclerosis/> [viitattu toukokuussa 2020].

Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, R (B01 AF01). Tabletter 2,5 mg (F).

Indikation: Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, är avsett för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. **Dosering:** Den rekommenderade dosen är Xarelto 2,5 mg två gånger dagligen, i kombination med en daglig dos om 75–100 mg acetylsalicylsyra. Behandlingslängden ska fastställas för varje enskild patient baserat på regelbundna utvärderingar med hänsyn tagen till risken för trombotiska händelser kontra blödningsrisk. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inkluderar

sive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. **Varningar och försiktighet:** Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Administrering av Xarelto bör avbrytas om svår blödning uppstår. Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. Nyttan och risken med behandlingen ska regelbundet utvärderas för varje enskild individ. Datum för senaste översynen av produktresumén december 2022. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Före förskrivning vänligen läs produktresumén på fass.se MA-M_Riv-SE-0142-3. December 2022.

Översättningen är utförd av *LanguageWire*, ett professionellt ISO9001:2015-certifierat översättningsföretag med kompetens att översätta från svenska till finska. Vi intygar härmed att denna översättning, enligt vår professionella kunskap, motsvarar dokumentet *Patientbroschyr (CAD)* på svenska.



Bayer AB
Box 606, 169 26 Solna
Tel: 08-580 223 00