

Enfermedad arterial periférica: información que puede ser útil antes de comenzar un tratamiento con Xarelto® (rivaroxaban)

Usted recibe esta información porque su médico le ha prescrito Xarelto para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica. La información le ayudará a comprender la enfermedad y por qué es importante que tome Xarelto como le han indicado.

Si desea recibir más información sobre la enfermedad arterial periférica, puede consultar a su médico o ir a www.benartarsjukdom.se.

Para obtener una información completa a los usuarios, consulte el prospecto que se incluye en el envase del medicamento o vaya a www.fass.se.

¿Por qué necesito tratamiento?

La enfermedad arterial periférica suele afectar los vasos sanguíneos de las piernas —las arterias periféricas—, y entonces se denomina isquemia crónica de extremidades inferiores.¹

La enfermedad se inicia con la acumulación de depósitos grasos (placas) en las paredes de las arterias, lo cual reduce el flujo sanguíneo. Esto provoca síntomas como dolor de piernas como consecuencia de un déficit en el aporte de sangre a los grupos musculares de las extremidades inferiores. Normalmente, esto se advierte al caminar.¹ La enfermedad también se conoce como “enfermedad de los escaparates”.

“Quienes la padecen se ven en la necesidad de parar y parece que estuviesen mirando lo que hay tras los cristales de los comercios.”

Minimizar el riesgo

A veces se forma un coágulo sanguíneo sobre el depósito de grasa y la arteria se bloquea por completo. Si esto sucede, se requiere cirugía para tratar de restablecer el flujo sanguíneo y reducir el riesgo de amputación.^{2,3} Afortunadamente, usted y su médico pueden contribuir a reducir el riesgo de que esto ocurra.

¿Por qué Xarelto®?

Su médico le ha recetado Xarelto en combinación con ácido acetilsalicílico para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica. El objetivo es reducir el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos en sus arterias periféricas.

¿Qué es Xarelto y el ácido acetilsalicílico?

Xarelto es un medicamento que disminuye el riesgo de formación de coágulos sanguíneos en las arterias periféricas haciendo que la sangre sea menos densa. El ácido acetilsalicílico también actúa como diluyente de la sangre.

¿Por qué debo tomar los dos juntos?

El ácido acetilsalicílico y Xarelto diluyen la sangre de diferentes maneras y, tomados de manera combinada, ofrecen un resultado más eficaz.

La combinación de Xarelto y ácido acetilsalicílico puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o amputación de manera más eficaz que el ácido acetilsalicílico solo.

¿Cómo actúan Xarelto® y el ácido acetilsalicílico?

Xarelto reduce la formación de redes de fibrina (la red que forma el coágulo sanguíneo) mientras que el ácido acetilsalicílico inhibe la activación de las plaquetas (las células que fijan la red). Juntos reducen el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos en sus arterias periféricas.

¿Cómo debo tomar Xarelto® y el ácido acetilsalicílico?

Debe tomar Xarelto dos veces al día y ácido acetilsalicílico una vez al día. Hay algunos trucos para no olvidarse de las tomas de su medicación. ¿Suele comer siempre en los mismo horarios? ¿O bien hay algo que usa dos veces al día (por ejemplo, su cepillo de dientes)?

Ácido acetilsalicílico 75 mg una vez al día (por la mañana O por la noche). **Xarelto 2,5 mg** dos veces al día (por la mañana Y por la noche).

Nunca tome una dosis doble de Xarelto o ácido acetilsalicílico para compensar las dosis olvidadas.

¿Durante cuánto tiempo debo tomar Xarelto®?

El médico decidirá durante cuánto tiempo debe seguir tomando el tratamiento.

¿Qué más necesito saber antes de empezar a tomar Xarelto®?

Tarjeta informativa para su seguridad

Recibirá una tarjeta en la que se informa que está tomando un medicamento anticoagulante. Muestre la tarjeta al médico, dentista u otros profesionales sanitarios cuando acuda a una consulta o deba someterse a un tratamiento, y llévela siempre consigo (por ejemplo, en la billetera) por si llegara a sufrir un accidente o una emergencia médica.

¿Qué más puedo hacer?

Recuerde que es muy importante tomar el medicamento de acuerdo con las instrucciones del médico. También existen otras maneras de aliviar la enfermedad de las arterias coronarias:³

- ◆ Dejar de fumar
- ◆ Hacer ejercicio regularmente
- ◆ Bajar de peso, si es necesario
- ◆ Una dieta saludable

Si toma más Xarelto del que debiera

Consulte a su médico inmediatamente si ha tomado demasiados comprimidos. Si toma demasiado Xarelto, aumenta el riesgo de sufrir una hemorragia.

Reacciones adversas

Todos los medicamentos pueden tener reacciones adversas, aunque no todas las personas las sufran. Consulte a su médico si empieza a sangrar, por ejemplo, por la nariz, la boca, las vías urinarias o el estómago/intestino. Si sufre una hemorragia fuerte o una hemorragia que no para sola, debe acudir a urgencias. Si nota un golpe fuerte en el estómago, el pecho o la cabeza, también debe acudir a urgencias para que comprueben que no haya sufrido una hemorragia interna. Acuda asimismo a urgencias en caso de debilidad excepcional, cansancio, palidez, mareo, dolor de cabeza, hinchazón inexplicable, mayor dificultad para respirar, dolor en el pecho o angina de pecho, que son síntomas que pueden indicar la presencia de una hemorragia.

Uso de Xarelto con otros medicamentos

No tome antiinflamatorios como Voltaren, Naproxen o ácido acetilsalicílico sin consultar primero con su médico. Los analgésicos que contienen paracetamol, por ejemplo, Alvedon y Panodil pueden tomarse durante el tratamiento con Xarelto. **Es importante que informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta y los medicamentos naturales. Si usa medicamentos antidepresivos del tipo SSRI, también debería informar a su médico.** El médico determinará cómo debe proceder con el tratamiento.

Restricciones

Contacte a su médico:

- ◆ si es alérgico (hipersensible) al rivaroxaban o a cualquiera de los demás componentes de Xarelto
- ◆ si sangra mucho o tiene una hemorragia activa
- ◆ si tiene una enfermedad de hígado que causa un mayor riesgo de hemorragia
- ◆ si está embarazada o en período de lactancia
- ◆ si debe someterse a una operación o biopsia programadas si va a tener una cirugía o biopsia planificada

Si va a someterse a la extracción de un diente, debe informar a su dentista de que está tomando Xarelto. Informe a su médico también si tiene pensado quedarse embarazada.

NOTA: Este prospecto no reemplaza los consejos e instrucciones de su médico u otro profesional de la salud.

Referencias:

1. Mayo Clinic. Peripheral artery disease (PAD). Symptoms and causes. Versión digital: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-artery-disease/symptoms-causes/syc-20350557> [última revisión mayo de 2020].
2. NHS Choices. Atherosclerosis (arteriosclerosis). Versión digital: <https://www.nhs.uk/conditions/atherosclerosis/> [última revisión mayo de 2020].
3. Mayo Clinic. Peripheral artery disease (PAD). Diagnosis and treatment. Versión digital: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-artery-disease/diagnosis-treatment/drc-20350563> última revisión mayo de 2020].

Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, R (B01 AF01). Tabletter 2,5 mg (F). **Indikation:** Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, är avsett för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. **Dosering:** Den rekommenderade dosen är Xarelto 2,5 mg två gånger dagligen, i kombination med en daglig dos om 75–100 mg acetylsalicylsyra. Behandlingslängden ska fastställas för varje enskild patient baserat på regelbundna utvärderingar med hänsyn tagen till risken för trombotiska händelser kontra blödningsrisk. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocyttaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklu-

sive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. **Varningar och försiktighet:** Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Administrering av Xarelto bör avbrytas om svår blödning uppstår. Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopido-grel eller tiklopidin. Nyttan och risken med behandlingen ska regelbundet utvärderas för varje enskild individ. Datum för senaste översynen av produktresumén december 2022. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Före förskrivning vänligen läs produktresumén på fass.se MA-M_Riv-SE-0142-3. December 2022.

Översättningen är utförd av *LanguageWire*, ett professionellt ISO9001:2015-certifierat översättningsföretag med kompetens att översätta från svenska till spanska. Vi intygar härmed att denna översättning, enligt vår professionella kunskap, motsvarar dokumentet *Patientbroschyr (PAD)* på svenska.



Bayer AB
Box 606, 169 26 Solna
Tel: 08-580 223 00