

Strattera
atomoxetin
oral lösning

Bruksanvisning


Steg-för-steg anvisning för användning av Strattera

VID BRUK AV STRATTERA, läs och följ noga instruktionerna steg-för-steg.



WARNING: Adaptern utgör en KVÄVNINGSRISK - små delar. Fäst inte sprutan till adaptern förrän adaptern är helt införd i flaskan. Den måste sitta fast i flaskan för säker användning. Använd endast under tillsyn av vuxen.

FÖRPACKNINGENS DELAR



VIKTIGT

Låt **INTE** ditt barn ta läkemedlet utan din hjälp.

Använd **INTE** läkemedlet om det har passerat utgångsdatum. (Kontrollera utgångsdatum (Utg.dat.) på etiketten).

Använd **INTE** läkemedlet mer än 45 dagar efter att flaskan öppnats. Läs **Kasserings**-avsnittet för information om vad du ska göra med läkemedel som du inte använder.

Använd **INTE** tvål eller rengöringsmedel till doseringssprutan. Lägg **INTE** sprutan i diskmaskinen. Om du gör det kanske inte sprutan fungerar som den ska. Läs steg N-P för information om hur sprutan ska rengöras.

Strattera oral lösning bör inte blandas med mat eller vatten eftersom det kan påverka smaken eller förhindra att man får full dos.

Strattera orsakar ögonirritation. **Undvik kontakt med ögonen.** Om du får läkemedel i ögat, spola omedelbart med vatten och kontakta sjukvården. Tvätta händer och ytor som kan ha kommit i kontakt med läkemedlet så snart som möjligt.

STEG 1 INLEDANDE FÖRBEREDELSE AV FLASKAN




Före första användning, tryck adaptern **hela vägen ner** i flaskans öppning. Fäst inte sprutan till adaptern förrän adaptern är helt införd i flaskan.

Skruva **INTE** adaptern.

 **WARNING:** Adaptern utgör en KVÄVNINGSRISK - små delar. Den måste sitta fast i flaskan för säker användning.

STEG 2 FÄRDIGSTÄLLA



Ta fram det som du behöver:

- Medicinflaskan
 - Dossprutan för dosering via munnen.
-



Tvätta händerna med tvål och vatten.

Skriv ditt barns dos här:

_____ ml

Ta exakt den dos som ditt barns läkare har ordinerat.

Om ditt barns dos är 10 ml ELLER MINDRE, kommer du att behöva använda sprutan 1 gång.

Om ditt barns dos är MER ÄN 10 ml men INTE mer än 20 ml, kommer du att behöva använda samma spruta 2 gånger.


Om ditt barns dos är MER ÄN 20 ml, kommer du att behöva använda samma spruta 3 gånger.

STEG 3 FÖRBEREDA DOSEN



Tryck ner locket samtidigt som du vrider den motsols.

Ta bort locket från flaskan.



Tryck in kolven ända in till sprutspetsen.




Sätt in sprutspetsen i öppningen på adaptern.

Se till att sprutspetsen är helt inne i adaptern.




Vänd flaskan och sprutan upp och ner.



Håll flaskan och sprutan med en hand. Dra ned kolven med den andra handen, tills rätt mängd av läkemedlet dragits upp i sprutan.

Kontrollera att det är rätt dos i sprutan.



Vänd tillbaka flaskan och placera den på ett plant underlag.

Kontrollera om det finns luftbubblor i sprutan. Om det finns bubblor, töm tillbaka läkemedlet i flaskan och gör om steg D-H. En luftbubbla kan resultera i en felaktig dos.



Ta bort sprutan från flaskan.

Rör **INTE** kolven.

STEG 4 GE LÄKEMEDLET



Sätt sprutspetsen vid ditt barns mungipa. Be barnet att inte bita i sprutan.



Tryck kolven ända ner tills ALLT läkemedel kommer in i barnets mun.

Spruta **INTE** läkemedlet längst back i svalget. Se till att barnet sväljer allt läkemedel.



Om ditt barns dos är MER ÄN 10 ml, upprepa steg D-K för att ge ditt barn resten av dosen. Använd samma spruta. Se **doseringstabellen** på andra sidan detta papper.

Ta exakt den dos som ditt barns läkare har ordinerat.

STEP 5 RENGÖRING



Skruva på locket ordentligt på flaskan.

Ta **INTE** bort adaptern. Locket kommer att passa över den.



Fyll ett glas med rent vatten.

Använd **INTE** tvål eller diskmedel till den orala dossprutan.

Ta **INTE** bort kolven ur den orala dossprutan. Sätt sprutspetsen i vattnet. Dra upp kolven för att fylla sprutan med vatten.



Tryck ner kolven och spruta ut vattnet i glaset eller i vasken.



Skaka av överflödigt vatten från sprutan.

Torka sprutan med en pappershandduk.



Tvätta dina och ditt barns händer med tvål och vatten.

Rör **INTE** dina ögon när du har hanterat Strattera.
Strattera kan irritera ögonen.

Se andra sidan detta papper för vanliga frågor, **doseringstabell** och annan viktig information.

DOSERINGSTABELL FÖR DOSER ÖVER 10 ml

Använd denna tabell för att räkna ut hur du ska ge ditt barns dos. Hitta rätt dos i första kolumnen. Tala med din läkare eller apotekspersonal om hur du ska ge barnet korrekt dos.

Ditt barns dos	Dra upp så här mycket Strattera i sprutan första gången	Dra upp så här mycket mycket Strattera i sprutan andra gången	Dra upp så här mycket mycket Strattera i sprutan tredje gången
11 ml	10 ml	1 ml	0
12 ml	10 ml	2 ml	0
13 ml	10 ml	3 ml	0
14 ml	10 ml	4 ml	0
15 ml	10 ml	5 ml	0
16 ml	10 ml	6 ml	0
17 ml	10 ml	7 ml	0
18 ml	10 ml	8 ml	0
19 ml	10 ml	9 ml	0
20 ml	10 ml	10 ml	0
21 ml	10 ml	10 ml	1 ml
22 ml	10 ml	10 ml	2 ml
23 ml	10 ml	10 ml	3 ml
24 ml	10 ml	10 ml	4 ml
25 ml	10 ml	10 ml	5 ml

Vanliga frågor

F. Hur ska man göra om det finns luftbubblor i dossprutan?

S. Ge **INTE** läkemedlet till ditt barn. Luftbubblor kan resultera i en felaktig dos. Töm tillbaka läkemedlet i flaskan och repetera steg D-H.

F. Hur ska jag göra om det är för mycket läkemedel i sprutan?

S. Behåll sprutspetsen kvar i flaskan. Håll flaskan upprätt. Tryck in kolven tills det är rätt dos i sprutan.

F. Hur ska jag göra om det är för lite läkemedel i sprutan?

S. Behåll sprutspetsen kvar i flaskan. Håll flaskan upp och ner. Dra ner kolven tills det är rätt dos i sprutan.

F. Vad händer om jag eller mitt barn får läkemedel i ögat?

S. Spola omedelbart ögat med vatten och kontakta sjukvården. Tvätta händerna och ytor som kan ha kommit i kontakt med läkemedlet så snart som möjligt.

F. Hur gör jag när jag ska resa?

S. Se till att du har med dig tillräckligt med Stratterra så att det räcker hela resan. Förvara läkemedlet på ett säkert sätt, upprätt och vid rumstemperatur.

F. Kan jag blanda Stratterra med mat eller vatten innan jag ger det till mitt barn?

S. Det rekommenderas inte att blanda Stratterra oral lösning med mat eller vatten. Det kan påverka smaken på Stratterra oral lösning, eller förhindra att man får full dos. Du kan ge barnet ett glas vatten att dricka efter att han/hon fått i sig hela medicindosen.

Förvaring

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.
Förvara flaskan och sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

Kassering

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. .