

VIKTIG INNEHÅLLER MEDICINSK INFORMATION

DARATUMUMAB

Johnson&Johnson

Telefonkontakt:

Läkarens namn/klinikens eller sjukhusets namn:

Vid nödsituation eller om du hittar detta kort,
vänligen kontakta nedan angivna läkare:

PATIENTER behandlade med daratumumab: Ge detta kort till sjukvårdspersonalen FÖRE blodtransfusion och bär det i 6 månader efter att behandlingen har avslutats.
För mer information, se bipacksedeln.

Patient-ID-kort för daratumumab

Namn: _____

Jag tar följande läkemedel:

antikroppsprodukten daratumumab för behandling
av multipelt myelom eller AL-amyloidos.

Jag slutade ta detta läkemedel den ____ / ____ / ____
DD MM ÅÅÅÅ

Till hälso- och sjukvårdspersonal

Daratumumab är förknippad med risk för interferens med blodtypning. Ett indirekt Coombs test (indirekt antiglobulintest [IAT]) kan ge positiva resultat hos patienter som får daratumumab, även i frånvaro av antikroppar mot svaga blodantigener i patientens serum. Effekten kan kvarstå i upp till 6 månader efter den sista dosen. Bestämning av patientens ABO- och Rh-blodgrupp påverkas inte.

Om en akut transfusion blir nödvändig kan icke-korstestade ABO/RhD-kompatibla erytrocyter ges i enlighet med lokal blodcentralspraxis.

För mer information vänligen kontakta oss via e-post: jacse@its.jnj.com eller telefon: 08-626 50 00 (växel, be att få tala med "medicinsk information" och du kommer att bli kopplad till rätt person) eller använd denna referens för att få ytterligare information: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Innan behandling med daratumumab påbörjades togs

blodprov den ____ / ____ / ____
DD MM ÅÅÅÅ

Mina resultat var:

Blodgrupp: ☐A ☐B ☐AB ☐0 ☐Rh+ ☐Rh-

Indirekt Coombs test (antikroppsscreening) var:

☐Negativt ☐Positivt för följande antikroppar:

Övrigt: _____

Kontaktuppgifter till institutionen där blodproverna
togs: _____