

Patientinformation Agomelatin

– rekommendationer för att undvika leverpåverkan

Agomelatin är ett antidepressivt läkemedel som kan hjälpa dig att behandla din depression.

Agomelatin kan orsaka biverkningar som förändringar i din leverfunktion. Denna information ger dig rekommendationer för att undvika leverbiverkningar och råd om vad du ska göra om sådana biverkningar uppkommer under behandling med agomelatin. Fråga din läkare om du behöver ytterligare information.

För att optimera din behandling, följ din läkares rekommendationer gällande intag av agomelatin (dos, behandlingstid, uppföljning så som schemalagda läkarbesök, blodprovsanalyser).

Att göra innan du börjar ta agomelatin

- Berätta för din läkare om du vet att din lever inte fungerar ordentligt: du ska i så fall inte ta agomelatin.
- Det kan finnas andra anledningar till att agomelatin inte är lämpligt för dig. Be din läkare om råd:
 - Om du tidigare haft leverproblem
 - Om du är överviktig eller lider av fetma
 - Om du är diabetiker
 - Om du konsumerar alkohol
 - Om du tar andra mediciner (som är kända för att påverka levern)

Genom att ta blodprover regelbundet undviker du leverpåverkan under din behandling.

- **Varför?**

Din läkare bör ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt innan behandlingen startar. Blodproven som föreskrivs av din läkare kommer att visa henne/honom hur din lever fungerar för att kunna avgöra om agomelatin är lämpligt för dig.

Under behandlingen med agomelatin kan vissa patienter få ökade nivåer av leverenzym i blodet. Nivåerna av leverenzym visar hur din lever fungerar och är avgörande för läkaren som följer din behandling.

- **När?**

- Före behandlingsstart eller vid dosökning
- Efter ca 3 veckor
- Efter ca 6 veckor
- Efter ca 3 månader
- Efter ca 6 månader

Om din läkare ökar dosen till 50 mg måste hela testschemat utföras igen.

- **Hur?**

- Glöm inte att ta med ditt "Schema för påminnelse om besök för blodprovstagning (se nästa sida) till din läkare.
- Informera omedelbart din läkare om du får någon information om att dina leverenzymmer ökar i blodet under din behandling.
- Var vaksam på tecken på leverpåverkan. Om du observerar något av följande, så kanske inte din lever fungerar ordentligt:
 - Gul hud/gula ögon
 - Mörk urin
 - Ljutfärgad avföring
 - Smärta uppe till höger i buken
 - onormal trötthet (speciellt i samband med andra symptom som listats ovan)

Ta kontakt med din läkare omedelbart om du får något tecken på leverpåverkan (se ovan) för att få veta om du ska avbryta din agomelatinbehandling eller inte.

SCHEMA FÖR PÅMINNELSE OM BESÖK FÖR BLODPROVSTAGNING

Komihåg att ta med detta schema när du besöker din läkare!

När du tar agomelatin så är det viktigt att ta regelbundna blodprov. Tabellen nedan hjälper dig att hålla reda på dina besök för blodprovstagning.

Agomelatin 25 mg- Startdatum:	
Blodprovsintervall för leverenzym	Datum
Datum för första testet (<i>vid behandlingsstart</i>)	
Datum för andra testet (<i>efter ca 3 veckor</i>)	
Datum för tredje testet (<i>efter ca 6 veckor</i>)	
Datum för fjärde testet (<i>efter ca 3 månader</i>)	
Datum för femte testet (<i>efter ca 6 månader</i>)	

Din läkare kan besluta att fler blodprover skall tas.

Dosökning till 50 mg- Startdatum:	
Blodprovsintervall för leverenzym	Datum
Datum för test vid behandlingsstart med agomelatin 50 mg	
Datum för andra testet (<i>efter ca 3 veckor</i>)	
Datum för tredje testet (<i>efter ca 6 veckor</i>)	
Datum för fjärde testet (<i>efter ca 3 månader</i>)	
Datum för femte testet (<i>efter ca 6 månader</i>)	