

Vabysmo▼ patientbroschyr

**För behandling av synnedsättande
diabetesmakulaödem i gula fläcken (DME)**

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Du kan dessutom rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

DME

Den här broschyren innehåller viktig säkerhetsinformation som hjälper dig förstå fördelar och risker med Vabysmo.

Du kan använda broschyren för att läsa mer om din sjukdom och vad du kan förvänta dig av behandlingen med Vabysmo. Broschyren är även avsedd för närstående och stödpersoner till personer med DME. Kontakta din klinik om du har ytterligare frågor.

Se sista sidan för länk till inläst version av denna broschyr.

Innehållsförteckning

Kontakta sjukvården om du får något av följande symtom	3
Vad är DME?	4
Vad är Vabysmo?	7
Behandling med Vabysmo	8
Eventuella biverkningar	10
Rapportering av biverkningar	11

Kontakta sjukvården så snart som möjligt om du får något av följande symtom efter behandling med Vabysmo:

- Plötsligt försämrad syn.
- Ökad rodnad i ögat.
- Synen blir suddig, eller om du inte ser lika bra som du brukar.
- Ökat antal små partiklar i synfältet som inte försvinner efter några dagar.
- Ögonsmärta, ökat obehag i ögat eller ökad ljuskänslighet.

Vad är DME?

Synnedsättande diabetesmakulaödem, benämns DME (Diabetes Makula Edema).


DME är den främsta orsaken till synnedsättning hos diabetiker. Högt blodsocker (glukos) under lång tid kan ge en ökad risk att få DME.

Vid DME skadas blodkärlen i näthinnan så att vätska läcker och orsakar svullnad i gula fläcken, vilket leder till synförlust.


Näthinnan är det ljuskänsliga bakre lagret i ögat som registrerar de bilder vi ser och överför dem till hjärnan.

Makula, även kallad **gula fläcken**, är den centrala delen av näthinnan, där vår syn är som skarpast. Den används när vi läser och kör bil, för att känna igen ansikten och färger och se föremål i detalj.

Friskt öga



Öga hos patient med DME



Symtom kan vara:



Ett mörkt, tomt område
mitt i synfältet.



Färger upplevs annorlunda
eller förvrängda.



Suddig syn.




Förvrängd syn, t ex raka
linjer ser vågiga ut.

Dessa symtom kan göra det svårt att läsa, köra bil,
titta på TV och utföra andra vardagliga sysslor.

Vad är Vabysmo?

Vabysmo är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen faricimab och ges som injektion i ögat. Vabysmo blockerar proteinerna VEGF och Ang-2 och därmed hämmas tillväxt och läckage från onormala blodkärl.



Du kommer regelbundet undersökas för att kontrollera att behandlingen fungerar som den ska. Vabysmo kan förbättra sjukdomen, eller bromsa försämring av sjukdomen, och därmed bevara eller till och med förbättra din syn.

Behandling med Vabysmo

Förberedelser inför injektionen

- Om du behöver extra stöd, be en närstående att följa med dig. Det kan underlätta resorna och att ta emot informationen vid samtalet med läkaren.
- Undvik att använda smink på injektionsdagen.

Före injektionen

- Tala om för läkaren innan du får Vabysmo om:
 - Du har en infektion i eller runt ögat.
 - Du har smärta eller rodnad i ögat (ögoninflammation).
 - Du är allergisk mot faricimab eller något annat innehållsämne i läkemedlet. En fullständig förteckning över innehållsämnen finns i bipacksedeln.
- Du får ögondroppar (lokalbedövning) som bedövar ögat för att minska eller förebygga smärta från injektionen.
- Före injektionen rengörs ögat noggrant med en desinficerande ögonskölj för att förhindra infektion.
- Ögonlocket hålls öppet med hjälp av ett instrument som förhindrar att du blinkar.

Under injektionen

- Injektionen tar bara några minuter.
- Du är vaken.
- Du kan känna tryck under injektionen.

Efter injektionen

- Fråga läkaren om du ska undvika några särskilda aktiviteter.
- Du kan ha tillfälliga synproblem (t.ex. dimsyn) efter injektionerna med Vabysmo. **Kör inte bil och använd inte maskiner så länge problemen håller i sig.**
- Gnugga dig inte i ögonen så länge som bedövningen sitter i.

Lämplig vård efter injektionen

- Det är viktigt att du följer det behandlingsschema med Vabysmo enligt läkarens rekommendationer.
- Tala med din läkare innan du avbryter behandlingen med Vabysmo.
- Ta alla läkemedel som du har ordinerats av din ögonläkare.

Eventuella biverkningar

Efter injektionen kan du ha dimsyn och se små partiklar i synfältet. Det är normalt och bör endast hålla i sig i några dagar.

Efter injektion i ögat med Vabysmo kan man få:

- Inflammation i ögat.
- Svår infektion i ögat, endoftalmit (mindre vanligt).

En lista av biverkningar finns i bipacksedeln på fass.se.

Kontakta omedelbart sjukvården om du får något av följande symtom:

- Plötslig synnedsättning.
- Förvärrad rodnad i ögat.
- Synen blir suddig, eller om du inte ser lika bra som du brukar.
- Ökat antal små partiklar i synfältet som inte försvinner efter några dagar.
- Ögonsmärta, ökat obehag i ögat eller ökad ljuskänslighet.

Dessa symtom kan vara tecken på allergisk reaktion, inflammation eller infektion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta sjukvården så snart som möjligt. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln eller denna broschyr.

Du kan dessutom rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet.

www.lakemedelsverket.se



Genom att rapportera biverkningar bidrar du till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

För ytterligare säkerhetsinformation, tala med läkare och läs bipacksedeln för Vabysmo.

Kontaktuppgifter

Klinik:

Telefon:

**Scanna QR-koden för att komma till
www.fass.se.**

Där finns:

- En digital version av den här broschyren.
- En inläst ljudfil av den här broschyren.
- Bipacksedeln som går att lyssna på och skriva ut med stor text.



Vabysmo DME
Roche AB, Arvid Tydéns Allé 7, Box 1228, 171 23 Solna, www.roche.se
M-SE-00000727

RMINA2024-000057, Version 5.1.0
Granskad av Läkemedelsverket: 01-11-2024