


Bruksanvisning

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

ixekizumab



Innan du använder den förfyllda sprutan:


Viktigt att veta

- Innan du använder Taltz förfyllda spruta ska du noga läsa igenom och följa alla steg-för-steg-anvisningarna. Spara bruksanvisningen och läs den vid behov.
- Den förfyllda sprutan innehåller 1 dos Taltz. Sprutan är **ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK**.
- Sprutan får inte skakas.
- Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig bestämma var på kroppen du ska injicera din dos.
- Läs bipacksedeln till Taltz som medföljer i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

BRUKSANVISNING

Innan du använder Taltz förfyllda spruta ska du noga läsa igenom och följa alla steg-för-steg-anvisningarna.

Sprutans delar



1 FÖRBEREDELSE

- 1a Ta ut sprutan ur kylskåpet.** Låt nålskyddet sitta kvar på sprutan tills du är redo att injicera. **Vänta 30 minuter** för att låta sprutan anta rumstemperatur innan du använder den.




Använd **INTE** någon värmekälla för att värma upp läkemedlet, såsom mikrovågsugn, varmt vatten eller direkt solljus.

- 1b Samla ihop det du behöver för injektionen:**

- 1 sprittork
- 1 bomullstuss eller en kompress
- 1 behållare för vassa föremål att kasta sprutan i

1c



Kontrollera noga den förfyllda sprutan för att se att den inte är skadad. Lämna nålskyddet på sprutan tills du är redo att ge injektionen. Läs på etiketten. Kontrollera att du ser namnet Taltz på etiketten.


Läkemedlet i sprutan ska vara genomskinligt. Färgen kan variera från färglös till svagt gul.

Om du ser något av det följande ska du **INTE ANVÄNDA** sprutan utan kasta den enligt anvisningarna:

- Utgångsdatum har passerats.
- Sprutan ser skadad ut.
- Läkemedlet är grumligt, tydligt brunt eller innehåller små partiklar.

1d **Tvätta händerna innan du injicerar läkemedlet.**

1e



Välj injektionsställe.

Du kan ge injektionen i magen, låret eller överarmens baksida. Om du ska injicera i armen måste någon hjälpa dig.


Injicera **INTE** i områden där huden är öm, skadad, rodnad eller hård eller där du har ärr eller bristningar. Injicera **INTE** inom 2,5 centimeter från naveln.

Skifta injektionsställe. Injicera **INTE** på precis samma plats varje gång. Om din sista injektion t.ex. var i vänster lår, ska nästa injektion vara i höger lår, magen eller baksidan av ena armen.

- 1f** Förbered huden. Rengör huden med en sprittork. Låt injektionsstället lufttorka innan du injicerar läkemedlet.

2 INJICERA

2a




Ta av nålskyddet och kasta det.

Sätt **INTE** tillbaka nålskyddet – du kan skada nålen eller dig själv av misstag.


Rör **INTE** vid nålen.

2b



Tag försiktigt tag i huden på det ställe där du ska injicera.


2c



För in nålen i 45 graders vinkel. Släpp sedan försiktigt huden. Se till att hålla kvar nålen på samma plats.



2d



Tryck in kolven.

Tryck långsamt in kolven helt tills allt läkemedel har injicerats. Den grå kolven ska tryckas hela vägen genom sprutan så långt det går. Dra sedan försiktigt bort nålen ur huden.

Tryck en bomullstuss eller en kompress mot injektionsstället. Gnid **INTE** på injektionsstället, det kan göra att du får ett blåmärke. Det kan komma lite blod. Detta är normalt.

När injektionen är färdig ska du kunna se den gröna kolvstången genom sprutkroppen.

3 AVSLUTA

3a



Kasta den förfyllda sprutan.

Sätt **INTE** tillbaka nålskyddet. Kasta sprutan i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

När du kastar sprutorna och behållaren:

- Kasta sprutan i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.
- Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.
- Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan hur man kastar läkemedel som inte längre används.

Säkerhetstips

- Om du har frågor eller behöver hjälp med den förfyllda sprutan, kontakta läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan.
- Om du har problem med synen ska du INTE använda den förfyllda sprutan utan hjälp från en person som har fått lära sig hur den ska användas.
- Låt INTE någon annan använda Taltz förfylld spruta och använd den INTE mer än en gång. Du kan sprida eller få infektioner.
- Förvara sprutan utom syn- och räckhåll för barn.
- Om du inte har någon behållare för vassa föremål, fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan var du kan få tag i en.

Vanliga frågor

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i sprutan?

Svar: Det är normalt att det ibland finns luftbubblor i sprutan. Taltz ges som en injektion under huden (subkutan injektion). Vid sådana injektioner är luftbubblor inget problem. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser en vätskedroppe på nålspetsen när jag tar bort nålskyddet?

Svar: En vätskedroppe på nålspetsen har ingen betydelse. Den kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Fråga: Vad ska jag göra om det inte går att trycka in kolven?

Svar: Om kolven har fastnat eller är skadad:

- **ANVÄND INTE** sprutan.
- Dra ut nålen från huden.

Fråga: Hur vet jag om injektionen är färdig?

Svar: Injektionen är färdig när:

- Den gröna kolvstängen syns i sprutkroppen.
- Den grå kolven är nedtryckt hela vägen i sprutan.

Fråga: Vad ska jag göra om den förfyllda sprutan har vart i rumstemperatur i mer än 30 minuter?

Svar: Vid behov kan sprutan förvaras utanför kylan (vid temperaturer som inte överstiger 30 °C) i upp till 5 dagar under förutsättning att den skyddas från direkt solljus.
Taltz ska kasseras om det inte används inom denna 5-dagarsperioden i rumstemperatur.

Läs hela bruksanvisningen och bipacksedeln till Taltz som finns i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.