

Denna vägledning har sammanställts i samarbete med Läkemedelsverket. Den är avsedd att som en extra riskminimeringsåtgärd säkerställa att patienter och vårdare har god kännedom om Finteplas (fenfluramins) egenskaper och därmed minska risken för vissa biverkningar.

Fintepla® ▼ (fenfluramin)

VIKTIG INFORMATION OM FINTEPLA FÖR PATIENTER OCH VÅRDARE

Läs även bipacksedeln för Fintepla

- ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur man rapporterar biverkningar finns på sista sidan.

Denna vägledning är avsedd för patienter och vårdare.



Inspired by patients.
Driven by science.

INLEDNING

Du eller ditt barn har ordinerats fenfluramin för behandling av epileptiska anfall vid Dravets syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom. I denna vägledning hittar du information om vilka risker som finns med fenfluramin och vilka undersökningar och kontroller som krävs före, under och efter behandlingen.

Läkaren kommer att gå igenom denna vägledning med dig. Passa på att ställa alla dina frågor vid samtalet med läkaren. Förvara denna vägledning på en säker plats så att du kan läsa den igen senare.

Läs även bipacksedeln som medföljer läkemedlet för att få mer information om fenfluramin.

VILKA ÄR RISKERNA MED FENFLURAMIN?

Det finns två viktiga risker med fenfluramin som man måste kontrollera med jämna mellanrum:

- Hjärtklaffsjukdom
- Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Ingen patient i de kliniska studierna utvecklade vare sig hjärtklaffsjukdom eller pulmonell arteriell hypertension när Fintepla utvärderades för behandling av Dravets syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom. Data efter marknadsföring, när fler patienter behandlats med fenfluramin, visar att pulmonell arteriell hypertoni kan uppkomma vid fenfluramin behandling i doser som ges vid Dravets syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom. Andra risker finns beskrivna i bipacksedeln.

Vad är hjärtklaffsjukdom och varför kan det utvecklas när man behandlas med fenfluramin?

Hjärtklaffsjukdom är en gemensam benämning på alla sjukdomar som drabbar hjärtklaffarna. Tidigare fick en del vuxna som behandlades med fenfluramin problem med hjärtklaffarna. Dessa patienter kunde få högre doser fenfluramin än den dos som används för behandling av epileptiska anfall vid Dravets syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom. Risken att drabbas av hjärtklaffsjukdom verkade ha samband med dosen och hur länge behandlingen varade.

Vad är pulmonell arteriell hypertension och varför kan det utvecklas när man behandlas med fenfluramin?

Vid pulmonell arteriell hypertension (PAH) blir blodkärlen i lungorna förträngda, vilket ökar blodtrycket i lungcirkulationen. Denna typ av högt blodtryck skiljer sig från vanligt högt blodtryck. Precis som vid hjärtklaffsjukdom har en del personer som tidigare behandlats med fenfluramin för sin övervikt drabbats av pulmonell arteriell hypertension. Sjukdomen kunde i sällsynta fall vara allvarlig eller dödlig. Vid behandling av övervikt kunde dessa patienter få högre doser fenfluramin än den dos som nu används för behandling av epileptiska anfall vid Dravets syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom.

Inga patienter utvecklade pulmonell arteriell hypertoni i någon av de kliniska studierna av, men data efter marknadsföring visar att pulmonell arteriell hypertension kan förekomma vid doser som ges vid behandling av Dravets syndrom eller Lennox-Gastauts syndrom.

Denna vägledning är avsedd för patienter och vårdare.

UNDERSÖKNINGAR OCH KONTROLLER

Vilka undersökningar och kontroller utförs före och under behandlingen


För att vara säker på att patienter med Dravets syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom inte har eller får problem med hjärtklaffarna eller ett onormalt högt blodtryck i lungorna gör man en undersökning av hjärtat, en så kallad ekokardiografi före och under behandlingen.

Ekokardiografi är en yttre (icke-invasiv) undersökning där man använder sig av ultraljud (högfrekventa ljudvågor som studsar tillbaka från hjärtat vid hjärtslagen) för att skapa en bild av hjärtklaffarna och beräkna trycket i blodkärlen i lungorna. Vid denna undersökning används inte strålning.

Hur ofta gör man Ekokardiografi?

Det är viktigt att patienter med Dravets syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom undersöks med ekokardiografi innan behandlingen startar för att kontrollera att det är säkert att använda fenfluramin. Undersökningen måste upprepas var 6:e månad under de första 2 åren och därefter en gång om året. Om fintepla-behandlingen avbryts måste den behandlade personen genomgå ett ekokardiogram 6 månader efter den sista dosen.

Schema för undersökning med ekokardiografi



Läkarbesök för ekokardiografi

Eko-kardio-grafi	Undersökning vid baslinjen	Månad 6	Månad 12	Månad 18	Månad 24	Månad 36	Månad 48	Månad 60
Datum								

Denna vägledning är avsedd för patienter och vårdare.

Om man upptäcker något problem med hjärtklaffarna eller högt blodtryck i lungorna under behandlingen med fenfluramin kan läkaren avbryta behandlingen. Man fortsätter med regelbundna kontroller av hjärtat.

Hur blir riskerna för hjärtklappssjukdom och pulmonell arteriell hypertension övervakade?

Några länder i Europa har upprättat en registerdatabas för insamling av data för långtidssäkerheten av fenfluramin vid behandling av Dravets syndrom och Lennox-Gastaut syndrom med fokus på hjärtklaffsjukdom och pulmonell arteriell hypertoni. Deltagande är önskvärt, men frivilligt och kräver inga ytterligare undersökningar. Kontakta din behandlande läkare för mer information.

RAPPORTERING AV BIVERKNINGAR

Om du får biverkningar (även biverkningar som inte räknas upp i bipacksedeln), kontakta läkare eller apotekspersonal.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Mer information finns i bipacksedeln.

Bilaga

Bipacksedel för Fintepla, fenfluramin 2,2 mg/ml oral lösning. Bipacksedelen finns på EMA's webbplats sammen i Produktresumén: [Fintepla EPAR Produktinformation](#).

Denna vägledning är avsedd för patienter och vårdare.



UCB Pharma AB
Regus Norra Bantorget
Olof Palmesgata 29, 4th floor
111 22 Stockholm - ucb.com