

Zoledronsyra STADA/Zolestad Patientkort



Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om innan och under behandling med zoledronsyra injektioner för cancerrelaterade tillstånd

Din läkare har rekommenderat att du behandlas med zoledronsyra för att förebygga benfrakturer.

En biverkning som kallas osteonekros i käken (benskador i käken) har rapporterats hos patienter som behandlas med zoledronsyra injektioner för cancerrelaterade tillstånd. Osteonekros kan också uppstå efter avslutad behandling.

För att minska risken för att utveckla osteonekros i käken, det finns vissa försiktighetsåtgärder du bör ta:

Innan behandlingen:

- Be din läkare berätta vad osteonekros är innan du börjar behandlingen.
- Kontrollera med din läkare om en tandundersökning rekommenderas innan du påbörjar behandling med zoledronsyra.
- Tala om för din läkare/ sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om du har några problem med munnen eller tänderna.

Patienter som genomgår tandkirurgi (t.ex. tandutdragning), som inte får regelbunden tandvård, som har tandköttspålit, som är rökare eller som tidigare behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förhindra bensjukdomar) kan ha en högre risk att utveckla osteonekros i käken.

Under behandlingen:

- Du bör upprätthålla en god munhygien, se till att dina proteser passar ordentligt och gå på regelbundna tandkontroller.
- Om du får tandbehandling eller kommer att genomgå tandkirurgi (t ex tandutdragning), informera din läkare och berätta för din tandläkare att du behandlas med zoledronsyra.
- Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar, eftersom dessa kan vara tecken på ett tillstånd som kallas osteonekros i käken.

Läs bipacksedeln för ytterligare information.