

CAMZYOS® ▼ (mavakamten)

Patientguide

Version 2.0, 3500-SE-2500001, Mars 2025



▼ CAMZYOS är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR KVINNOR I FERTIL ÅLDER

Om du är i fertil ålder måste du läsa informationen nedan innan du börjar att ta CAMZYOS. Spara även sidan som referens.

CAMZYOS och risken för embryo- och fostertoxicitet (toxicitet för det ofödda barnet)

CAMZYOS får inte tas om du är gravid, eller om du är i fertil ålder och inte använder en effektiv preventivmetod eftersom CAMZYOS kan vara fosterskadande.

Om du kan bli gravid måste du göra ett graviditetstest med negativt utfall innan du börjar att ta CAMZYOS.

Du måste använda en effektiv preventivmetod under CAMZYOS-behandlingen och i 6 månader efter din sista CAMZYOS-dos. Samtala med din läkare om vilken preventivmetod som är lämpligast för dig.

Tala med din läkare om du överväger att försöka bli gravid.

Om du misstänker att du kan vara gravid eller är gravid medan du tar CAMZYOS måste du **omedelbart** informera din förskrivande läkare eller annan läkare om det. Förskrivande läkare eller annan läkare diskuterar i så fall behandlingsalternativ med dig.

Denna **Patientguide** innehåller ett **Patientkort**.

Bär alltid **Patientkortet** med dig. Berätta för all vårdpersonal som du träffar att du tar CAMZYOS.

Patientkortet innehåller information om de huvudsakliga riskerna med CAMZYOS och din förskrivares kontaktuppgifter.

CAMZYOS®▼ (mavakamten)
PATIENTKORT

Se bipacksedeln som ger mer information om CAMZYOS. Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.



VAD ÄR EKO-KARDIOGRAFI OCH VARFÖR ÄR DE VIKTIGA?

Regelbundna ekokardiografier (hjärtultraljud) hjälper din läkare att utvärdera hur CAMZYOS påverkar ditt hjärta. Ekokardiografi är en undersöknings-metod som använder ljudvågor för att skapa bilder av hjärtat. Denna undersökning gör det möjligt för din läkare att bedöma hur ditt hjärta svarar på behandlingen och säkerställa att du får en gynnsam dos. Baserat på undersökningen kan din läkare öka, minska eller bibehålla din dos av CAMZYOS. Ibland kan det bli aktuellt att pausa eller avbryta din behandling. Din första ekokardiografi kommer att utföras innan behandlingen med CAMZYOS påbörjas. Därefter görs ekokardiografi-undersökningar vid uppföljningsbesöken 4, 8 och 12 veckor efter din första dos av CAMZYOS för att bedöma hur väl du svarar på behandlingen. Rutinmässiga ekokardiografi-undersökningar görs därefter var 3:e månad eller var 6:e månad.

Du kommer också att behöva genomgå ekokardiografi enligt läkarens anvisningar om din dos av CAMZYOS ändras eller om dosen av vissa andra läkemedel som du tar ändras.



Det är viktigt att schemalägga och delta i ekokardiografi enligt din förskrivares anvisningar. Ställ förslagsvis in påminnelser på din telefon eller kalender för att hjälpa dig att komma ihåg datum och tid för dina ekokardiografier.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Det finns tre huvudsakliga risker förknippade med behandlingen av CAMZYOS:

- Embryo- och fostertoxicitet (toxicitet för det ofödda barnet) (vänligen se sida 2)
- Hjärtsvikt på grund av systolisk dysfunktion (ett tillstånd där hjärtat inte kan pumpa med tillräcklig kraft)
- Ökning av mängden mavakamten i kroppen på grund av interaktioner med vissa läkemedel och växtbaserade kosttillskott, vilket kan öka risken för biverkningar varav vissa kan vara allvarliga

Andra eventuella biverkningar relaterade till CAMZYOS beskrivs i bipacksedeln.

CAMZYOS och hjärtsvikt

Hjärtsvikt på grund av systolisk dysfunktion är ett allvarligt och ibland livshotande tillstånd.

Tala om för din förskrivare läkare eller annan läkare eller uppsök vård **omedelbart** om du får nya eller förvärrade symtom på hjärtsvikt, såsom andnöd, bröstsmärta, trötthet, hjärklappning eller bensvullnad.

Informera förskrivaren eller läkaren om eventuella nya och befintliga medicinska tillstånd som du har före och under behandlingen med CAMZYOS.

CAMZYOS och interaktioner

Vissa läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och vissa växtbaserade kosttillskott, kan påverka mängden av CAMZYOS i kroppen och öka risken för biverkningar varav vissa kan vara allvarliga.

Berätta för din förskrivare, läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade kosttillskott som du tar även om du inte tar dem varje dag.

Börja inte att ta, sluta inte att ta och ändra inte dosen av något av dina läkemedel eller växtbaserade kosttillskott utan att prata med din förskrivare, annan läkare eller apotekspersonal.

Några exempel på läkemedel som kan påverka hur stor mängd CAMZYOS som ansamlas i kroppen anges i **tabell 1**. Observera att detta inte är en heltäckande lista över alla läkemedel som kan passa in i denna kategori. Tillfällig användning av läkemedel som kan påverka nivåerna av CAMZYOS i kroppen, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, växtbaserade kosttillskott och grapefruktjuice, rekommenderas inte.

Tabell 1: Exempel på läkemedel som kan påverka CAMZYOS

Produkt	Exempel på behandlade tillstånd
Omeprazol, esomeprazol	Magsår och sura uppstötningar
Klaritromycin, rifampicin	Bakteriella infektioner
Verapamil, diltiazem	Hjärtsjukdomar
Flukonazol, itraconazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol	Svampinfektioner
Fluoksetin, fluvoksamin	Depression
Ritonavir, kobicistat	Humant immun-bristvirus (HIV)
Grapefruktjuice	



NÄR SKA JAG UPPSÖKA VÅRD?

Berätta för hälso- och sjukvårdspersonal som du besöker om eventuella biverkningar av CAMZYOS, även om sådana biverkningar som inte tas upp i denna **Patientguide**.

Eventuella biverkningar och information om hur de ska rapporteras finns också i bipacksedeln.

Rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket bidrar till ökad säkerhetsinformation om detta läkemedel.

Tala om för din förskrivande läkare, annan läkare eller uppsök vård **omedelbart** om du får nya eller förvärrade symtom på hjärtsvikt, såsom andnöd, bröstsmärta, trötthet, hjärklappning eller bensvullnad.



YTTERLIGARE INFORMATION

Om du har några frågor eller funderingar om CAMZYOS, diskutera dem med din förskrivare, läkare, apotekspersonal eller någon i ditt vårdteam.

För ytterligare information går det bra att kontakta BMS Medicinsk information via:

Telefon: +46 8 585 07 304

E-post: medinfo.sweden@bms.com



ANTECKNINGAR

Version 2.0, 3500-SE-2500001, Mars 2025

