

Fingolimod Mylan - Patientkort med graviditetsinformation

Viktiga saker att komma ihåg gällande din behandling med Fingolimod Mylan

Detta material innehåller viktig säkerhetsinformation om Fingolimod Mylan (fingolimod) och råd som är avsedda att minimera riskerna med behandlingen.

Detta patientkort har utvecklats av Mylan och är baserad på beslut av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Innan behandling med Fingolimod Mylan påbörjas

- Fingolimod Mylan (fingolimod) är kontraindicerat för gravida kvinnor och fertila kvinnor (inklusive tonårsflickor) som inte använder en effektiv preventivmetod.
- När du påbörjar behandlingen kommer din läkare att informera dig om risken för fosterskada och de åtgärder du måste vidta för att minimera denna risk. Informationen kommer att upprepas regelbundet.
- Innan behandlingen påbörjas måste du lämna ett graviditetstest som ska bekräftas vara negativt av en läkare.
- Din läkare kommer att informera dig om att du måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i 2 månader efter avslutad behandling. Tala med din läkare om vilka effektiva preventivmetoder som du kan använda.
- Läs patientguiden om Fingolimod Mylan som du får av din läkare.

Under behandling med Fingolimod Mylan

- Kvinnor får inte bli gravida under behandling.
- Patienterna måste använda en effektiv preventivmetod medan de tar Fingolimod Mylan.
- Kvinnor får inte bli gravida under behandlingen eller inom 2 månader efter avslutad behandling.
- Graviditetstester måste göras regelbundet.
- Din läkare kommer regelbundet att ge dig information om de allvarliga riskerna för fostret vid behandling med Fingolimod Mylan.
- Om du blir eller vill bli gravid, diskutera detta med din läkare eftersom du då måste avbryta behandlingen med Fingolimod Mylan.
- Om du blir gravid kommer din läkare att ge dig råd.
- Läkaren kommer att informera dig om de fosterskadande effekter som Fingolimod Mylan kan ha och göra en bedömning av det möjliga utfallet av graviditeten.

Efter avslutad behandling med Fingolimod Mylan

- Informera din läkare omedelbart om du tycker att din MS försämras (t.ex. svaghet eller synförändringar) eller om du noterar några nya symtom efter att du har avslutat behandlingen med Fingolimod Mylan på grund av en graviditet.
- Du måste använda en effektiv preventivmetod i 2 månader efter avslutad behandling med Fingolimod Mylan eftersom det tar så lång tid för Fingolimod Mylan att lämna kroppen.