

**Tasmar<sup>®</sup>**

**(tolkapon)**

Filmdragerade tabletter  
100 mg och 200 mg

# Patient- dagbok

För att hjälpa dig att hålla reda  
på besökstider för uppföljning  
av levervärden under **det första  
behandlingsåret**



# PATIENTINFORMATION

Namn:

---

Adress:

---

Tel.:

---

Specialistläkare:

---

Specialistläkarens tel.:

---

Parkinsonssköterska:

---

Parkinsonssköterskans tel.:

---

Behandling av TASMAR® påbörjad:

---

Kontaktuppgifter i en nödsituation:

---

Namn:

---

Tel.:

---

# LÄS DETTA INNAN DU PÅBÖRJAR BEHANDLING MED TASMAR®

Denna dagbok är en hjälp för att göra dig medveten om riskerna med din behandling och hålla reda på de blodprover som ska tas regelbundet för att säkerställa att levern fungerar normalt.

Läs även bipacksedeln som medföljer varje läkemedelsförpackning eftersom den innehåller mer detaljerad information. Om du har frågor angående behandlingen eller känner dig orolig bör du vända dig till behandlande sjuksköterska eller läkare.

# VIKTIG PATIENTINFORMATION

## LEVERSKADA

Tolkapon kan i sällsynta fall orsaka potentiellt dödliga leverskador. Därför ska du endast påbörja en behandling med tolkapon om din Parkinsons sjukdom inte kan kontrolleras ordentligt med hjälp av andra behandlingsmetoder med lägre risk. Om du inte efter 3 veckors behandling får en förbättring som är tillräckligt för att motivera riskerna som behandlingen medför, så kommer din behandlande läkare att avbryta behandlingen.

I de fall där leverskada har förekommit har det oftast skett efter 1 månad och före 6 månader efter behandlingsstart. Leverskada kan dock uppkomma både tidigare och senare. Därför måste följande försiktighetsåtgärder vidtas:

**Innan behandlingen börjar:** För att minska risken för allvarig leverskada bör du inte använda tolkapon om (1) du har en leversjukdom eller (2) blodprover tagna före behandlingens start visar leverpåverkan (ALAT och ASAT).

**Under behandlingens gång:** Blodprover ska tas med två veckors mellanrum under det första året av behandlingen, var fjärde vecka de följande sex månaderna och var åttonde vecka därefter. Om dosen ökas ska uppföljningen börja om från början. Behandlingen avslutas om levervärdena är onormala.

## TA KONTAKT MED DIN LÄKARE OM DU UPPLIVER NÅGOT AV FÖLJANDE SYMTOM:

- Illamående
- Feber
- Kräkningar
- Urinen mörkfärgas
- Buksmärta (speciellt runt leveren i övre högra sidan)
- Gulsot
- Förlorad aptit
- Trötthet
- Svaghet

Dessa symtom kan vara tecken på funktionsstörningar i leveren och behöver därför undersökas så fort som möjligt. Om tolkapon inte ger en förbättring av symtomen av din Parkinsons sjukdom efter tre veckor så avslutas behandlingen.

# VIKTIG PATIENTINFORMATION

## MNS

MNS (Malignt neuroleptikasyndrom) kan uppstå under behandling med talkapon. MNS kan även förekomma de närmsta dagarna efter att behandlingen har avslutats. MNS ger muskelrelaterade symtom som kan yttra sig som svår muskelstelhet, ryckningar i muskler, armar eller ben och ömhet i muskulaturen. Muskelskador kan ibland orsaka en mörkfärgning av urinen. Andra symptom som är viktiga att notera är hög feber och förvirring. För att minska risken av MNS måste följande försiktighetsåtgärder vidtas:

**Före behandling:** För att reducera risken med MNS bör du inte ta talkapon om du lider av dyskinesi (onormala och ofrivilliga rörelser) eller har haft en tidigare sjukdom som kan ha varit MNS och/eller icke-traumatisk muskelskada (icke-traumatisk rabdomyolys) eller en särskild form av feber (malign hypertermi). Risken för MNS kan öka vid användning av talkapon tillsammans med andra mediciner. Det är därför viktigt att du informerar din behandlande läkare om alla receptbelagda och icke-receptbelagda mediciner du använder.

**Under behandlingens gång:** Om du utvecklar symtom som du tror kan vara symptom av MNS ska du omedelbart informera din behandlande läkare om symptomen. Avbryt inte behandlingen med talkapon eller någon annan medicin mot Parkinsons sjukdom utan att informera din behandlande läkare först.

## HUR DU ANVÄNDER DAGBOKEN

Blodprover måste tas varannan vecka under det första behandlingsåret. Proverna används för att säkerställa att behandlingen med talkapon inte haft påverkan på levern. Syftet med denna dagbok är att säkerställa att blodproverna tas och för att kunna följa resultaten.

Ta med dagboken varje gång du besöker din behandlande sjuksköterska eller läkare. Be dem skriva in ditt nya provresultat och signera dem. Du kan också använda dagboken som hjälp i din planering av kommande besökstider genom att fylla i tid och datum för ditt nästa besök.

**Om du har frågor om behandlingen eller om hur du fyller i dagboken kan du vända dig till din behandlande sjuksköterska eller läkare.**

# PATIENTDAGBOK

Fyll i resultaten för leverfunktionsprover i tabellen vid varje besök. Notera även tidpunkt för nästa provtagning (datum och tid).

Vecka	Datum/ Tid	ALAT- resultat	ASAT- resultat	Underskrift	Kommentar
0 (före behand- ling)					
2					
4*					
6					
8					

Talkapon-dos ..... Om denna dos ökas ska uppföljningen börja om från början från vecka 0 i en ny dagbok.

\*Om ingen förbättring sker av din Parkinsons sjukdom efter tre veckor kommer behandlingen att avbrytas.

# PATIENTDAGBOK

Fyll i resultaten för leverfunktionsprover i tabellen vid varje besök. Notera även tidpunkt för nästa provtagning (datum och tid).

Vecka	Datum/ Tid	ALAT- resultat	ASAT- resultat	Underskrift	Kommentar
10					
12					
14					
16					
18					

Talkapon-dos ..... Om denna dos ökas ska uppföljningen börja om från början från vecka 0 i en ny dagbok.

# PATIENTDAGBOK

Fyll i resultaten för leverfunktionsprover i tabellen vid varje besök. Notera även tidpunkt för nästa provtagning (datum och tid).

Vecka	Datum/ Tid	ALAT- resultat	ASAT- resultat	Underskrift	Kommentar
20					
22					
24					
26					
28					

Talkapon-dos ..... Om denna dos ökas ska uppföljningen börja om från början från vecka 0 i en ny dagbok.



# PATIENTDAGBOK

Fyll i resultaten för leverfunktionsprover i tabellen vid varje besök. Notera även tidpunkt för nästa provtagning (datum och tid).

Vecka	Datum/ Tid	ALAT- resultat	ASAT- resultat	Underskrift	Kommentar
30					
32					
34					
36					
38					

Talkapon-dos ..... Om denna dos ökas ska uppföljningen börja om från början från vecka 0 i en ny dagbok.

# PATIENTDAGBOK

Fyll i resultaten för leverfunktionsprover i tabellen vid varje besök. Notera även tidpunkt för nästa provtagning (datum och tid).

Vecka	Datum/ Tid	ALAT- resultat	ASAT- resultat	Underskrift	Kommentar
40					
42					
44					
46					
48					

Talkapon-dos ..... Om denna dos ökas ska uppföljningen börja om från början från vecka 0 i en ny dagbok.

# PATIENTDAGBOK

Fyll i resultaten för leverfunktionsprover i tabellen vid varje besök. Notera även tidpunkt för nästa provtagning (datum och tid).

Vecka	Datum/ Tid	ALAT- resultat	ASAT- resultat	Underskrift	Kommentar
50					
52					

Talkapon-dos ..... Om denna dos ökas ska uppföljningen börja om från början från vecka 0 i en ny dagbok.

# Tasmar<sup>®</sup>

(tolkapon)

Filmdragerade tabletter  
100 mg och 200 mg

Tel: 08-630 19 00  
E-post: [info.sweden@viatris.com](mailto:info.sweden@viatris.com)  
[www.viatris.se](http://www.viatris.se)



Senast uppdaterad: Oktober 2023