

Viktiga kontaktuppgifter

Mitt namn:

Min kontakt vid nödsituation (namn och telefonnummer):

Läkarens namn – vem skrev ut Venclyxto®:

Läkarens telefonnummer:

SE-VNCCLL-210016v1.0 okt 2021

Granskad av Läkemedelsverket 5 okt 2021

abbvie



Viktig säkerhetsinformation till vårdpersonal om Venclyxto® och TLS

Denna patient behandlas med Venclyxto® för KLL, vilket kan orsaka tumörlyssyndrom (TLS) under de 5 första behandlingsveckorna.

- ✓ Utvärdera blodvärden: kalium, urinsyra, fosfor, kalcium och kreatinin.
- ✓ Onormala blodvärden måste genast korrigeras.
Detta kan vara fatalt om obehandlat.
- ✓ Om du misstänker TLS, kontakta genast behandlande läkare som anges på detta kort.

Läs produktresumén eller kontakta AbbVie på 08-684 446 00 för mer information och för att få fler exemplar av patientkortet.

Patientkort

Säkerhetsinformation om Venclyxto® (venetoklax) för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Venclyxto används för att behandla patienter med KLL. Detta kort innehåller information som du måste känna till om tumörlyssyndrom och Venclyxto®.



- Ha alltid med dig detta patientkort.
- Visa upp det för alla läkare som behandlar dig eller om du besöker en akutmottagning.
- Ta alltid Venclyxto® exakt som din läkare har sagt åt dig att göra.

Vad måste jag veta om TLS?

Under din behandling kan du utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet. Det kan leda till ett tillstånd som kallas **tumörlyssyndrom** (TLS) under de 5 första behandlingsveckorna.

Symtom på TLS:

- feber eller frossa
- känner dig illamående eller kräks
- känner dig förvirrad
- känner att du har svårt att andas
- oregelbunden hjärtrytm
- mörk eller grumlig urin
- känner dig ovanligt trött
- muskelsmärta eller ledvärk
- kramper eller krampanfall
- magsmärta och uppsvälldhet

Vad ska jag göra om jag får symtom på TLS?

Om du får symtom på TLS under din behandling ska du:



Genast ringa din läkare eller söka vård, och



Sluta ta Venclyxto®

Läs bipacksedeln för mer information.

Hur kan jag minska risken för TLS?



Drick minst **1,5–2 liter vatten per dag:**

- ✓ börja 2 dagar före din första dos, och
- ✓ samma dag som din första dos, och
- ✓ varje dag under de 5 första behandlingsveckorna.

Genom att dricka mycket vatten hjälper du kroppen att göra sig av med höga nivåer av blodsalter via urinen.



Lämna **blodprover när du blir kallad**, eftersom de hjälper din läkare att upptäcka TLS.



Innan du påbörjar behandlingen med Venclyxto[®] ska du ta ett annat läkemedel som hjälper till att förhindra att blodsalt (urinsyra) samlas i kroppen. Följ din läkares anvisningar.