

PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT PREGABALIN ORION

Du har fått **Pregabalin Orion** kapslar förskrivet av din läkare. Du kan tidigare ha fått ett annat läkemedel med samma verksamma ämne (pregabalin). Pregabalin Orion uppfyller samma krav på effekt och säkerhet som andra läkemedel med det verksamma ämnet pregabalin.

Pregabalin Orion är ett läkemedel som används för att behandla neuropatisk smärta, epilepsi och generaliserat ångestsyndrom. Din läkare kan ha ordinerat Pregabalin Orion för behandling av andra sjukdomar, **följ alltid din läkares instruktioner.**

Neuropatisk smärta

Pregabalin Orion används för att behandla långvarig smärta som orsakats av en nervskada. Ett flertal sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta, såsom diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, utstrålade, huggande, skärande, krampaktig, värkande, stickande, domningar och myrkrypningar. Perifer och central neuropatisk smärta kan också förknippas med humörförändringar, sömnstörningar, utmattning (trötthet), och kan ha en påverkan på den fysiska och sociala funktionen samt den allmänna livskvaliteten.

Epilepsi

Pregabalin Orion används för behandling av en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna. Pregabalin Orion ges som tillägg till annan epilepsibehandling och är inte avsett att användas ensamt vid epilepsi.

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom beskrivs som långvarig överdriven ängslan och oro som är svår att kontrollera. Det kan också orsaka rastlöshet eller en känsla av att vara uppskruvad eller på helspänn, man kan lätt bli trött och få koncentrationsproblem.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga då alltid läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Ett effektivt preventivumedium måste användas av kvinnor i fertil ålder.

Läs bipacksedeln

Ta alltid Pregabalin Orion enligt läkarens anvisningar. **Det är viktigt att du läser bipacksedeln noga.** Kontakta din behandlande läkare om du har ytterligare frågor kring din behandling.

Pregabalin kan orsaka yrsel, sömnhet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Mer information finns på fass.se.



Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid bruk av detta läkemedel.



PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT PREGABALIN ORION

MIN ORDINATION							
Pregabalin Orion	Styrka	Morgon	Lunch	Middag	Kväll	Dygnsdos antal tabletter	Dygnsdos mg
Pregabalin Orion Kapsel	25 mg						
Pregabalin Orion Kapsel	50 mg						
Pregabalin Orion Kapsel	75 mg						
Pregabalin Orion Kapsel	100 mg						
Pregabalin Orion Kapsel	150 mg						
Pregabalin Orion Kapsel	225 mg						
Pregabalin Orion Kapsel	300 mg						

ANTECKNINGAR/KOM IHÅG

◆ Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid bruk av detta läkemedel.

Pregabalin Orion (pregabalin)

Beredningsform: Hårda kapslar. **Verksam substans:** pregabalin **Användningsområde:** Läkemedel för behandling av central och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta orsakad av nervskada) hos vuxna. Pregabalin används även som tilläggsbehandling vid en viss form av epilepsi hos vuxna och vid behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. **Försiktighet och varningar:** Pregabalin kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner såsom hudreaktioner i form av svullen tunga och ansikte samt fjällande eller röd hud med blåsor. Vid dessa symtom ska behandlingen med pregabalin avbrytas. Vid tecken och symtom på allergiska reaktioner ska vården kontaktas. Behandling med pregabalin har förknippats med yrsel, sömnhet, medvetandeförlust, förvirring, psykisk försämring, suicidtankar, självmordsbeteende och påverkad syn. Pregabalin kan orsaka läkemedelsberoende även vid normala doser. Innan du tar detta läkemedel bör du berätta för din läkare om du har någon hjärtsjukdom eller missbrukat eller varit beroende av alkohol, läkemedel eller droger. **Pregabalin ska inte tas under graviditet och amning. Ett effektivt preventivmedel måste användas av kvinnor i fertil ålder. Ansvarigt företag:** Orion Pharma AB, www.orionpharma.se

Läs alltid bipacksedeln noga.