

PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT ABSENor[®] ELLER ABSENor DEPOT

Du har fått **Absenor** enterotablett, oral lösning eller orala droppar alternativt **Absenor depottabletter** förskrivit av din läkare. Du kan tidigare ha fått ett annat läkemedel med samma verksamma ämne (natriumvalproat). Absenor och Absenor Depot uppfyller samma krav på effekt och säkerhet som andra läkemedel med det verksamma ämnet natriumvalproat. Absenor och Absenor Depot är läkemedel som används för att behandla epilepsi och maniska episoder vid bipolär sjukdom hos patienter som inte kan ta litium. Din läkare kan ha ordinerat Absenor och Absenor Depot för behandling av andra sjukdomar, **följ alltid din läkares instruktioner.**

Bipolär sjukdom

Absenor används vid behandling av bipolär sjukdom och de maniska episoder som förekommer. Mani innebär ett tillstånd av stark upphetsning, upprymdhet, upprördhet, entusiasm eller hyperaktivitet. Absenor används som underhållsbehandling eller förebyggande behandling av mano-depressiv sjukdom (bipolär sjukdom) hos patienter som inte förbättras med eller inte tål litium.

Epilepsi

Absenor och Absenor Depot används för behandling av olika former av epilepsi (bl.a. partiell och generaliserande anfall såsom tonisk-kloniska anfall och absenser). Absenor och Absenor Depot ges som tillägg till annan epilepsibehandling eller som enda behandling.

Graviditet, amning och fertilitet

Är du kvinna som kan få barn ska du inte ta Absenor eller Absenor Depot, om du inte använder ett effektivt preventivmedel under hela behandlingen med Absenor. Sluta inte ta Absenor eller ditt preventivmedel innan du har diskuterat det med din läkare.



Om du är eller misstänker att du är gravid, planerar att skaffa barn, om du ammar eller planerar att amma, kontakta omedelbart läkare innan du fortsätter använda detta läkemedel. Om du behandlas för epilepsi ska du inte avsluta din behandling utan att diskutera det med din läkare. Detta är extra viktigt om du har epilepsi. Hormonella preventivmedel (som till exempel p-piller) kan påverka det sätt på vilket Absenor och Absenor depot fungerar. Berätta för din läkare om du tar p-piller. Absenor kan medföra en allvarlig risk för fosterskador.

Läs bipacksedeln

Ta alltid Absenor och Absenor Depot enligt din läkares anvisningar. Det är viktigt att du läser bipacksedeln noga. Kontakta din behandlande läkare om du har ytterligare frågor kring din behandling. Absenor och Absenor Depot kan försämra reaktionsförmågan. Du ska inte köra bil, använda verktyg eller maskiner om du inte känner dig bra. Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra bil och använda maskiner.

Mer information finns på fass.se.

PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT ABSENR[®] ELLER ABSENR DEPOT

MIN ORDINATION

	Styrka	Morgon	Lunch	Middag	Kväll	Dygnsdos antal tabletter	Dygnsdos mg
Absenor [®] Enterotablett	100 mg						
Absenor [®] Enterotablett	300 mg						
Absenor [®] Enterotablett	500 mg						
Absenor [®] Depottablett	300 mg						
Absenor [®] Depottablett	500 mg						
	Styrka	Morgon	Lunch	Middag	Kväll	Dygnsdos antal ml	Dygnsdos mg
Absenor [®] Oral lösning*	60 mg/ml						
Absenor [®] Orala droppar*	200 mg/ml						

* Apoteket ska kostnadsfritt lämna ut lämplig doseringsspruta (1 ml och/eller 10 ml spruta) för korrekt dosering av flytande Absenor[®] lösning/droppar.

ANTECKNINGAR/KOM IHÅG

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Absenor[®], Absenor[®] Depot (valproinsyra)

Beredningsformer: enterotabletter, depottabletter, oral lösning och orala droppar. **Verksam substans:** valproinsyra.

Användningsområde: Läkemedel för behandling av olika former av epilepsi. Behandling av maniska episoder vid bipolär sjukdom när litiumläkemedel inte är lämpligt. **Försiktighet och varningar:** Valproinsyra kan orsaka svåra fosterskador. Valproinsyra ska inte användas under graviditet. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet. I samråd med vården ska ett årligt graviditetspreventionsprogram genomföras för kvinnor i fertil ålder som behandlas med valproat.

Ansvarigt företag: Orion Pharma AB, www.orionpharma.se.

Läs alltid bipacksedeln noga.



Absenor kan medföra
en allvarlig risk för
fosterskador.